



7,376/3



55150

# ALBERTI HALLERI

*Domini in Goumoëns le Jux & Eclagnens.  
Præsid. Societ. Reg. Gætting. Præsid. Societ. Oeconom. Bernensis;  
Sodal. Acad. Reg. Scient. Paris. Acad. Imp. Nat.  
Cur. Boruss. Suec. Bonon. Arcad. Acad. Reg.  
Chirurg. Paris.  
Soc. Reg. Brit. Bot. Flor. Bavar. Helvet. Carniolic. Hafniens;  
Coll. Med. Edinburg. In Supremo Senatu Reip. Bernensis.  
ducentum Viri.*

D E

## PARTIUM CORPORIS HUMANI

P R Æ C I P U A R U M

FABRICA ET FUNCTIONIBUS

OPUS QUINQUAGINTA ANNORUM.

T O M. III.

ELEMENTA SANGUINIS.



BERNÆ & LAUSANNÆ;  
EX PRELIS SOCIETATUM TYPOGRAPHICARUM.

---

M. DCC. LXX. VIII.



THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY



THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY



THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

THE  
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY



*I L L. V I R O*

CUJUS SUMMO INGENIO  
NIHIL DIFFICILE EST

SUO IN VINDICANDO VERO SODALI

FELICI FONTANA

GRATI ANIMI ET MERITÆ VENERATIONIS ERGO

D. D. D.

HALLERUS.





## P R Æ F A T I O.

**S**ERIOUS si hoc volumen prodiit, partim rerum mearum conversus status in culpa est, partim bibliopolarum secessio, inque novam societatem coeuntium pene necessariæ moræ, partim experimenta, quæ de pullo incubato numerosa interim edidi.

Levis hæc culpa est, majorem vereor ne commiserim in parte operis, quæ pene tota in hypothesi versetur, aque anatomes luce remotior, ex mera speculatione, sit repetenda. Dicenda fuerunt, quæ ipse non viderim, chemica imprimis experimenta; dicenda, quæ nemo mortalium vidit, & in elementis corporis animalis *Naturæ* occulta potestas regit, exemplo secretionum.



Priora corrigere neque vitæ genus fivit , neque certe vehementer concupivi. Ab egregiis viris summa cum cura factæ analyses , in maximis explorandi sanguinis ponderibus , haud facile a me quidem emendari potuerunt.

Quæ nemo vidit , quæ ex mentis speculantis meditatione repetuntur , studui ut quam facillimo sermone proponerem , neque spem facerem majoris certitudinis , quam quidem ipsa in re præstiturus essem. Lætus autem ad respirationem exponendam redeo , quæ & ab anatome declaretur , & a vivis animalium incisionibus , & a notissimis experimentis , quæ aeris indolem declarant. Ad eum ergo laborem me transfero , ad quem Deus ipse mihi otium concessit , qui in quietæ patriæ silentem recessum me duxit , ubi præter mea studia neque officia mihi fere superessent , neque voluptas ulla.

His dum finem impono , video Ill. ALBINI  
Adnotationum L. IV. cui summo viro



acrem cenfuram mihi imprimis opponere visum est, discipulumque fui amantissimum, a quo tot locis cum merito quidem, sed tamen grato, sed voluntario, sed vividissimo suæ venerationis testimonio, laudatus esset, opprimere, quantum quidem in tanta auctoritate potest, non est dedignatus. Nunquam equidem id obtinebit, quin memor sim scholarum, quas ante 32 annos apud eum frequentavi, quin juventutis meæ Præceptorem æternum suspiciam, quin honores ejus pergam ornare. Id unice ne Ipsi quidem displicuerit, si lineas, quæ adeo vehementer ipsi displicuerunt, hic interpretatus fuerim.

WACHENDORFIUS fuit, olim vir morum suavissimorum, qui propriis ad me datis literis conquestus est, de silentio, quo communis noster Præceptor membranæ pupillaris WACHENDORFIANAM descriptionem præterierat. Non veritus est mecum queri, suumque apud me dolorem deponere, quem noverat, ejusdem membranæ, pro-



prios per meos labores detectæ , inventione me ipsi facillime cessisse , quam primum priora Viri optimi jura pervideram *a*.

Nunc de fabrica non vasculosa corporis agitur. Illam quidem refutaverat ALBINUS, refutaveram ego , etiam Illustri nomine ALBINI citato. Sed erat certe multa pars mea , quam potuerat PRÆCEPTOR in discipulo laudasse , si perinde , ut ego soleo , discipulorum laude lætaretur. Dissolvi in aqua membranas corporis humani aut plurimas , aut omnes , & vidi in cellulosas , solidas squamas discedere. Non ex intertextis vasis ergo , sed flocculis filisque fieri , quodcumque esset membranosi , experimentis confirmavi.

Dudum , & anno 1747. in primis lineis , iis periculis usus fueram , dudum noster SCHOBINGERUS suis in thesibus anno 1748 eadem proposuerat : eaque experimenta ,

---

*a* Ea epistola inter amicorum epistolas nunc prodit.



ut nunc quidem recordor , non erant neque  
aut a KAAUWIO , aut ab Ill. ALBINO facta.

Potuerat Ill. ALBINUS , cum opinionem  
contrariam refelleret , horum laborum memi-  
nisse , neque ego , si Providentia vices  
nostras commutasset , hanc opportunitatem  
innocentissimæ cupedinis benefaciendi mihi  
passus essem eripi. Id adnotavi , non meo  
nomine , sed tamquam scriptor diarii. Aliter  
enim in diario , aliter nostro nomine scri-  
bitur , cum illo quidem loco publicam , &  
ab omni proprio alienove amore puram  
personam , sustineamus , hactenus aliquanto  
liberiores , ut de nobis ipsis loqui & possi-  
mus , & aliquando debeamus.

Legem in Belgio latam neque officere  
potuisse Germani hominis in edendis BOER-  
HAAVII scholis libertati : neque post annum  
1750 contra me produci debuisse , cum  
anuo 1742. *b* unicus heres BOERHAAVII ,

---

*b* COMES THOMSIUS cujus epistola propediem inter alias  
amicorum epistolas edetur.



non sine significatione suæ amicitiae , meam editionem adoptaverit : neque oportuisse cum notariis turpissime maculosorum libellorum BOERHAAVII , a Bibliopolis editorum , de quibus vir beatus conquestus erat , meas , utcunque non perfectas , prælectiones eodem loco haberi , æquus ipse sentiet ALBINUS , quando depositis iris rem ipsam , non personam hominis expendet , si quidem ea , maximo certe meo cum dolore , ipse odiosa est.

*Rupe in Aquilegiensi Bernensium ditione .*

*Novembris die 13. anni 1759.*



*A D N O V A M E D I T I O N E*  
*P R Æ F A T I O.*

**V**OLUMINIS tertii exiguitatem est ut deprecem, quod multo sodalibus brevius sit. Verum de motu sanguinis per vasa, ejusque motus effectus tractatum aut dividere opportuisset, aut enormem hujus ipsius Tomi molem facere; incommodum brevioris Tomi minus mihi visum est.

In nova editione pluscula mutata fuerunt, maxime in Sectione II, qua de elementis sanguinis agitur. Non potui de electrica materie, non potui de phlogisto filere, quam utramque materiem inter sanguinis elementa præcipua, eaque numerant, quorum efficacia mortuas alias humorum particulas incitat, vitæque causa est.

Breviter equidem; neque enim ausus sum, in re nova, mihi per propria experimenta non perspecta, in minuta quæque



me diffundere , neque fatis confirmata sunt , quæ de utriusque elementi phænomenis prodierunt & supersunt , qui de ipso etiam novorum experimento eventu dubitant. De calore , & eo potissimum , quem in aere circumposito corpus humanum , cum vita superstita , ferre potest , nova experimenta existant , quæ nostris prioribus subvenerunt , & coegerunt me , ut ordinem sermonis mutarem , ne omnino similium testimoniorum nimia turba fieret. De globulorum etiam colore , figura , fabrica existant egregia nupera Cl. virorum experimenta , tantum ut aliqua a meis undique aliena sint , quæ cum meis audiisse oportuit. Nihil autem inveni causæ , cur a prioribus meis effatis recederem. De duplici coagulabili lymp̃ha Anglorum nova est hypothesis : neque enim mihi etiam in eorum descriptionibus causæ videtur esse fatis , cur duo elementa , undique sibi similia , & nullo alio discrimine separata distinguerem , præter facilitatem paulo majorem ad coagulationem , quam serum ab

igne patitur, & cujus coagulabilis indolis limites putredinis initia, & calor externus, & cibi ratio, & mille aliæ causæ mutant. Cæterum in his elementis multa non dubie parum plena, multa hiulca: incerta tamen, & de quibus justis dubiis fit locus, non puto superesse, adgniturus si videretur.

Analyfes sanguinis nimis fere fufas deprecor: laborem exhauseram ponendorum calculorum, ut pondera elementorum sanguinis ad drachmas librasque reducerem; eum forte laborem neque totum, in nova editione defiderari mihi non utile vifum est, neque in aliquod compendium reduci poffe fperavi. Minus etiam cæterum hæc mihi placent, quod nihil fit mei, nunquam enim ea mea fuit felicitas, ut inter tot alterna vitæ officia in chemicis laboribus proficerem.

Quartum, quintum & sextum Tomum intra hunc annum, qui decurrit, de prelo fpero proditurum, neque mora per me erit, quin proxime fe nunc volumina fequantur, cum fupra dimidiam operis partem dudum abfolverim.

*Bernæ D. 3. Jul. 1777.*





# ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

LIBER QUINTUS.


## SANGUIS.



### SECTIO. I.

#### AD SANGUINIS HISTORIAM IN UNIVERSUM CONSIDERATI.

§. I. *Quantum sanguinis in vasis humani corporis contineatur.*

 IN arteriis, venisque, quas diximus, & per cordis caveas, universumque corpus animale, vitalis humor circumit, quem in homine, & bestiis, ubicunque rubet, *sanguinem* veteres dixerunt, *cruorem* enim peculiariter eam sanguinis portionem dicemus, quæ ruborem sibi proprium sola possidet. Insectorum succos, qui sæpe alterius coloris sunt, san-

guinem vocare non solent. In eo nunc humore multa sunt, quæ physiologum contemplari oportet: primum & simplicissimum videtur, ut quantitatem, ut aiunt, sive unciarum numerum definiamus, quas universus sanguis pendet. Eam enim vitalis humoris copiam, & ad definiendum circuituum tempus, & ad terminandam sanguinis portionem, quam sibi singula viscera sumunt, & ad alia necesse est cognoscere. In morborum demum curatione videtur, temerarium esse medicum, qui sanguinis non paucas libras detrahat, neque tamen mensuram teneat necessarii humoris, absque quo vita superesse non possit, cujus si majorem aliquam portionem removeris, cordis vires labascant, & animal, etiam multo retento sanguine, tamen pereat *a*.

Sed ea quidem quæstio non est facillima. Promptum equidem videtur, animali vivo arteriam incidere, donec amisso sanguine intereat: tunc sanguinis pondus cum totius corporis pondere conferre, deinde corpus animalis cum humano comparare, & pro ratione ponderum utriusque, sanguinis in hominis vasis circulum obeuntis pondus æstimare. Hanc viam ingressus Cl. olim medicus *Allen Moulins* *b* in ove 118. librarum sanguinis libras quinque reperit, cum parte quarta, ut totius animalis pars fere 23<sup>ia</sup> sanguis esset. In eodem animale quatuor libras sanguinis *Harveius* repererat *c*, uncias vero 68 Cl. olim

*a* L. IV. p. 94. Ed. 1757.

*b* *Phil. Transact.*, num. 191. 48.

*c* *Exerc. de circul. sang.* p.



vir, *Edmundus King d.* In agno triginta libras pendente<sup>d</sup>, cum semisse, sanguinis sesquilibra fuit, quæ est pars animalis fere vigesima *e.* In anate librarum duarum, unciarum quatuordecim, cum quinquaginta granis, sanguinis fuit uncia, cum drachmis quatuor, & granis 53, quæ portio est totius animalis pene trigesima *f.* In cuniculo, cujus pondus erat unciarum decem, drachmarum septem, granorum quinquaginta, sanguinis fuerunt drachmæ duæ, grana 57 cum dimidio, quæ denuo pars totius animalis est trigesima *g.* Ex his rationibus deduxit Vir Cl. posse sanguinem haberi pro parte totius corporis animalis vigesima, atque adeo hominis adulti sanguinem ad octo libras æstimari posse. Neque ab iis calculis recessit Cl. olim archiater, *Martinus Lister h.*

S. II. *Quid in iis calculis ponendis desiderari possit.*

Multa tamen sunt, quæ non sinunt his calculis fidere. Nam experimenta primum dissentiunt. Ita ex cane 48 librarum, apertis arteriis, sanguinis libras quinque, partem adeo universi corporis pene decimam, eduxit *Carolus Drelincourt i*, quatuor vero libras *Bartholomæus de Moor k*,

*d Phil. Transact. n. 25.*

*e Moulins l. c.*

*f Ibid.*

*g Ibid.*

*h Phil. Transact. n. 270.*

*i Canicid. I.*

*k Instaurat. Medic. p. 50.*

quæ est pars fere duodecima. Ex bove, incisus vasis, 33 sanguinis libræ *l* effluxerunt, exque alio 46 libræ *m* cum semisse, cum bovis pondus esset 500 l. atque adeo sanguinis portio fuit pene undecima. Ex equo libræ 28, exque alio 44 collegit, Cl. noster olim Collega *Stephanus Hales n.*

Deinde aliæ causæ sunt, cur *Moulini* experimentum veram sanguinis copiam non definiat. Nempe dudum *Jacobus Primirose o*, inde *Keilius p*, & nuper *Stephanus Hales q* ostenderunt, ex animale vivo, cui arteria aperitur, & sanguis ad mortem usque effluit, non omnem sanguinem exire, qui toto vasorum systemate continebatur. Plurimus enim sanguis in arteriis minimis venisque *r* etiam majoribus superest, quando ex jactura sanguinis animal periit, neque enim tum demum exspirat, quando universus de corpore sanguis exhaustus est. Equi equidem, in experimentis Cl. *Hales* perierunt, quando sanguinis columna ex incisa arteria ad duos pedes cum uncis quinque *s*, & ad uncias demum decem supra duos pedes *t* subsiliit, manifesto argumento, minime contemnendam sanguinis copiam in arteriis ipsis inque venis super-

*l* Slegel de motu sang. p. 104.  
*m* Hales philos. exper. p. 91.  
*n* Idem hæmastat. p. 8. add.  
*Thomson* dissert. med. p. 42.  
*o* De circ. sang. p. 4.  
*p* De quantit. sang. a princip.  
*q* Hæmastat. pag. 7. 14. 16.  
*Teichmeyer* anthropol. Senac  
 in *Heisterum* ed. nov. p. 506.  
 Sanguinis ne dimidia quidem

parte emissa animal. perit *Primirose* in *Harv.* p. 41.

*r* Ibid. Venæ plenæ & aliquid in aorta & corde. Venæ cavæ sanguine plenæ, cum arteriosus sanguis effluxisset *Drelincourt* Canicid. 1.

*s* Hæmastat. p. 16.

*t* p. 11.



fuisse. Venæ sectio nimia parum sanguinis emit-  
tit, etiam quando plurimum detrahimus, &  
tamen subito occidisse visa est v.

### §. III. *Ut rectius ineantur.*

Aliam ergo viam alii Clari x viri ingressi  
sunt. Collegerunt ex historia medica exempla ho-  
minum, qui maximam vim sanguinis de naribus,  
aut de alia corporis sui parte amiserunt. Nunc  
si lenta hæmorrhagia fuerit, multa ea major est,  
quam in subitis illis sanguinis jacturis fuerit, quæ  
de violato majore vase erumpunt. Nam in lento  
malo humores tenuiores y, qui subtiliora vascu-  
la permeant, in evacuata vasa rubra per vim  
derivationis z succedunt, massamque sanguinis  
augment. Quare unice iis utemur exemplis, in  
quibus intra breve tempus ea sanguinis copia de-  
cessit, quam ad æstimandam universi humoris  
vitalis copiam adhibemus. Tuto vero poni po-  
test, aliquanto plus, etiam in his exemplis, san-  
guinis in corpore hominis fuisse, quam quidem  
amisit, cum debilitata vis cordis, quæ mortem  
præcedit, non possit de minimis vasculis adtrac-  
tum ad parietes vasorum sanguinem expellere.  
Deinde, cum hi homines pene omnes cum sani-  
tate reconciliati fuerint, necesse est non mini-  
mam portionem vitalis humoris in vasis super-

v Zacutus Lusitanus prax. ad- nov. p. 391.  
mirab. Lib. III. obs. 143.

x Keilius l. c.

y Quesnai de la saignée ed. 8c.

z Descripta in second Mém.  
sur le mouv. du sang. p. 336.

fuisse, qui ad restituendam & alendam vitam, cordisque necessarium stimulum suffecerit.

Ex naribus amissæ libræ novem sanguinis : inde animi deliquium, eventu felici *a*. Decem librarum de naribus jactura, absque malo eventu *b*, & undecim *c*. Duodecim sanguinis libræ, unica nocte vomitu rejectæ *d*. Floridi sanguinis libræ 14 intra 24 horas egestæ *e*. Hæmorrhagia narium librarum 15 *f*. Vomitus octo pintarum sanguinis, sive librarum sedecim in splenetico *g*. Octodecim libræ de naribus amissæ *h*, & libræ 22 *i*. Totidem libræ de pulmone rejectæ *k*. Qui 20 libras nigrarum dejectionum, neque semel emisit, tamen is sanus evasit *l*. Hæmorrhagia 20 & ultra librarum, cum placenta supra os uteri adnata secessisset *l*\*. *Henkel* Diana Estensis 22 sanguinis libras ex naribus amisit, neque ideo periit *m*. Ex venis raninis sanguinis 24 libræ fluxerunt *n*. Intra 24 horas 29 libræ coacti sanguinis vomitu excretæ *o*. Triginta librarum hæmorrhagia per nares *p*, & quadraginta intra

*a* *Henr. de Heers observ. op- savola apud Keilium p. 11.*  
*pido rar. p. 66.* *i* *Anat. Lusitan. ad hist. 130.*

*b* *Rosetti nov. system. p. 18.* *Centur. 11.*

*c* *Lancis. de mort subit. L. 11. c. ult.* *k* *Linden de circ. sang. n. 16.*

*d* *Ofray de la Mettrie Comment. in Boerb. T. 11. p. 413.* *l* *Cardan in aphorism. hipp.*

*e* *Spindler obs. 44.*

*f* *Sacchi medicin. theor. pract. p. 28.* *l\** *Henkel neue Sammlung.*  
*m* *Idem ibid. p. 347, ex Bras-*  
*savola.*

*g* *Bartholin. Centur. I. hist. 87.* *n* *Buchner miscell. ann. 1730.*  
*p. 1062.*

*h* *De Heyde discurs. pag. 11.* *o* *Solénander Consil. Med. Sect. V. p. 488.*  
*Rhod Centur. I. obs. 90.* *p* *Baronius de pleuroperipneumonia p. 239.*



quatrimum *Sartorius* *p*\*. Sanguinis enormis vis vomitu reddita, ad 15. 27. 30. 24. 18. & in eodem paroxysmo libras, ut summa amissi sanguinis esset librarum 202, neque tamen eo minus æger convalesceret *q*. Intra quadrimum jesuita 40 lb. amisit *q*\*.

Postquam hæc testimonia produximus, licet aliqua exempla adjecisse, in quibus non subita adeo jactura, sed adeo tamen immensa fuit, ut omnino suppeditari nequisset, nisi magna sanguinis vis in vasis humanis contineretur: etsi facilis dederim, & remissos in vacua vasa succos non rubros, & de cibis, quantumcunque in sanguinem verti potuit, hanc molem auxisse. In Angola *P. Carli* quotidie tres quatuorve sanguinis libras per nares amittebat, cum parcissime viveret, & intra biennium nonagies septies venam sibi secari pateretur *r*. Hominis, qui frequentissime venam sibi secabat, & sanguinis singula vice triginta & quadraginta uncias emittebat, meminit *Henricus de Heers* *s*. Quæ 1020<sup>es</sup> in 19 annis venam secuit, ob morbum hystericum, ea ex erumpente per uterum sanguine demum sana evasit *t*. Virginis de Pisana gente celebris historia est, quæ omni mense uncias sanguinis 125 amisit, neque paucis annis; & intra 14 menses partim alternis diebus, & partim quotidie, ve-

*p*\* Admirand. hæmorrhag.

*r* Hist. génér. des voyages L.

*q* Irenæus Vehr casus ægri XII.  
sang. vomentis.

*s* Obs. 27.

*q*\* Journ. des Savans 1663.  
T. XI.

*t* Journ. de medec. 1757. Mai.

nam sibi fecare passa est *v*. Libræ 412 sanguinis intra annum amissæ, teste Ill. *Tissot v\**. Alia librarum sanguinis mille intra annum amissarum historia exstat *x*; alia hæmorrhoidum, per quas totis continuis 62 diebus, quotidie libræ sanguinis quinque perierunt *y*: alia juvenis, qui intra decem dies sanguinis libras 75 perdidit *z*.

Verum, utcunque has inmensas sanguinis jacturas interpreteris, certum est ex prioribus, sanguinis libras non paucas per vasa nostra circumfluere. Nimis parcus est *Theophilus Lobba*, qui sanguinem decimam sextam totius corporis humani partem æquare persuadetur, etiam parcius *Richardus Lower b*, qui decimam quintam. Ex iis enim calculis vix decem in adulto homine sanguinis libræ containerentur. Propius utique ad verum aut *Franciscus Quesnai* accessit *c*, qui 27 libras sanguinis admisit, aut *Fridericus Hoffmann d*, qui viginti & octo, quæ ratio est ad mediocrem hominis molem, ut 1 ad 5. Nam octoginta libras *e*, centum *f* & ultra de humoribus & fluida parte corporis universa admittere possis, nimias tamen futuras, si de vero sanguine fumerentur.

Neque dissimulandum est, obiter hæc & vage

*v* Ejus historiam dedit P. Ant. Michelottus.

*v\** Opusc. var. p. 299.

*x* *Thurneiser vom Urin* L. VI. p. 51.

*y* *Lettere al D. Curzio* p. 34.

37.

*z* *Act. Erud. Lips.* ann. 1698.

*a* *Of fevers* p. 278.

*b* *De corde* C. III. p. 170.

*c* *De la saignée* nov. ed. p. 46. 47. Humorū molēni facit 120 l.

*d* Apud *Schulze* in præjudicat. opin. de venæ sect.

*e* *De sanguine* *Hamberger* physiolog. p. 3.

*f* *Keil* p. 39.



definiri. Infinita enim procul dubio in ratione sanguinis ad reliquam corporis molem varietas est, & in similibus tantum hominibus ea lex admitti potest *g*, quæ sanguinis copiam in diversis mortalibus in triplicata statuarum ratione facit. Nam cæterum, quo plus in corpore adipis est, eo minor procul dubio sanguinis est portio, quæ ad rationem novi auctarii ponderis minime crescat. Sed etiam juniori *h* homini, aut animali, plus sanguinis est, per experimenta, quam seni vetulove. Hinc recens nato homini cutis universa, & ipsa cornea oculi tunica rubet, quæ omnia sensim diminuta sanguinis portione, per ætatem exalbescunt *i*. Plus etiam fero animali sanguinis est, quam domestico, & in universum, sanguinis pondus eandem rationem ad reliquum corpus obtinet, quam cor observat *k*. Minoribus adeo animalibus plus sanguinis inesse videtur, quam quidem grandibus, non absque suspitione, ob eam causam calidiora esse. Deinde inter pisces, quicunque calent, ii plurimo cruore abundant, phocarum exemplo *l*, in quibus incredibilem vim sanguinis esse legimus: forte quod in maxima receptacula venosa congestus confestim per vulnere effluat. Contra in piscibus frigidi sanguinis, & in serpentibus parcissimus sanguis est. Ex multis anguillis ægre aliquot

*g* Sauvages p. 14. in notis ad *Halesium*.

*h* Lister de humorib. p. 6. ex *Molini* experimentis. *Rosen* anat. beskrifn. p. 138.

*i* Rosen ibid.

*k* L. IV. p. 431.

*l* Martens Spizbergische Reisen p. 77. In leone marino *Byron voy.* p. 296.

uncias collegit Cl. *Vincentius Menghinus m.* In crocodilo sanguis minorem ad totum animal rationem habet *n.* In vipera, quæ drachmas pendebat triginta cum semisse, non supra 80 grana sanguinis fuerunt, quæ portio est totius animalis vigesima o septima, ut adeo quintuplo, & ultra parcior his animalibus, quam homini sanguis insit.

Cæterum hujus sanguinis copiam, si in arteriâs & venas distribuere volueris, & arteriarum diametrum ad 3 æstimaveris, venarum ad duo *p*, cum parem utriusque systematis longitudinem ponere possimus, reperies, in arteriis quidem quatuor partes, in venis novem contineri.

In diuturnis morbis sanguinis penus sæpe ita exhausta, ut pene nullus supersit *p\**. *Guilielmi III* cadaver totum exsangue fuit *p\*\**.

§. IV. *Neque enim arteriosus sanguis a venoso differt. Qui differre scripserint.*

Idem in arteriis inque venis sanguis est, neque enim sanguinis evictus circuitus discrimen admittit, cum nihil in arterias veniat, nisi quod cor ex venis accepit. Insedit tamen medicorum

*m* Ex centum anguillis unicam *Comm. Bonon. l. c. p. 251.*  
*n* *Hasselquist resa til Palæstina p. 295.*  
*o* *Mém. de l'Acad. des Scienc. 1732. p. 26.*  
*p* *L. II. p. 133.*  
*p\** *Journ. de med. 177c. Jan.*  
 In vivo vix duas uncias fuisse

*Heuermann Untersuch. p. 362.*  
*Schelhammer de pulsu pag. 67.*  
 Incidisse se corpora, quibus non supra duas sanguinis uncias superfuere J. de Gorter *perspir. insensib. p. 385.*  
*p\*\** *Bibl. anat. Tom. III. p. 394. ex Rongeati testimonio.*



animis contraria & perantiqua opinio, quæ ex hypothefi primum nata, etiam nunc hypothefeos neceffitate fe tuetur. Nempe diverfi generis humorem in arteriis, & in venis veteres pofuerunt, non ii quidem adeo contra fua principia, qui diverfam utriufque fanguinis originem recepiſſent. Primus adeo *Eraſiſtratus*, ſincerum in arteriis ſpiritum contineri, in venis vero fanguinem, cum fua ſecta docuit *q*. Ita apud *Ciceronem* legimus *r*, ſpiritum ex pulmone in cor recipi, & per arterias diſtribui, fanguinem per venas. Ita *Rufus*, cordis ventriculum dextrum fanguineum, ſiniſtrum pneumaticum vocat, cum ab accepto ſpiritu moveatur *s*. Sed *Galenus* etiam, cum *Eraſiſtrati* placita ſtudioſe everteret *t*, tamen arterioſum fanguinem a venoſo diſtinxit, illumque ex venoſo quidem per ſepti cordis poros penetrante ſanguine natum, cæterum ſpiritu, ſive aëre a pulmone recepto ditari, flavumque, & floridum eſſe, & vitam partium corporis animati unice ſuſtinere docuit, cum interim venoſus cruor, his dotibus deſtitutus, eaſdem partes nutriat. Denique *Aretæus* *v* perinde fere, uti nuperi ſcriptores, fanguinem ex arteria flavum, tenuemque fluere ſcripſit, a vena craſſum, ut tamen adderet, arterioſum difficile ſpiſſeſcere, venoſum facile.

*q* Apud *Galenum* de *Hipp. & Platonis decretis* L. VI. c. 7. & in libello nuperius ſcripto, an ſanguis natura in arteriis continetur.

*r* De natura deorum L. II. p. m. 603.

*s* De appellat. part. L. II. p. 59. edit. *Clinch.*

*t* an ſanguis natura in arter. contin.

*v* De cauſis & ſignis Acutor. L. II. c. 2.

Cum *Harveius* sanguinis in orbem iter detexisset, vix poterat hæc recepta utriusque sanguinis diversitas firma manere. Non solum enim idem in arteriis sanguis est, qui in venis fuit, sed præterea rapidissimus sanguinis circuitus facit, ut idem nunc ex arteria sanguis fluat, qui ante non plenum horæ minutum venosus, per arteriam pulmonalem advenit. Quare *Harveius*  $\alpha$ , primique circuitus sanguinei statores, arteriosum sanguinem aut ægre a venoso differre, aut nihil quidquam, communi fere consensu docuerunt  $\gamma$ , neque in colore discrimen admiserunt, neque in densitate, neque in elementis, in quæ sanguis resolutus discedit. Neque remotus ab ea sententia *J. Dominicus Sandris*, in homine & similibus animalibus leviter a venoso sanguine arteriosum, differre scripsit, in phocæna vero, castore, erinaceo, quæ pro frigidis animalibus habebantur, nullum utriusque discrimen esse  $\zeta$ . Contra, qui circuitum sanguinis recusabat admittere, *Homobonus Pisoni* antiquam illam differentiam restituit, sanguinisque venosi alium colorem repetiit  $\alpha$ .

Verum, cum paulo post *Harveium* plerique physiologi nitrum æereum in sanguinem recipe-  
rent, quod ruborem, aliasque dotes humani vitali conciliaret, rediit antiqua opinio, quæ aliquid

$\alpha$  Exercit. II. p. 221.

$\gamma$  *Joh. Walæus* de motu chyli & sanguinis apud *Bartholinum* edit. I. p. 386. edit. IV. p. 762. *Bartholinus* ipse edit. IV. anat. renov. p. 380. *Plem-*

*pius* in *fundam. medic.* p. 127. Deinde *Lister* Exerc. anat. II. p. 256. *Prior Severinus* phocæ anat. p. 41.

$\zeta$  De sanguine p. III.

$\alpha$  *Ult. antiquit.* p. 40.



in arterioso sanguine posuit, quo super venosum excelleret. Deinde cum nuperius in pulmone sanguinem densari docerent, inque minus volumen comprimi, etiam ex ea præjudicata opinione, vestigia novæ hujus densitatis in arterioso sanguine conspici, Cl. ejus sectæ auctores scripserunt. Ergo sanguinem arteriosum floridum, pulchre rubrum, venosum obscuri coloris esse, communis fere a *Lowero* Scholarum doctrina fuit *b*. Id discrimen ab aëre nasci, qui sanguinem in pulmone mutet *c*, fere undique consentiunt, licet in modo, quo aër eam mutationem efficit, varie opinentur. Quare addunt, etiam absque pulmone, aërem flatu cum sanguine venoso commistum, novum ei ruborem suppeditare *d*: & contra, suppressa respiratione, aut aspera arteria lino intercepta, carotidis sanguinem æque obscurum de vulnere prodire, ac quidem venæ cavæ cruor *e*. Addit *Johannes Mayow*, qui inter principes nitri aërei auctores est, arteriosum

*b* *Lower* de corde p. 179. *Wilke* hæmatolog. p. 83. *Kaaw* de  
*lis* pharmac. ration. P. II. p. 17. *perspir.* n. 463. *Schreiber* in  
*Ed. Angl.* IV. *Swammerdam* de *Elem.* p. 342. 343. &c. *Ham-*  
*respir.* p. III. *Leal* *Lealis* heb- *merschmidt* de sanguin. arter.  
*dom. febril.* p. III. *Duverney* & venosi discrim. p. 21. *Klan-*  
*mémoires de l'Acad.* avant 1699. *ke* de ven. p. 29. qui diversita-  
*T. I.* p. 197. *Mémoir.* de l'Acad. tem exiguam reperit.  
*cad.* 1701. p. 238. *Slare* philos. *c* *Schreiber* l. c. &c. de venæ  
*transact.* n. 204. *Lancis.* l. c. pulmonalis sanguine.  
*p.* 21. *Verheyen* L. II. p. 178. *d* *Lower* l. c. *Helvetius* mé-  
*Helvetius* *Mémoir.* de l'Acad. *moir.* ann. 1718. p. 233. éclair-  
*des Scienc.* 1718. p. 297. *Eclair-* *ciss.* p. 2. *Bertier* physique des  
*cissement* p. 17. *P. A. Miche-* *corps animés* p. 66.  
*lottus* in *Epist. ad Fontenellium* *e* *Lower* l. c. edit. 1722. *Hel-*  
*p.* XXIII. XXV. &c. *Schwen-* *wetius* éclairciss. p. 2.

sanguinem in spatio inani validissime ebullire, venosum lentius *f*.

Nuperiores enim scriptores aliqui, suis aliunde meritis illustres, sanguinem arteriosum calidiorum fecerunt, ut caloris ratio, ad venosi sanguinis calorem esset, uti 97 ad 94, uti 100 ad 95, uti 99 ad 97 *g*.

Verum in aliis sanguinis dotibus omnino Cl. viri in diversum abierunt. Hæc quidem opinio, quam novissime dixi, cum ea consentit, quæ sanguinem arteriosum venoso rariorem facit, minusque ponderosum, quo quidem olim *Aretæi* locus inclinatur *h*, deinde *M. A. Severinus i*, *Georgius Ent k*, *Archibaldus Pitcairn l*, *J. M. Lancisius m*, *Petrus Antonius Michelottus n*. Addit *Idem* duorum experimentorum fidem, in quibus venosum sanguinem pondere reperit superasse. Non ita dudum auditor noster *J. Andreas Hammerschmidt*, experimentis etiam institutis, sanguinem arteriosum leviorum reperit, ut ejus ad venosum ratio esset, uti 1404 ad 1414 *o*. *Idem* venosum celerius exaruisse vidit, quod nempe

*f* De nitro aereo p. 132.

*g* Schwenke p. 31.

*h* p. 7.

*i* Duplum feri inesse, si cum venoso comparaveris apud *Schelhammerum de lymph. & de aq. pericard. conf. Bartholin. hist. 29. Cent. III.*

*k* Paulo ferofiore esse, cum in corde aliqua portio olei consumpta sit, in *apologia pro circ. ed. Londin. post. p. 31.*

*l* Leviores aliquanto parti-

culas facit, quæ colore sint floridiori de causis diversæ molis qua fluit sanguis per pulmonem animalis nati & non nati *n. 23.*

*m* l. c.

*n* l. c. p. 22. 42.

*o* Nempe in eodem volumine sanguinis arteriosi reperit drachmas 23. grana 24. venosi vero drachmas 23. grana 34. p. 19.



& rubicundiorē. Citius concreſcere, plus ſolidarum partium continere videretur. Calidiorē nuper *David* fecit *o\**. Magis animalifatū *D. Wilſon* *o\*\**, cum ſanguis arterioſus minus de animale natura haberet.

Alii contra, qui ſanguinem in pulmone cogi docuerunt, ab ipſa ſua theoria coacti, ſanguinem arterioſum denſiorem fecerunt, & ipſe princeps *J. Claudius Adrianus Helvetius* *o\*\*\**, & alii nuperiores *p*, & prius ſanguinem arterioſum facilius concreſcere *Leal* ſcripſerat *q*, uti minus ſeri continere *Helvetius* auctor eſt *r*, hinc citius cogi, firmiuſque dare coagulum. Accuratiuſ *Franciſcus Boiſſier* rationem denſitatis in arterioſo ſanguine ad venoſi cruoris denſitatem ingentem conſtituit, nempe 20. 000. 000, ad 14. 000. 000 ſive 20. 14 *s*, & *Georgiuſ Ehrharduſ Hamberger* eamdem rationem numeris expreſſit, qui ſe paulum diverſo modo habent, ut denſitas in arteriis ad venoſi ſanguinis denſitatem alias ſe habeat uti 482 ad 465 $\frac{4}{5}$ , alias uti 417 ad 407, alias uti 525 ad 515 *t*. Addit *Helvetiuſ*, a denſitate ruborem floridum eſſe, hinc etiam venoſum ſanguinem pulchre rubere, quando emiſſuſ dureſcit *v*. Duriorem eſſe etiam *Michelottuſ* *x*.

*o\** *Mémoires* 1. c. p. 234. *Eclairciſſ.* p. 44.

*o\*\** *De respir.*

*o\*\*\** *Autumn. diſorders* p. 44.

*p* *J. Fr. de la Sourdiere & Bernard* in theſ. in hæc verba. Ergo non utique corporis ſanguis idem *Pariſ.* 1743. I. N. H. *von der verdickung des blutes.* *Knolle* in lib. ejuſdem tituli.

*Hambergeruſ. Fr. Boiſſier. Fi- zes de liene* p. 122.

*q* *Hebd. febr.* p. 99.

*r* *Mémoires* p. 235.

*s* *De inflamm.* p. 244.

*t* *Phyſiolog.* p. 3.

*v* In *éclairciſſ.*

*x* *Epist. ad Fontenellium* p. XXII, XXIII.

bere lymphæ coagulabilis & colore differre Cl. Butt x\*. Frigidiorē esse Stephenson x\*\*.

§. V. *Quid in ea opinione desiderari possit.*

Continuo se vehemens suspicio offert, parum omnino in his experimentis firmi esse, quæ adeo e directo secum pugnent. Deinde si calidior arteriosus sanguis est, aut si certe venoso non frigidior est, uti vix quisquam frigidiorē facere sustinuit, qui possit densior esse, siquidem a calore raritas separari nequit?

Ego quidem nonnunquam in arterioso sanguine alium a venoso colorem in vivis animalibus vidi y, ut ille haud paulo lætius ruberet. Sed frequenter omnino, & in diversis emissis de eadem ejusdem hominis vena sanguinis patellis, & demum in eadem vena z ejusdem animalis, parem omnino diversitatem vidi, ut floridissimus sanguis flavo cruori contrarius occurreret; & in rana quidem, in qua non magnam sanguinis mutationem a pulmone speres, quem haud maximus aortæ ramus adeat. Sed etiam aliena testimonia exstant, ab idoneis profecta testibus. Sanguis primus sæpe densissimus, alter solutissimus, tertius compactus de incisa vena prodit a.

Etiam

x\* Spontan sang. separ. p. 26.

46. 47.

x\*\* *Ess. of a Societ.* at E-  
dimburg. II. p. 813.

y *Second Mémoire sur le mou-*

vement du sang. Exp. 22.

z Ibid. exp. 13. 183. & in-  
pullo incubato Obs. 43. 45. 66.

273.

a De Haen rat. med. p. 104.



Etiam vulgo innōtuit, sæpe sanguinem; qui posterior mittitur, floridiori colore esse, ut vulgo arteriosum vocent. Vidit *Johannes Freind*, sanguinem ex vena secta emissum, floridum crassumque fuisse, & serum suum plusculis horis non dimisisse, ex eodem vero homine, breve post intervallum, emissum sanguinem aqueum feroque plenissimum prodiisse *b*. Ex brachio humano sanguis spissus fluxit, cum ex pede floridus saliret *c*. In pleuritico homine, sanguis primæ patellæ floridus, in altera crustam habuit *d*. Pedum sanguis sæpe rubicundus, magis inflammatus, sanguis vero de brachio obscurior, feroque mistus uberiore prodit *e*. Feminae dantur, quarum primus *f* de vena missus sanguis ruber, alter mucosus est. Et quæ alia infinita hic adducere facile fuerit.

Sed etiam in pullis, quos ovum continet, & quorum pulmones aer non potest diducere, sanguinem arteriosum non raro floridiorem mihi visus sum percipere *g*, alias similem *h*, denique obscuriorem *i*. In suis vasis utique semper floridior videtur, quod crassiora sint, & multorum ordinum globulorum sanguinis saturâ purpura per tenuem venæ membranam sincera pelluceat, cum eum ruborem albus arteriæ pa-

*b* Locus excidit.

*c* Buchner & Eberhard diss. de sanguific. p. 50.

*d* Pisoni de circulat. sang. p. 359.

*e* Roncallus Parolinus Europ. Medic. p. 267.

Tom. III.

*f* Zwinger diss. de venæsect. pedis fallaci.

*g* Mém. sur la forme du poulet Exp. 241. 246. 281.

*h* Exp. 235. conf. 241.

*i* Exp. 78. 224.

ries temperet, rosæque reddat similiorem, & in tenuiori arteria pauciores ordines globulorum congerantur. Hinc idem in arteriis venisque æqualis diametri color fuit *k*. Ita fere sanguis venosus, dum deliquescit, dum adeo acervi globulorum minuuntur, una floridior redditur *k*\*.

Denique sæpe comparavi arteriæ pulmonalis cavæque venæ sanguinem, cum arterioso sanguine venæ de pulmone reducis *l*: nunquam, in multis experimentis, aliquam in colore utriusque sanguinis diversitatem vidi, neque *Harveius* vidit *m*, neque *Gulielmus Cheselden* *n*, neque Cl. noster auditor *Evers* *p*, neque ipse contrariæ opinionis auctor *Hambergerus* *q*.

Sed etiam alias arteriosi sanguinis prærogativas gnari in experiendo viri invenire nequierunt. Ita in pondere nullum discrimen *Jurinus* reperit *r*; nullum in calore; sic neque Cl. vir *Georgius Martine* *s*, in libro quem de eo ipso calore scripsit. Denique. cum varios succos cum arterioso pariter & venoso sanguine misceret *Drelincourtius* *v*, & *Archibaldus Pitcairn* *x*, similia

*k* Obf. 241.

*k*\* *Muschenbroek* diff. de aëre  
*Sc.* p. 10.

*l* *Second mém. sur le mouvement du sang* exp. 20. 21. 22. 23. 35.

*m* *Exerc. de circul. sang.* p. 171.

*n* *Anat of human body* p. 194. edit. 1726.

*o* *Of the cause of heat* p. 125.

*p* *In experimentis in submersis captis* Gotting. 1753.

*q* *De respirat.* p. 71.

*r* *Dissert. phys. math.* VIII. p. 104.

*s* *De animal.* p. 177. Aliquantulum frigidiorum esse sanguinem venosum, gradum tamen definiri non posse, quo differant.

*v* Apud *Manget* in *biblioth. anat.* p. 951.

*x* *Element. med. mathemat.* p. 35. sqq.



fere in omnibus periculis, & in arterioso sanguine & in venoso phænomena reppererunt. Nobiscum Cl. *Spalanzanus*, qui pariter ut ego plurimum laborem in contemplando per vitreas lentes sanguine posuit.

Si quando sanguinis arteriosi purpura elegantior fuit, eam *Harveius* y angusto vulnere tribuit, ut obscurior idem manaret, quoties per patulum vulnus elabebatur. Idem experimentum etiam *Helvetius* recepit z. Contra *Franciscus Quesnai* a arteriarum sanguinem saturate purpureum vocat, & nigriorem fuisse cordis sinistri sanguinem, contrariæ sectæ princeps, ipse *Helvetius* vidit b, adeo hæc omnia incerta sunt, & varie eveniunt in variis corporibus.

§. VI. *An in sanguine diversarum arteriarum discrimen sit.*

Varii quidem physiologici scriptores, & princeps omnino *Boerhaavius* c, sanguinem arteriæ carotidis memorabili aliqua nobilioris indolis uberiorumque spirituum prærogativa pollere docuerunt. Neque defuerunt, qui experimenta producerent, & pro ea hypothese testimonia

y *Exerc.* II. pag. 223. tum  
*Dionis cours d'anat.* p. 469.  
 z. *Mémoir.* I. c. p. 235. 236.  
 a *Oecon. anim.* T. III. p. 37.

b *Mémoir.* I. c. p. 232.

c *Prælect.* T. II. n. 235. p.

359.

Ita *Franciscus Boissier d* in sex unciiis sanguinem carotidis arteriæ septemdecim granis levio-rem fecit, quam aliarum arteriarum sanguis est. Ita noster olim discipulus *Daniel Johannes Taube e* in carotidis sanguine aliquanto plus aquæ reperit, ut feri in carotide ratio, esset ad serum in arteria femorali, uti 169 ad 132, hætenus contrarius *J. Baptiste Bianco f*, ipsique aliis suorum librorum locis *Boerhaavio g*, qui sanguinem renalis arteriæ sero abundare scripserunt. Verum ea experimenta, alioquin non satis repetita, alibi evidenti corollario comparabimus, quod a sanguinis in circulum itinere sumitur. Nullum enim viscus, membrum nullum, sibi proprium sanguinem accipit, sed ex communi penu de corde emissâ, & ipsum, quidquid habet, mutuatur, & in eandem penum omnium partium corporis animalis remissus sanguis confunditur. De carotidis sanguine dicemus *g\**. Negat de eo ipso sanguine *Albinus g\*\**.

Num venosus sanguis hepatis *h*, lienis omentive, peculiare aliquas dotes possideat, hic nondum definitio, neque possidere repugnat. Nuper *Ill. Spielmannus* sanguinem venæ cavæ cum sanguine venæ portarum comparavit. In venæ por-

*d* *Mém. de l'Acad. de Montpellier* 1743. p. 42. 43.

*e* In *diff. de sanguinis ad cerebrum tendentis indole* Götting. 1753.

*f* *Histor. hepatic.* p. 68.

*g* *Prælect. T. III. n. 359.*

*g\** *L. X.*

*g\*\** *Nat. hom.* p. 117.

*h* Omnium fluidissimum & mobilissimum esse venæ ad portas sanguinem *Fasellius* in *diff. de eo sanguine* p. 29. consentiente etiam *Ill. Meckelii* experimento *Mém. de l'Acad. de Berlin T. XII. tum Heuermannø Physiolog. T. III. p. 736.*



tarum sanguine debilis liquoris, paulum alcalini, partes 13 fuerunt, 16 alcalini, 6 fortiter urinosi & saturate alcalini; olei pars  $\frac{1}{60}$ , falis volatilis  $\frac{1}{67}$ , qui demum cum tartari fale tritus urinosum odorem spargebat: carbonis denique partes  $\frac{20}{135}$ , in eo ferrum, & fal lixiviosus.

Contra in sanguine venæ cavæ liquoris alcalini partes erant  $\frac{36}{49}$ , paulo plures omnibus computatis, quam in sanguine venæ portarum: olei empyreumatici  $\frac{5}{147}$  five pene  $\frac{1}{30}$  duplo adeo plus: falis contra volatilis minima portio non supra  $\frac{1}{490}$ , quam putes compensari per uberiores spiritum alcalinum; carbonis tantum  $\frac{7}{94}$ , & dimidio minus. In eo perinde ferrum & fal lixiviosus fuit.

Quærit vir Cl. an adeo plus sit falis, plus etiam acoris, in sanguine venæ portarum, minus olei: de eo negat, ut potius plus habeat olei. Sed de ea peculiari sanguinis in portarum vena indole alias videbimus: interim, quæ dicemus, ea omnia de omni corporis animati sanguine dicta volumus.

## §. VII. *Rubor sanguinis.*

Sequitur, ut de sanguinis colore dicamus. Verus sanguis, hominis & plerorumque animalium, etiam non respirantium, ruber est, colore in sano homine eleganter certe florido, & coccum aut æquante, aut superante. De Europæo homine alboque loquor, nam æthiopibus ab *Helmontio* *h\** nigricans tribuitur. Nuper adnotatum est, æthiopis san-

---

*h\* Schol. pass. decept. Mekei mém. de l'acad. de Berlin 1757.*

guinem emissum primum fuscum fuisse; cum admittis exiguis particulis nigris, deinde floridum & in centro placentae nigrum in ambitu fuscum. Non ergo niger est, nisi ob crassitiem laminae sanguineae *h\*\**.

In diversis animalibus aliquam in colore sanguinis diversitatem esse non repugnat, ut vitae genus aliud fuerit & victus; non quod ipse testem me dare queam, nam & in frigidis animalibus rubrum sanguinem & concrescibilem vidi, ut in rana inque bufone, & in calidis & in pullo incubato. Legi tamen in piscibus, anguillarum ad modum teretibus, sanguinem in corde nigrum esse & coactum, in cartilagineis rubrum & splendentem *h\*\*\**; equo saepe piceum & nigrum de vena incisa manare *h\*\*\*\**; & in universum utique in majoribus quadrupedibus viscidior est & densior, ut in equo vidi. In cane mihi magis glutinosus & ad coeundum pronior visus est, in ovibus potissimum junioribus fluidior. Globulorum etiam magnitudo dicitur differre, quod discrimen in tabula *Hewsonus* ex variis animalibus expressit.

Neque tamen aut in omni aetate eo colore nitet, aut in omni temperamento; aut in ejusdem hominis venis totus sincero rubore splendet. Et primo fœtui humano sanguis minus pulchre rubet, & obscurior atque fuscus magis, quam in adulto ejus color est. Deinde, si etiam propius ad primordia vitae animalis retrospexeris, rubigino-

---

*h\*\* Roume de St. Laurent ap. VII. p. 239.*

*Rozier 1775.*

*h\*\*\*\* Naturforsch. Gesellsch.*

*h\*\*\* Viq d'Azyr Mém. pres. p. 592.*



fusi exque flavo mistus, denique primis vitæ horis totus flavus *k* reperitur, & ante eum colorem, omnino pellucet *l*. Immatureo fetui humano pro sanguine flavum humorem in aorta vidit Ill. vir C. J. *Buttner*. Idem sanguis ex vitello flavo nascitur, cujus vasa rubent, quo tempore nihil in fetu non album est *m*. Quoties cordis vires diminutae languent *n*, flavus etiam iis temporibus manet, quibus in ovo bene incubato rubet.

Non ignoro hæc nuper infirmari, aque viris, quos magni facio. Verum ea certe scribo quae vidi. In minimis ramulis figurae venosae, tertio die, sanguinis purpura læta est in magnis truncis; idem die secundo rubiginosus fuit, ut adpareat, hunc rubiginosum colorem non esse a pellucente flavedine vitelli; ea enim multo magis minorum vasorum ruborem a paucis globulis natum obruisset, quam majorum. Nobiscum Cl. *Wolf*. In eandem flavedinem, ex qua per vitae vim in ruborem sanguis perfectus est, redit idem per morbos, ex vehementissimis putre-

*i Lancisus* l. c. p. 81. *Mé-  
moir. sur le poulet* T. II. p. 36.  
obf. 66. 67. 69.

*k Malpigh. de form. fetu* p.  
6. *Lancisus* l. c. p. 81. *Senac*  
T. I. p. 414. 415. *Mém. sur le  
poulet* T. II. p. 36. 180. obf.  
35. 47. 51. 53. 62. 74. 78. 80.  
93. 95. 134.

*l Mémoir.* T. II. p. 35. *Birch*  
T. III. p. 234.

*m Maitrejean* p. 53. 62. 63.  
*Buffon* T. II. p. 353. *Beguelin*  
*bibl. impart.* 1750. *Hamburg.*

*Magaz. T. XIX. p. 144. Mém.  
de l'Acad. de Berlin* 1749. *Birch*  
T. III. p. 234. Adnotant cl.  
viri, ruborem in sanguine nas-  
ci, & in figura venosa appare-  
re, quo tempore fetus ipse al-  
bus est. Inde voces D. de la  
*Casse*, cor posterius generari,  
quando vasa sanguinea jam ap-  
paruerunt *Idee de l'homme  
physique* p. 100. 101. Nempe cor  
non reperiri credit, quando  
non rubet.

*n Second Mém.* p. 36.

dinosis febribus *o*, ex serpentum pessimis mor-  
 sibus *p*, ex variis non satis certis causis *q*, ex  
 ictero, ex chlorotica debilitate *r*, & in animalibus  
 frigidi sanguinis pauci *s* languentis bestiolae  
 globuli in venis sub mortem flavent. Sola ex aëris  
 insigni mutatione Europaei in fervidis Americae in-  
 sulis continuo flavescent, & a multa venæsectione  
 pallor diu saepe ipsis adhæret, aque febribus inter-  
 mittentibus. Sed etiam in cellulosas telas effusus  
 sanguis, quoties resolvitur, ex pene nigro rubore per  
 cæruleum & viridem colorem in flavedinem tran-  
 sit *t*, ut omnino a sanguine flavedo non aliena sit,  
 etsi fani, adultique hominis, aut animalis sanguis,  
 etiam in aqua dilutus, nullum flavoris vestigium  
 ostendit *v*. Non ignoro Cl. virum, & quem pluri-  
 mi facio, *Spalanzanum v\**, flavum colorem glo-  
 bulorum sanguineorum non admisisse, & flavedi-  
 nem a me visam luci refractae tribuisse, qua ego  
 usus sum. Verum lentis vitreae usus in colore  
 certe mutando nihil potuit. Nam in robusto  
 animale solitarii globuli, unica serie mesenterii  
 vasa percurrentes, ruberrimi mihi visi sunt, aut  
 certe albi fulgidi cum læto rubore, nunquam fla-  
 vi; languidi contra animalis glomerati globuli con-  
 stanter flavi adparuerunt, cum eadem luce uterer.

*o* Edim. ess. ed. IV. T. II. art.  
 29.

*p* Ut aspidis *Hasselquist reser-  
 til palestina* p. 596. viperæ cau-  
 disonæ *Fevillée*, viperæ Euro-  
 peæ *Cardan in aphorism. Hipp.*  
 p. 313. *Fränk. Anmerk. T. II.*  
 p. 244.

*q* Sanguis in calculoso flavus  
*Klaunig nosocom. p. 85.*

*r* *Mieg de plant. nasturcin.*  
 p. 42. *Boerhaave prælect. T. II.*  
 p. 295. 296.

*s* *Second mém. sur le mouv.*  
*du sang Exp. 16. 19. 223.*

*t* *Schwenke p. 120.*

*o* *Gaubius inst. patholog. p.*  
 159. 160.

*v\** *Fenom. della circolaz.*



Ultra flavedinem color sanguinis in decolorem denique colorem nonnunquam in cachecticis & phlegmaticae temperiei hominibus redit. Crystallinum sanguinem cordis *Santes Zarini* x, mere pituitosum *Rhodius* descripsit y, tenuem & decolorem in homine pene fame enecto *Kirkland* z. De scorbutica femina sanguis post plurimam jacturam albus exiit a.

Sed etiam albus nonnunquam adparet, aut vitiose totus, aut sanus, sed chylo nondum subacto, neque mutato mistus. Et crustam quidem pleuriticam hic omittimus: nam etiam in aliis diuturnis morbis, aut in minus firma valetudine, quando ad malum habitum corpus declinat, pars magna sanguinis in album & subcaeruleum coagulum abit b, atque haec albedo a chylo, quem citabimus, omnino differt. Albus erat sanguis & valde coagulatus, quem *Ill. Senacus* dixit c.

Nempe in vivis animalibus chylum albo suo colore conspicuum, saepe per vasa sanguinea oberrare, de vulnere fluere, aut in cor ipsum apertum de auricula effundi vidi d. Ita quatuor, aut quinque a capto cibo horis lac in carotide vivi canis *Lowerus* reperit e, & similia sunt *Thomæ Schwenke*, clarissimi medici f, & *Joannis Bohnii* g, & *J. Gothofredi de Berger* h experi-

x P. II. hist. 7.

y Obs. 72. Cent. 3.

z Of gangrens p. 78.

a Matani de aneurysm p. 33.

b Floyer præternatural state of hum. p. 51.

c T. II. p. 131. 446.

d Second mém. sur les part.

irrit. & sensib. Exp. 543. tr. du poulet T. II. p. 105.

e l. c. p. 237. 239.

f Hæmatolog. p. 13.

g Serum chylosum vocat, circul. p. 161.

h In ventriculo. dextro, de

natur. human. p. 160.

menta. In anate porro, animale lacteis alioquin vasis destituto, chylum in sanguine *Walæus i* vidit, inque anseris aliisque avibus *Olaus Borrichius b*, quae interim uti legi, ita refero. Nam *Cl. Hunterus* chylum avium & piscium pellucidum facit, crocodilo excepto, cui albus sit.

Nihil ergo est, quare vehementer miremur, si quando de vena in homine incisa chylus fluxerit, quem aliquot a cibo capto horis nondum mutatum sanguis in omni homine circumfert. Exempla numerosissima exstant, pauca citabo. Lac bubulo simile sanguini innatabat, in *Tulpii* historia *l*. Tres partes sanguinis lacteae fuerunt in *Thomæ Guidot* *m* exemplo, inque alio, in quo sanguinis pars per venas subducta est, pars alia de naribus stillavit, tertia lactis pars fuit *n*. Lacteus albus humor de vena eductus *Caballi o*. Boni saporis id lac esse, & caseum inde adjecto acido factum *Regnerus* habet *de Graaf p*: inque nutrice *q* verum lac fuit, quod perinde cogeretur. In puerperis, & a suppressis lochiis *r*, & a lacte retento *r*<sup>\*</sup>, inque febre lactea *s*, frequentes etiam sunt historiae;

*i* *Epist. de chylo apud Bartholinum* p. 401. conf. *Act. Hafn. I. obs. XI*.

*k* *Chemic. ægypt. sapient.* p. 262.

*l* *Obs. 58. L. I.*

*m* *Prolegom.* p. 44.

*n* *Eph. nat. cur. Dec. 11. ann.*

*IV. obs. 165.*

*o* *Phænom. med.* p. 64.

*p* *Oper. omn.* p. 46.

*q* *Verduc usag. des part.* p. 188.

*r* *Galer. de Minerv. T. V.* p. 143. *Zarini de venæsect.* p. 19. *hist. 25.*

*r*<sup>\*</sup> *Journ. med.* 1770. *supplem. n. 4.* Si enim id lac per urinam & per diarrhœam depositum fuit, utique in sanguinem redierat.

*s* *Bartholin. de lact. thorac.* p. 39. *hist. 17. Cent. I. & Hepat. defunct.* p. 51.



sunt etiam auctores, qui frequentius ab equitatione lac de vena incisa fluere scripserunt *t*. Sed etiam de femoris ulcere, & ex cucurbitula lac fluxit *t*\*.

In exemplis colligendis *v* uberius fui, quod Cl. viri sint, qui negent, & ad serum quodam referant. Quod ego vidi, id evidentissime chylus erat, ut etiam ex ductu thoracico in venam subclaviam infundi viderim; & verum chylum, verumve lac esse, quod album cum sanguine circumit, aut de vena incisa elabatur *x*. In Suecia equidem *x*\* experimenta feri chylosi aliquam feri a lacte diversitatem demonstrant, a sero nempe lac verum exigua differre copia olei & solidarum partium, quibus in magna ratione superetur ut 1. ad 6. Constare aqua, gelatina & corpore gelatinoso mucoso, quarum illa =  $\frac{2}{240}$  hoc sit =  $\frac{18}{240}$ . Haec videntur omnia de chylo vera esse posse cum lymphâ animalis conjuncto, quae in lacte decedit. Sed etiam Cl. *Hewson* *x*\*\* album illud, quod sanguini inna-

*t* *Mém. de l'Acad. des Scienc.* 1752. p. 129. Verum lac & coagulabile.

*t*\* *Eph. Nat. Cur. Dec. I.* ann. IX. X. obs. 65. 66.

*v* Habent alia exempla *Cardanus* (qui pro veneno habuit) *Contradic. Med. L. II. tract. 5.* p. 173. *b. Marcellus Donatus hist. med. mir.* p. 50. *Willis de febrib.* p. 108. *G. Ent. & apolog. pro circ. sang.* p. 210. *Lower* p. 238. *J. N. Pechlin obs.* 13. *L. II. Rhodius obs.* 36. *Cent. I. obs.* 32. *Cent. II. Schneider de catarrh.* T. III. p. 10. *Barthol. anat.* p. 192. 193. *Bierling adversar.* p. 176. *Wedel physiol.* p. 137. qui addit in obelis non

rarium esse. *Mauritius Hofman. de mammar. constitut.* *Bernardus Albinus de prav. sang.* p. 51. *Amman parænes.* p. 40. 41. *Viridet de prim. coct.* II. n. 18. *H. Frid. Teichmeyer anthropolog.* p. 62. de polyp. n. 22. *Philos. Transf.* n. 6. 8. 443. *Eph. nat. cur. Dec. I. ann. III. obs.* 123. ann. VI. VII. obs. 214. *La Faye princ. de chir.* p. 532. 534. *Fränk Anmerk. T. III. sub fin.*  
*x* Lac duodecima hora in sanguinem abit *Lower* p. 239. ed. Bat.

*x*\* *Sw. wetensk. acad. Handl.* 1770. n. 3.

*x*\*\* *Enquiry* p. 115.

tat, ferum esse, globulos habere flavos  $x^{***}$  neque aut chylum  $x^\dagger$  esse, aut unice a pastu reperiri  $x^\dagger\dagger$ , cum fero vero canderem ab adipe  $x^\dagger\dagger\dagger$  communicari. Album etiam liquorem hydropticum l. L. *Targionus* vidit; cui nulli essent globuli  $x^\dagger\dagger\dagger\dagger$ . Sed id quod ego vidi, omnino paucis a cibo sumto horis evanescit, & tota sanguinis massa porro sincere rubet. Tempus ergo aliquod est, in quo chylus conspicuus cum sanguine circumvivit. Humorem autem alium mucosum nonnunquam in sanguine contineri non repugno. Chylum esse nobiscum Cl. *Brambilla*  $x^\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger$ .

Uti vitiose sanguis expallescit, ita vicissim per morbos in atrorem degenerat, tunc imprimis, quando restagnat, aut in varicibus  $y$ , aut in utero, aut alio loco  $z$ . Niger & fætidus atque serofus de naribus puellae decennis manabat  $z^*$ . Haec proculdubio prima causa fuit, cur de atra bile veteres cogitarent. Etiam cetaceis piscibus, qui tamen respirant, sanguis ater est, phocæ  $a$ , balaenæ  $b$ .

A sanguinis rubore etiam carnes rubent  $c$ , & eluto sanguine ad nativum colorem redeunt  $d$ .

$x^{***}$  p. 116.

$x^\dagger$  p. 118.

$x^\dagger\dagger$  p. 122. etiam diu a cibo.

$x^\dagger\dagger\dagger$  p. 127.

$x^\dagger\dagger\dagger\dagger$  *Racolt. T. I.*

$x^\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger$  *De inflamm. p. 43.*

$y$  *Norford of cancerous tumours p. 69. 70.*

$z$  In ipso corde atram bilem in tophi nigri speciem concretam reperit *Fernelius patholog.*

L. V. c. 12.

$z^*$  *Welhof variol. morbill p. 540. edit. quam Ill. Wichmanus curavit.*

$a$  *Schelhammer apud Valentinum Amphith. Zoot. p. 89.*

$b$  *Phil. Transact. n. 334.*

$c$  *De Graaf de usu Siphon. p. 533. Barthol. method. anat.*

$d$  *Birch hist. of the royal Society, T. III. p. 240.*



In pediculo manifesto percipitur, ut sanguis totum corpus perfluat, ipsasque antennis rubro colore tingat *e*, tum in polypo, qui pulicem aquaticum devoravit. Ut albiſſima ſit vitulina, pridie ſanguinem animali detrahunt, pene univerſum, altera die demum occidunt *f*. Ita enim penitus ſanguis exhauritur, qui carnes tinge-  
bat.

### §. VIII. *Sanguis ſponte coit.*

Etiam hoc toti *f*\* ſanguinis maffae commune eſt, & ni fallor in omnibus animalium claſſibus conſtanter accidit, ut vitalis humor ſpiſceſcat, & ſanguis in ſano homine continuo, uti ex vena emiſſus eſt *g*, aut de poro narium ſtillavit, in craſſioris minusque cohaerentis gelatinae tremulam ſpeciem coeat, quae compreſſa digiti veſtigium recipit, & ſerum ſudat, atque viciffim ſe dimiſſa reſtituit, ſcrobemque delet. A minutis ſeptem ad 11 cl. viri numerarunt, quibus ſanguis egeat, ut in placentam conſiſtat. Perinde coit, aut in aeſtivo aëris calore, qui ad 90 uſque *Fahrenheitii* gradus aſcendit *h*,

*e* *Leeuwenhoeck Phil. Trans.* 111. p. 236. ed. 1757.  
n. 136.

*f* *Kalm Americ. reſa* T. 11.  
p. 8.

*f*\* Diverſa eſt deſcriptio a  
phænomenis grumi ſanguinis.

*g* *Hofman Inſtit.* p. 239. *Jef-*  
*ſen a Jeſſen de ſanguine* p. 16.

&c. In iſtis tubulis tranſuſo-  
riis ſanguis grumeſcebat, hæc-  
que ex præcipuis cauſis infeli-  
cium eventum fuit. Conf. L.

*h* *Schwenke l. c.* p. 90. *Jof.*  
*Anton. Pujati de morbo Naro-*  
*niano* p. 110. In perpetuo tã-

men calore digeſtionis ſive 96.  
grad. ſervatus ſanguis fluidus  
manſit *Birch l. c.* T. 111. p. 238.  
Contra ſanguis in gradu 125.  
coactus fuit in vena ligata ca-  
nis *Hewſon phil. tranſ.* vol.  
LX.

aut hiberno tempore, in hoc tamen, si nonnullis experimentis fides, etiam magis *i.* tum in calore qui 90 gradus superat, ad 108 gr. usque. A frigore certe septem gradibus citius quam aqua *k* congelatur, & citius adeo, quam lac *l*, ut initium congelationis in ambitu fiat *l*<sup>\*</sup>, inque centro fluidus sanguis supersit. Polypi ex frigore vivis in hominibus nascuntur *m*. In homine frigore extincto sanguis in omnibus arteriis venisque in polypofas teretes concretiones abierat, ut etiam in dura meninge vasa sanguine turgent *n*. Non repugno frigefactum solidius coire, calentem tenerius *n*<sup>\*</sup>; tamen non eo processurus, ut calori amisso coagulationem tribuam *n*<sup>\*\*</sup>, cum frigidorum animalium sanguis cogatur, de quo nullus calor decedit. Possis negare, a sola quiete in coagulum abire, *n*<sup>\*\*\*</sup> cum concussus coeat, suilli exemplo, & in vivo homine coivisse visus sit. Plurimum tamen quies ad coagulationem confert, si quidem sanissimi hominis sanguis, qui rapide per venas circumibat, & idem per aërem fluidus saliebat, continuo cogitur, quamprimum in patinam receptus quiescit. Cæterum quadrupedum quidem, & calidi sanguinis, & frigidi, & avium,

*i* Quesnai de la saignée ed. nov. p. 399.

*k* Car Aug. a Bergen Nov. Eph. Nat. Cur. vol. I. app. p. 43. Gradu 25. cogitur Martine essays p. 351.

*l* Quod primo gradu congelascit. In Russico frigore sanguis cogitur Birch. l. c. Tom. II. p. 445.

*l*<sup>\*</sup> Schwenke p. 97.

*m* Bæhmer de præcavend. polyp. gener.

*n* Quelmalz de frigore. I. effect.

*n*<sup>\*</sup> Butt. separ. sang. spont. p. 10. 11.

*n*<sup>\*\*</sup> p. 12.

*n*<sup>\*\*\*</sup> Hewson Phil. Transact. vol. LX.



& piscium sanguis cogitur, & de rana o, perinde ut de homine, emissus in laminas rubras concrefcit. majorum tamen animalium & robustiorum sanguis vehementius aliquanto coagulatur p. In piscibus etiam continuo, & totus, sanguis coit q, etsi sunt, qui id crassamentum tenerius esse aiunt r. Num in testudine s, & lamantino t neque in frigore densetur, neque in calore, id non dixerim, testis tamen ejus eventus exstat. Soli insectorum vitali humori proprium est, nullo frigore densari v. In cochleis v\*, & passim in insectis, alioquin gelatinam refert.

Etsi nunc ex fani hominis incisa vena missus sanguis utique densatur, densior tamen est in iis, qui corpus valide exercent x, ut in agricolis, aliisque mortalibus, qui suo labore vitam sustentant. Vehementius etiam coit in hominibus arthriticis y, apoplecticis z, rheumaticis, podagricis, a inque febribus, quibus inflammatio

p *Second Mém. sur le mouvement du sang* Exp. 37. 38. 39.

o Ut in equo *Huxham of sore throat* p. 53. Ejus sanguis, quando friget, continuo in gelatinam *St. Birch l. c. T. IV. p. 292.* Phocæ viscidissimus est & valde adhæret *Hartmann anat. phoc. p. 25.*

q *Andry Alim. du carême* p. 213.

r *Lister humor.* p. 245.

s *Oexmelin hist. des aventuriers T. I. p. 86. 87.*

t *Idem ibid.* p. 99. Coctus tamen coit, & in phoca, animale Lamentini adfani, etiam

in frigore *Hartmann l. c.*

v *Mém. de l'Acad. Roy. des Sciences* 1734. p. 188. Erucæ hiemale frigus an. 1709. vitales superarunt.

v\* *Lister de cochl.* p. 29.

x *Browne Langrish modern. practice* p. 95. gradum tamen caloris 92. Fahrenheitiani thermometri per aliquem errorem ponit, cum oportuisset gradum poni 94.

y *Arcissemsky de remed. Knösfelii* p. 96. 97.

z In apoplectici sanguine ferum non secedebat *Schwenke* p. 177.

subest *a*\*. Demum in febribus malignis sub initia mali sæpius fere cogitur, etsi in posterioribus mali stadiis idem resolvitur: quam quidem legem plurimorum & peritissimorum medicorum consensu confirmari video, & ab ipso etiam potissimum *Huntero*. Sed etiam in exanthematicis febribus, cum inflammatione tamen conjunctis *b*, sanguis densior reperitur; & in ardentibus febribus absque fero visus est *c*, & grumofus adhæsit *d*, ejusdemque generis in universa acutarum febrium classe *e*, certe sub morbi principia mittitur. Nam in febre miliari, minime benigna, inque alia gravissima, de erysipelaceo genere, proprium sanguinem meum vehementer coactum vidi. Vasa sanguinea coacto cruore plena in febre maligna fuerunt, quam *Rædererus* morbum mucosum vocabat *e*\*. Nempe in universum magis magisque nunc confirmamur, febres acutas fere cum crasso sanguine incipere, ipsas etiam variolas *f* & Siamensem febrem flavam *g*, aliasque maligniores febres *h*, ut sanguis in peste *i* pene tenacitate

*a* *Coste sur la goutte* p. 21: ut tamen aquæ copiam conjunctam habeat.

*a*\* In morbo acuto sanguis sine fero *Fanton* obs. 7.

*b* In variolis *Boerhaave* *prax. méd.* T. I. p. 265. *G. v. Swieten* *Comm.* T. II. p. 458. ut ne gutta quidem diffunderet, quæ de naribus stillabat. Tum *Augenius* *de venæsect.* L. IX. c. 24. *Bagliv.* *oper.* p. 627. *Barker* *obs.* on the présent fever p. 10. *Pujati* *de morbo Naron.* p. 86.

*c* *Augenius* l. c.

*d* *Panarolus* *Pentecost.* II. c. 29.

*e* *Bartholetus* *de respirat. diff.* p. 232.

*e*\* *Morb. mucos.* p. 162.

*f* *Browne* *Langrish* *direct. on the smallpox* p. 5.

*g* *Titfingh* *geneeskunst voor de heelmeeesters* pag. 113. 114: *Nouv. Voyage de Guinée* pag. 311. *Act Edimb.* T. II. art. 29. ed. 4.

*h* *Bagliv.* l. c. pro re frequente *Barker* l. c. *Binniger* *act. helvetic.* T. II. p. 88. *Quenai* *de febr.* T. II. p. 43. *Frank* *alleluja* p. 329. In angina maligna *Huxham* l. c. p. 37. 38.

*i* *Bertrand* *tr. de la peste:*



tenacitate venæ hæreat & vix possit educi, tum in contagiosa lue armentorum *k*. Cum ipso vero morbi progressu, ut putredo in humoribus invalescit, ita sanguis dissolvitur, ut demum mihi ipsi in febre tertiana pulli sanguine vix crassior de vena secta fluxerit, & in febribus malignis totus dissolutus per omnes corporis poros exfudet *k\**. Quare ipsa in curatione ad hanc theoriam acida sub initia damus & cremorem tartari, aliaque tum putredini, tum spissitudini sanguinis contraria: in progressu fere cardiaca, cum sanguinem dissolutum debilitas perpetua sequatur. Neque enim de dissoluto sanguine desperari debet, quem certum sit, cum vita superstitite nativam densitatem recuperare. Et meo sanguini cum aquosus & pallidus fluxisset, solida densitas rediit, & olim adnotavit *Fac. Angelinus l\**.

Verum etiam intra vasa corporis humani, *l* & animalium, calidiorum *m* maxime & grandiorum, frequens est, coactum sanguinem reperire. In homine ab asthmatica anxietate *n* oppresso universæ & arteriæ & venæ nigerri-  
mo, coacto, sanguine plenæ fuerunt, *n\** In funesta *o* syncope sanguis in arteriis venisque adeo coactus fuit, ut solida ejus massa extra-

*k* *Europ. medicin.* p. 256.  
*Frænkische anmerck.* T. II, p. 105.

*k\** *L. I.* p. 75. 76. 77. 193. seqq.

*l\** *Elect. ven.* p. 28.

*l* *Riolan Enchir. anat. pathol.* p. 42. *Notat. de motu cord.* p. 97.

*Tom. III.*

*m* Canibus imprimis viscidissimus sanguis est: etiam *Cl. viro Andrea Pasta* teste.

*n* *Willis de morb. convulsiv.* p. 130. *de morbo hypochondr.* p. 15.

*n\** *Conf. Walther de atra bile.*  
*o* *P. Salius apud J. H. de Heucher oper. omn.* p. 381.

heretur: quod quidem phænomenon & alias *p* & in vasis potissimum uteri vidi. Nimis frequens equorum morbus *la gourme* a sanguine in magnis vasis, venis cordeque, coacto nascitur *p*\*. Inde nata est Cl. viri opinio *q*, qui totam sanguinis massam non pro humore aliquo vasa perfluente habuit, sed pro vero textu fibroso, musculofo, solido. In vena cava, & aorta arteria, sanguinem quasi fibrosum alias reperi, *r* & cum minutalini iliaca vena comparavit Cl. chirurgus *Pallucci s.*

§. IX. In vasis etiam vivi hominis coit.

Minime rarum est, de vena incisa, polyposa coagula extracta fuisse *t*, aut venam, cum secaretur, obstruxisse *u*. Ita ex incisa vena sanguis ad funis modum vasculum percussit *x*, inque album solidum quasi arcum *x*\*, & in massam pene tendineam, fibris implicatis contextam abiit *y*. In apoplectico sanguis, cum

*p* Habent etiam similes observationes *Joh. Ferrelius* de sede facult. Sc. L. VI. c. 7. *Felix Plater* *Prax.* P. I. c. 14. qui cum coralliis comparavit *P. Pavius* obs. 21. *M. Ant. Severinus* de recondit. abscess. p. 277 *Thom. Bartholinus* hist. 94. Cent. III. in homine melancholico. Multo exempla collegit *P. J. Sachs* *Ocean. microcosm.* P. 126.

*p*\* *Viridet du bon chyle* p. 421.

*q* *D. Capilupi* apud *Valisnerium* Oper. T. III. p. 321.

*r* *Opuscul. patholog. observ.* 19. 20.

*s* *Lithotom. perfection.* p. 68.

*t* *Littre* *Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1704. p. 24.

*u* *Journal des sçavans* 1697. n. 29.

*x* *Senac* T. II. p. 131. 446. *Lecan.* p. 37.

*x*\* *Pechlin.* T. II. obs. 13.

*y* *Manget* *bibliothec.* p. 958.



vena incideretur; concretus erat z. Olim *Postellus* in peripneumonia gluten medullæ simile extraxit, quod ad corallii modum consistentem arbusculam imitaretur z\*. In magnis arteriis a frigore sanguinem coagulari *Spigelius* z\*\*. In homine, cui femur amputatum fuerat, cruor de tanto vulnere nullus manavit, cum arteria grumis sanguineis plena esset a. Ill. *Haenius* universas arterias venasque chorda polyposa fartas vidit & olim *Beckerus* a\*, & *Morgagnus*, & *Waltherus* a\*\*. Hi iidem procul dubio vermes b sunt, quos aliqui scriptores de vena eductos descripserunt.

Sed etiam in aneurysmatibus sanguis in grumos coactus reperitur inque carnis speciem b\* inter duo vincula immotus coit c; inque umbilicalibus vasis notissimum experimentum est. Demum in vivis animalibus, quibus tegumenta corporis pellucunt, sanguis manifesto sublato motu & in globulorum agmina d; & in rubri olei speciem coalescit e; quod ad unguinis modum stagnat; sub qua equidem specie veri globuli, nondum mutata figura latent, quos videas ab

z *Higginor* disquis. anat. p. 158.

z\* In desc. peripneumoniæ. z\*\* p. 174.

a *Tschepp* de amputat. non cruent. & simile exemplum habet *Petit* *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1732. p. 394.

a\* *Mort. sin. peta* aqua.

a\*\* *Di eatra* vile.

b *Collette* *Journ. Encyclopedique* 1757. febr. *Vandermonde*. *Journ. Period.* 1751 avril.

b\* *Boerhaave* *præx. med.* I. p. 394.

c In experimento *Drelincurtii* apud *Draper* de pleurit. *Leid.* 1681. Post mensem in ligata arteria sanguis intus polypus reperitur *Lancis*. de corde & aneurism. p. 124. ed. 1728.

d *Leeuwenhæck* exp. & cont. p. 178. 179. &c.

e *Exp. mea* 18. 20. 151. 155. *Conf. Malpigh.* *posth.* p. 14.

incisa vena, fluente sanguinis restituto, renasci *f*, sphaericamque figuram recuperare. In ejusdem tribus bestiolis sanguinis in vasis liberis *g*, aut inter mesenterii laminas *h*, coeuntis coagulum oculis subjicitur, & grumi demum formatio, qui in arteriae venaeve incisae vulnere residet *i*, & rimam obturat, ut haemorrhagia sponte cesset: cum autem grumum adunati globuli constituunt, quos multa lymphæ in nubeculae speciem concreta circumstat *k*. Is idem in homine grumus arteriam violatam denique claudit, & a claris chirurgis *l* passim memoratur. Sed etiam venam laesam grumus sanguinis niger & solidus circumfedit, cujus in media sede papilla carnea, coactus nempe cruor, vulnus obturat *m*. Cordis demum vulnus sanguinis coagulum obsedisse visum est, ut vita ad septimum diem superesset *n*. Et in alio exemplo, cum abscessus cor pene totum exedisset, polypus ea ipsa sede adnatus foramen obturavit, vitamque ægri

*f* Exp. 151. 155.

*g* Exp. 60. 93. conf. 177. 228.

*h* Exp. 233.

*i* Exp. 93. 160. 167. 170. 175. 177. 178. 179. 182. 183.

*k* Exp. 88. 153. 154. 155.

157. 163. 167. 170. 171. 175.

176. 180. 182. 183. 187.

189. 212.

*l* Alex. Monroo *Essays of a Society at Edimburg*. T. II.

p. 273. Andreas Pasta de motu

sang. & polyp. p. 75. Petit.

*Mem. de l'Acad.* 1732. p. 294.

1735. p. 441. 442. ut nullus

ex amputata tibia sanguis flu-

eret. *Morand Mem. de l'Acad.*

*des scienc.* 1736. Ex adhibito

agarico conicus grumus sub na-

tus arteriam obturavit *Philos.*

*Transact.* 1755. n. 10. & a

lycoperdo *La Fosse in obs.*

*sur les malad. des chevaux*

p. 73.

*m* *Mem. de Chir.* T. II.

p. 117.

*n* *Dionysius Sancassani obs.* 44



produxit. In ipsa arteria pulmonali, in syncope, sanguinem in polyposa coagula floculosque cogi, *Gerardus* v. *Swieten* auctor est o, inque febrili frigore coagula nasci persuadetur, quæ per totam vitam supersint o\*. Ex sola recensione horridi objecti deliquium animi & mors, sanguine in vasis magnis de corde exeuntibus concreto o\*\*. A subito timore polypi o\*\*\*. Ex frigore in homine sano polypi nati o\*\*\*\*.

§. X. *Eadem coagula polyporum nomine veniunt.*

Uti in reliquis vasis, ita in cordis aut thalamis, aut auriculis, adeo frequenter ejusmodi sanguinea coagula reperiuntur, ut absque iis fere nullum p cadaver aperiatur: frequentiores tamen aliquanto in vena cava & dextra auricula, & in ventriculo dextro occurrunt. Hæc est glandulosa in corde caro *Vesalio* dicta. Hic procul dubio vermis in corde fuit, *Severino* dictus q, & *Rhodio* r, & *Zacuto* s, & *Riolano*

---

o *Comm. in Boerhaave aphor. T. I. p. 684. T. II. p. 175.* Ea tamen coagula per subortam palpitationem solvi credit.  
 o\* *T. II. p. 175.*  
 o\*\* *Senac T. II. p. 464.*  
 o\*\*\* *Malpighius de polyp. p. 128.*  
 o\*\*\*\* *Böhmer de polyp. gener. præcav. p. 21.*  
 p. Pro perpetuo habet *Galenus de hippocr. & Plat. decret. L. I. Deinde inter nuperos recte viderunt Julia-*  
*nus Ofrai l. c. p. 325. & Edmundus Tyson anat. of the pygmy, & Behrens in Breslau. Sammlung 1723. Januar. & Thomas Schwenke p. 107. & Ill. Senac. T. II. p. 469. & alii Cl. viri, vix adultum cadaver reperiri, cujus in corde coagulatus sanguis non reperiatur.*  
 q *Vipera pyth. p. 281. 282.*  
 r. *Centur. III. obs. 61. 62.*  
 s *Prax. admirab. L. I. obs. 139. 140. L. III. obs. 99.*

t, & aliis u auctoribus. Hæc eadem vi-  
pera est hominum sermonibus celebrior, quam  
olim ad sanguinis coagula *Valisnerius* sagacior  
retulit x. Sed etiam in elephanto y, læna  
z, leone a, pygmæo b, equo c, aliisque ani-  
malibus e\* ejusmodi sanguinei grumi visi sunt.  
Sinus cerebri frequentissime eodem cruoris vi-  
tio obsidentur, ut in numerosissimis exemplis  
vidi, & alii d clari viri viderunt, & triste in  
celeberrimo e incifore exemplum existat.  
Ubique nempe in vasis animalibus sanguis co-  
gitur, quam primum ejus per sua vasa motus  
fractus est f. Hi sunt polypi in corde magnis-  
que vasis reperti, quos nullum ante mortem  
symptoma præcessit g. Hinc in aneurysmatibus  
non solum sanguis aut colligitur h, aut densa-

t *Enchirid. pathol.* p. 142. Serpentis figura casô in utro-  
que cordis ventriculo *Willis*  
*de morb. convuls.* p. 150.

u *Eph. Nat. Cur. Dec. I.*  
*ann. I. obs. 50.* & forte *Plan-*  
*que biblioth. T. III. p. 551.*  
552.

x *Oper. omni. I. I. p. 125.*  
126.

y *Blair philos. transact. n. 326*

z *Eph. Nat. Cur. Dec. I.*  
*ann. 2. obs. 5.*

a *Barthol. hist. 100. Cent. 4.*

b *Tyson* in ejus animalis  
anatomæ.

c In lue equorum frequens  
malum *Lancisus.*

e\* In canē etiam frequentes  
*Philos. Trans. n. 336.* De ur-

fulo coati mundi *Parisini.*

d' *Blas L. VI. obs. 2 Journ.*  
*des savans 1697. n. 28-30. Hen-*  
*rici de abscessu mesenterii.*

*Harmes de causa mort. mania-*  
*ci, quæ inter nostras recusa*  
*existat. Porro Phil. Trans. n. 157.*  
224. Apud *Vandermonde Journ.*  
*period. T. II. n. 4.*

e *Cl. olim Hunauld Com-*  
*merc. Litt. Noric. 1743. p.*  
284.

f *Senac T. II. p. 466. Pasta*  
*del flusso di sangue p. 172.*  
segg.

g *Bohn experient. falsac. n.*  
64. 65.

h In nostris experimentis  
*second. memoir. sur le mouv.*  
*du sang. Exp. 97. &c.*



tur *i*, sed præterea accurate definitos densitatis gradus induit, ut eo molliores quasi laminæ sint, quo axi arteriæ, motusque sedi propiores; eo duriores vero, magisque membranarum similes, quo remotiores a sede motus, & parieti arteriæ viciniore sunt *k*. Sed etiam in varice polypi reperti sunt *l*. Hinc sanguis de vena lente fluens magis coagulatur *m*, & cum contrarii oppositarum causarum effectus sint, idem in phiala concussus, ne in frigore quidem coagulatur *n*.

### §. XI. Polypi veri.

Non ideo cum Fontano *o*, & Kerkringio *p*, & Ruyschio *q*, & Tyfone *r*, & hætenus cum

*i* Lancis. de aneurysm. prop. LXI. ed. nov. p. 251. Arteriam in magno aneurysmate fornice polypofo obduci monet, & similia habent Bogdan obs. 8. Ruytsch obs. 2. Bianchi apud Manget Theat. p. 193. Saviard obs. 61. Boerhaave prax. med. T. I. p. 394. G. v. Swieten Comm. T. I. p. 290. Hist. de l'Acad. des scienc. 1707, p. p. 21. 1721. p. 31. Obs. nostr. pathol. n. 4. 19. Obs. of a Society at Lond. vol. I. p. 26. *k* Riva in Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I. obs. 18. Lancis. l. c. p. 232. Mem. de l'Acad. Roy. 1712. p. 79. seqq. 1724. f. 2. 1736. T. 10. f. 6. Stenzel steatomat. aort. p. 10. Nordwyck præfat. ad Nihelii præsagia. Obs. of a Society at

Lond. vol. I. p. 346. Obs. nostr. pathol. 4. 19.

*l* Sandris de sanguine p. 218 Paw obs. 21. in vena cava.

*m* Quesnai de la saignée ed. nov. p. 399.

*n* Senac T. II. p. 134. 135. Verduc de l'usage des parties T. I. p. 354.

*o* Coagula pituitosa cordis negavit polypos recte vocari, aut aliquas cordis morbosa affectiones sequi, ad Vesalium p. 23.

*p* Spicileg. observ. anat. 77.

*q* Apud Barbaaviu Prax. Med. T. I. Ab eo viro forte hanc animadversionem, ut alia multa, Kerkringius habuit.

*r* Polypos sanguinis serum a morte coactum esse l. c.

*Schwenkio* s omnino ex morborum numero polypos velim relegatos etsi raro adpareant. Sæpe enim vidi, & alii idonei testes ante me viderunt, nimis dura *t*, & alba *u*, neque adeo subito nata solida coagula; in auricula potissimum dextra, valvulis venosis tendineis *x* funiculis & ramis suis intertexta cordisque laceratis *y*, & demum ita innata *z*, ut lacerando separare necesse esset, aut demum minimis inter reticulatas cordis interni fibras quasi radiculis suis infingerentur *a*.

Sed etiam natura iis polypis, quam grumo sanguinis subito effusi, diversa est. Teneri primo polypi, grumum *b* utique cruoris pro centro

s Plerosque polypos sub *Bartholinus* in apoplectico E-mortem; & a morte generari *pist.* ad *Wormium* p. 651.  
l. c. p. 107.

*t* Tendineum vidit *Pechlin* III. *Schacher* in progr. ann. 1721. edito, *Senac* T. II. p. 16. *obs.* I. Cent. II. Pene 462. de *Haen* rat. med. alt. p. cartilagineum *Blasius* *obs.* I. 122.

Part. VI. *Barrere* anat. p. 100 *y* *Gohl* von *Hertzgewächsen* feqq. Osseum, in aneurysmate III. *Senac* p. 362. Lapidum *Blair* de elephanti polypo l. c. similem *Snell* de cordis polypo. *z* *Bartholin* *Controvers.* anat. p. 481. *Blasius* *obs.* I. Part. VI. *Caldesi* dello tartarughe T. IX. f. 2. *Chiffet* *obs.* 16. *Valisnerius* oper. Tom. III. p. 310. inter observationes varias. Porro *Phil. Transact.* n. 464. 481. *Bolten* biblioth. Hamburg. p. 150. de *Haen* l. c.

*u* Albos esse monet *Peyerus* *method.* anat. p. 83. feqq. Hæc causa est, quare vetustiores scriptores cum adipe comparaverint, ut *Jasolinus* *colleg.* anat. p. 19. *Hippolytus* *Boscus*, qui cum candela contulit *facult.* anat. p. 38, *Smetius* *miscell.* L. X. p. 323. *C. Bauhinus* p. 218. *C. Hoffmann* de pinguedine n. 23. *Bontius* *obs.* 8. L. III. *Riolanus* *enchir.* anat. path. p. 226. qui frequenter se reperire monet, Rarum tamen esse monet *Fantonus* *diff.* anat. p. 303. Ad arteriarum valvulas adhaerentem *Mittelmayer* de polyp.

*a* L. IV. p. 381.

*b* *Ruinler* *obs.* 81. J. v. *Hor-*  
*ne* in ep. de aneurysm. Ber-



habent, quem alba lymphæ in carnis tremulæ speciem coacta circumdat *c*, omnino uti ruber grumus in vulneribus vasorum, alba & lymphatica nebula ambitur *d*. Ejusmodi polypum ipse vidi. Sensim idem incrementa sumit, novisque lymphæ quasi laminis *e* accedentibus augetur, & fibris quasi distinguitur *f*. In vetusto malo magna tenacitas *g* accedit, expressa fluidiori parte *h*, eo vero, quod reliquum est, a cordis vehemente labore compacto. In aqua fervida, inque vini acerrimo spiritu, polypi in dura etiam coagula abeunt. Membras vero veras *i* polypos involvere, aut in iis membranis vasa reperiri *k*, id utique nimium est, neque flammam concipere crediderim *l*. Sedes polyporum verorum in utraque cordis cavea est, in dextra tamen magis *m*: etsi neque a sinistro thalamo absunt *n*. Frequenter omnino

ger de polyp. Mauchart de pulsu crepitante p. 11. Barrere l. c.

*c* Rumler l. c. &c. Mucum vocat Bæhmerus de præcav. polyp. gener.

*d* p. 20. In grumis arterias incisas claudentibus lymphatica pellicula pariter reperiatur *Phil. Transact.* 1755. n. 10. la Fosse l. c. & conf. Petit *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 293.

*e* Malpigh de polyp. p. 124. J. v. Horne i. c. Fanton ad obs. 31. Morgan. advers II. p. 81. Behrens in Bresl. saml. 1722. April. Schacher in progr. quo contra Kerkringium poly-

pos vindicat.

*f* Schacher l. c. p. 40.

*g* not. t. Barrere l. c.

*h* Pasta ad Roncallum *Europ. Med.* p. 262.

*i* S. Collins in *Fimothei Clarke-viri Cl. cadavere* p. 771.

*k* Diemerbroeck *oper. omni.* p. 278. 279.

*l* Ut Dam. *Sinopeus in parerg.* p. 32.

*m* Albinus de polyp. p. 10. Malpighius l. c. Schwenke p. 107. Bæhmer l. c. n. 12. *Phil. Transact.* n. 222. Fanton ad obs. 19. Addit à difficili per pulmones itinere hanc frequentiam nasci.

*n* Exempla non rara sunt,

in magnas arterias o venasque o\* quasi propa-  
gines educunt, neque exemplum deest, ejus-  
modi coagulum a corde ad pedis usque arterias  
continuatum fuisse p.

Neque ex fabrica sola adgnosimus, aliud  
a grumo sanguineo concrementi genus poly-  
pos esse. Nam ea quidem pars sanguinei re-  
ceptaculi, quæ polypum continet, utique su-  
per naturæ q legem dilatatur, cum præter po-  
lypum etiam sanguini spatium esse necesse sit,  
Cordis in polyposis amplissimi numerosissima  
exempla exstant r.

apud *Vesalium* loco quem ci-  
tabo, *Boscum* l. c. *Bartholi-*  
*num* l. c. nuper in *Epist. ad*  
*Worm.* Is polypus venæ pul-  
monalis aditum clauserat.  
Idem addit, sæpe se eam  
pituitam vidisse *defens. vasor.*  
*lymph.* p. 86. Porro similia  
exempla exstant in *Phil.*  
*Transact.* n. 128. 281. 464.  
apud *Malpighium* p. 129.  
*Franciscum* *Bayle* de apoplex.  
p. 52. 53. *Blasium* L. l. obs.  
19. *Caldesi* l. c. Tab. 9  
f. 2. *Pechlin* L. II. obs.  
1. *Bergerum* de polyp. p.  
28. *Joh. Viridet* du bon chyle  
p. 686. 687. *Fr. de Sauvages*  
de inflamm. p. 240. *Mit-*  
*telmayer* de polyp. *Schaar-*  
*schmid*, *Barrere* p. 100. *Bæh-*  
*nier* p. 6. 7. *Queitsch select.*  
*Francos.* T. IV. vol. VI.  
Duriora esse hæc sinistrae ca-  
væ coagula addit *Albinus* l. c.  
o *Worm* ep. p. 653. *Gatz*  
de polyp. concret. *Bartholet-*  
*tus* respir. diff. p. 329. *Bar-*

*vere* obs. nov. p. 102. seqq.  
p. 104. seqq. *Ulinaris* in art-  
ria magna *Beck hist. pulpyt.*  
Polypus pedis longitudine ex  
ventriculo sinistro in arterias  
extensus *Mittelmayer* de po-  
lyp.

o\* In venam cavam ad he-  
par usque & in subclaviam &  
jugularem *Salzmann* de san-  
guine in pericard effus. In ju-  
gulares venas ad sinus usque  
laterales, & ad media femo-  
ra *Hist. de l'Acad.* 1705 n. 8.  
In venis maximis, ex corde  
dextro, in jugulares usque  
& abdominis venas *Phil.*  
*Transact.* n. 157.

p *Sauvages* l. c.

q Hoc veri polypi indici-  
um olim *Malpighius* propo-  
suit posthum. p. 45. & nuper  
III. *Senac.* T. II. p. 455.

r *Marchett* anat. p. 73.  
*Viridet* du bon chyle p. 29.  
30. *Phil. Transact.* n. 157.  
*Berger* l. c. *Fanton* anat.  
corp. hum. p. 287. obs. 19.



Deinde symptomata polypum in cadavere inventum præcefferunt. quæ manifesto confirmant s, in vivente jam homine impedimentum in cordis caveis adfuisse, quod non nuper demum, interque moriendum, natum sit, Ergo polypus in iis hominibus reperitur, quibus pulsus inordinatus t fuit, & cor palpitavit u, cum se imperfecte depleret, neque unquam eo liberaret stimulo x, qui a polypo, crasso corpore, internam caveam obsidente natus, non poterat non cor perpetuo sollicitare. Cordis etiam extensa est amplitudo. Præterea & asphyxia y a polypo nascitur, quando sanguis ab arteriarum majorum ostiis avertitur: eademque causa syncopes cardiacæ z, apoplexiæ a mortisque subitæ est b. In iis etiam homi-

22. *Mittelmayer* l. c. p. 12. *Becker obs.* 37. *Lancis* l. c. p. 39. *Senac* T. II. p. 417. *Bærhæve Prax.* T. I. Aortæ ostium dilatatum *Valisner oper.* T. III. p. 310.

s *Gætz* l. c. p. 23. contra *Kerkringium*. *Albinus* de polyp. p. 6.

t *Malpigh* posth. p. 45. de polyp. p. 128. *Gohl* l. c. *Viridet* l. c. p. 263. 686. 687. Pulsus inde intermittens *Malpigh.* p. 128. *Albin* de polyp. p. 6. *Bæhmer*, *Barrere* p. 100 & 104. *Gætz* l. c.

u *Smetius* l. c. *Phil. Trans.* n. 481. p. 100 *Tozzi theor.* p. 203. *De Haen.* l. c. p. 122 *Pissinius* p. 125 126. Costas fregit palpitatio in historia, quam habet *Waldschmidt* de

fractur. absque caus. extern. Maxima utemini exaudiretur *Fanton obs.* Pulsus inæqualis *Malpigh* p. 128.

x *L.* IV. p. 490.

y *Riolan.* in *C. Bauhin.* p. 704. *anthropol.* p. 393. *Welsch episagm. obs.* 34. *Pissinius* de cord. polyp. p. 125.

z *Wepfer* de apoplex. p. 181. *Fanton* Ep. 8. ad *Manget*, *Lancis.* p. 39. ed. prior. *Berger* l. c. *Bæhmer* l. c.

a *Tulp.* obs. 27. *L. I. Phil. Trans.* n. 224. *Viridet* l. c. p. 263. *Lancis, obs.* 4. post tract. de mort. subit.

b Catarrhus suffocativus *Schacher* l. c. subita mors *Riolan enchir.* p. 239. *Fanton* obs. 8. *Viridet* l. c. & p. 263. *Bæhrens Triga cas.*

nibus, quos polypus obsidet, respiratio difficilis supervenit *c*, ex animæ conatu, quæ ad expediendum sanguinis ex dextro thalamo in sinistrum iter omnes suas dilatando pulmoni idoneas vires impendit: dolorem eadem in sede perpetuum alii observarunt *c\**, aque cordis polypo orientem gangrænam *c\*\**. Sed & hydropem *d* a polypo nasci, non absurdum est *e*, quod venoso humori reditum angustiores reddat, & difficilior.

Causa polypi videtur in aliqua sanguinis in vivo animale quiete *f* esse, quæcunque ejus quietis causa fuerit. Potest ergo polypus ab impedimento aliquo pulmonis nasci, unde non raro in medicis historiis cum difficili respiratione, asthma *g*, peripneumonia *h* &

memor. *Dionis de la mort subite* p. 62. 63. *Salzman l. c. Heucher oper.* p. 366. *Berger l. c. p. 28. Eph. Nat. Cur. vol. 7. obs. 112.* Vena cava inde rupta, & mors subita *Burnet thes. pract. L. III. S. 68.*

*c Riolan l. c. Pissinius p. 126. Viridet p. 686. 687. Marchet. p. 73. Albin l. c. Phil. Trans. n. 464. Senac. T. II. p. 467. Barrere p. 100. 102. 109. Bartholetus p. 329. Asthma cum polypo Act. Budiss. art. 39. De Haen l. c. In 500. asthmaticis polypi in corde fuerunt Grævius apud Hoffmannum de gener. mort. subit.*

*c\* Rosen beskrift. p. 25. in Comite Fleming.*

*c\*\* Vesal Exam. p. 154*

*d Bartholetus l. c. Viridet: Chifflet obs. 16. Bartholin. controvers. p. 481. pro re frequenti. Bagliv. p. 617. Schaarschmidt relat. T. IV. p. 411. Comm. Lit. Nor. 1736 hebd. 45. Pallor inde & œdema Barrere p. 100. 102. 104. Cachecticus leo fuit, in quo polypum Bartholinus invenit hist. 100. Cent. IV. In hydrocardia 20. uncia lentæ pituitæ Blas L. I. obs. 19. In hydrope pectoris caro alba ventriculis adnata Chifflet obs. 16.*

*e L. II. p. 154.*

*f Pasta de motu sang. p. 64. del flusso di sangue p. 172. g. p. 26. Conf. Bartholetum respir. diff. p. 290.*

*h Non absolum est & a polypo respirationem difficilem*



phthisi *b\** polypus conjungitur. Possunt a moerore *i*; aliisve causis, vitæ vires frangi, ut quidem in chronicis morbis polypus frequens est *k*. Potest terror *l* subito cordis actionem interceptisse, ut sanguinis per cordis caveas motus derepente destrueretur. A quiete enim sanguinem cogi, & vinculum *m*, & aneurysma *n*, & nostra *o* nuper citata experimenta confirmant. Possunt acida, aut spirituosæ venena lento & multo usu in sanguinem viam sibi fecisse *p*, & cruorem perinde coegisse, ut in animalibus solent, quorum venis injiciuntur *q*.

Cæterum primam polypi descriptionem apud *Benivenium* reperio *r*, & alteram, apud

nasci, & a respiratione difficili, aliunde nata, polypum. Nam & cordi male se deplenti anhelitu subvenimus, & a pulmone impedito sanguis in corde sistitur. Ergo in epidemia nautica post difficiles respirationes, acutamque febrem, in plerisque defunctorum cadaveribus monstrosi & laminati in corde polypi fuerunt *Phil. Trans.* n. 464. Post pleuritidem frequentes polypos albos valvulis intertextos reperit *Senac T. II.* p. 467. Frequenter polypum ab ea causa nasci *Idem* monuit p. 466. & venerandus olim *Fantonus ad obs.* 19. Huc etiam pertinent exempla *Comperi Phil. Trans.* n. 270. *Dom. de Marchettis l. c.* p. 73. *Caldeſi p. 91. Weissii*

in *program. V.* p. 12. *Gatzii l. c.*

*b Worm. ep. 653. & c. Bartholin Controvers. p. 481. Beck de palpit. cord. p. 38. ulnam longum Willis morb. convuls. p. 130. pro frequente malo.*

*i Viridet du bon chyle p. 19.*

*k Phil. Trans. n. 222. in vena Cava.*

*l Malpighius p. 128. Baëmer l. c. p. 21. 36. 37.*

*m p. 20.*

*n. p. 22.*

*o p. 20.*

*p Hist. de l'Acad. des scienc. obl. 5. Ab abusu certe spiritus frumenti frequentem in pulmonibus scirrhum deduco, quem in Saxonia inferiori Dampen vocant.*

*q l. III. p. 424. 425.*

*r Abdit. morb. caus. c. 25.*

*Vesalius*, qui glandulosam carnem in sinistro ventriculo diu hæerere scripsit. eosque homines absque dolore mori; cum gangrænosus artubus s. Perantiquus etiam auctor scholiorum *M. S.* quæ; adjecta *Ludovici Vassæi* historiæ; in bibliotheca mea exstant; sanguinem in hominibus propinato opio enectis, & apoplecticis, in corde fere in pituitam congelari scripserat. Nomen polyporum Amstelodamenses medici pituitæ in sinistro ventriculo apoplecticorum concretæ primi imposuerunt *t*: & eodem fere tempore *Bartholinus* u cum *Wormio* carunculas ex utroque cordis ventriculo exemit, quas polypos dixit imitari. Veros polypos dari contra *Kerkringium* *Pechlinus* defendit *u\** & *Malpighius* *u\*\**, & *Snellius* *u\*\*\**, & *Vaterus* *u\*\*\*\**, & *G. Aug. Langguth* *u\*\*\*\*\**, & *Schächerus* *u\*\*\*\*\**.

*s* In Examine observ. Fallop. p. 154.

*t* Tulpio teste obs. 27. L. I.

*u* Anat. renov. p. 393.

*u\** L. II. obs. I.

*u\*\** De polypis.

*u\*\*\** De polypo cordis.

*u\*\*\*\** l. c.

*u\*\*\*\*\** l. c.

*u\*\*\*\*\** Progr. cit.






## S E C T I O II.

## E L E M E N T A S A N G U I N I S.

§. I. *Calor.*

UI homogeneous videtur sanguis, quando primum de nare stillat, aut de incisa vena fluit, is quidem in diversas & alieni ingenii partes aut sola quiete abit, aut adjecta ignis, saliumve vi. Eas partes sanguinis primas contemplari æquum est, in quas sponte sua & absque artis imperio discedit. Aerem brevissime tangemus, quem putredo, aliaque artificia demonstrant: id enim aeris elementum a respiratione aque pulmonis efficacia  $\times$  divellere fas non est, quo quidem loco inquirere oportebit; num aer, qualis nos undique ambit, in sanguine contineatur: an potius aliæ ejus aeris dotes sint, qui inter elementa cruoris est.

Ignem calor demonstrat, Omnium enim animalium sanguis, dum vivunt, aliquot gradibus, per thermometrum definiendis, supra aquam aut aerem calet  $\gamma$ , in quo ea animalia vivunt. Eorum nempe piscium vitalem humorem, a quorum fabrica pulmo abest, & sanguinem animalium quadrupedum oviparorum,

---

$\times$  T. III. L. VIII.

$\gamma$  Georgius Martine in libello de animalibus similibus,

& imprimis in *Essays medical and philosophical* p. 327. seqq.

quibus pulmo est, sed exiguis, & unicus cordis ventriculus, penitus quidem frigere, nempe eo calore solo frui, qui in atmosphæra est, aut in aqua, recepta quidem fuit opinio. De vipera *z*, testudine *a*, etiam robusta, & cujus cor valide micaret *b*, testimonia exant, ut etiam aere *c*, & aqua *d*, frigidiorē sanguinem habere, sint qui scripserint: alii tamen haud paulo rectius reliquerint *e*, ea temperie esse, quæ aquæ est. Facile vero peregrinatoribus, a naturæ studio plerumque alienis, ejusmodi errores obrepunt. Nempe, qui thermometri auxilio destituti, solo ex sensu suo calorem metiuntur, iis omnia frigida videntur, quæ eorum sanguine minus calent, aut elementis suis organa nostri sensus minus celeriter emoveant, quam proprius sanguis *f*. Hinc fit, ut profundiores cellæ fontesque, qui de intimis montis scaturiunt, hieme calere, æstate vero frigere videantur: temperiem enim non mutant, quæ fere 53 g *Fahrenheitianorum* graduum

*z* Borrichius ad Bartholinum *epist.* 92. *Cent.* IV.

*a* Ejus sanguinem frigere *Rondelet de piscib.* p. 448. 575. *Faber ad Hernandez* p. 448. *Plumier in Journal de Trevoux* 1705. M. Febr. *Jacobæus de ranis* p. 106. *Hughes natural history of Barbados* p. 399. &c.

*b* *Phil. Trans.* n. 27.

*c* *Ibid.*

*d* *Richer Memoir. de l'Acad. avant 1699. Voyage de Guianne* p. 325. *Du Hamel*

*hist. acad. Reg. scient.* p. 157.

*Deterius Leonardus a Capoa*, qui etiam delphini, phocæ & cetorum corda aere frigidiora fecit *delle mossette* p. 44.

*e* *Halley apud Birch hist. of the R. Soc. T. IV.* p. 257.

*Bazin obsf. sur les plantes* p. 201. *Nullus calor piscium & ranarum* *Braun Com. nov. petr.* XIII

*f* *Boyle of cold.* p. 3. &c.

*Wolf von den wirkungen der natur* n. 74.

*g* *Martine Essays* p. 223.



duum eadem etiam est aquæ in profundis maris haustæ *b*. Sed hi gradus æstivo aeris calore minores sunt, hiberno majores. Inde etiam intelligitur, cur peregrinatores, qui ex algidis montibus in valles descendunt, regionem *i*, de dimidio colle quasi suspensam, calidam prædicent; quam iidem frigere queruntur, quoties de calidissima maritima planitie ad eadem altiora oppida adscenderunt. Perinde *Kenelmus Digby*, cum balneorum turcicorum diverso gradu calentia hypocauſta perambula- ret, aque fervidissimis in frigidum aerem rediret, frigida nunc sibi visa fuisse narrat, quæ calidissima sibi visa fuerant, quando primum libero ex aere balnea adiverat *i*\*.

Multo minus verum est, aut marinarum avium *k* sanguinem frigere; aut erinaceorum *l*, quibus animalibus pulmo nostri similis datus est. Si unquam ab experimento hæc traditiones originem duxerunt, hieme forte, frigore, & somno sopitum animal incisum fuisse *m* necesse est, uti certe muris montani sanguis suis in hibernaculis

*b* Ellis in *Journal. Oeconom.* 1754. *M. April.*

*i* Tariguam oppidum Ulloa in itinere americano p. 285.

*i*\* du Hamel de corp. anim. L. I.

*k* Calere omnino ostendit, de ave macrense; quam expediebat sanguine frigido esse; ut pro pisce haberi, & in quadragesimali jejuniis inter cibos

recipi posset, *Andry tr. des alim. de carême* p. 413.

*l* Schrader decad. III. obs. 3. cum cor saliret. *Blas. anat.* p. 64. *Tyson* apud *Birch*, T. IV. p. 258. & de Siamesi erinaceo *Tachard voyage de Siam* T. II. p. 251.

*m* *Listeri* jam conjectura fuit de humor. p. 104.

friget. Aestate certe erinaceorum, quos dissecui, sanguis calidus fuit, & paria illustrium virorum testimonia exstant *n*. Sanguinem ex vena secta de vivo homine emissum frigidum fuisse, insignes testes adfunt, & ipse *Morgagnus*. Eum sanguinem credas alicubi quievisse, ut nonnunquam in gravibus deliquiis quiescit, & cum motu calorem amittit. Sed totum hominem dysenteria periturum friguisse vidi. In mure tamen citello, hyeme effosso, sanguis insigniter caluit.

In ipsis contra piscibus, qui branchias agitant, sanguis unico *o*, & unico cum dimidio, *p* & septem *q* demum *Fahrenheitianæ* thermomet gradibus magis calet, quam aqua, in qua vivunt: quinque vero gradibus caluit, sanguis ranæ & marinæ testudinis *r*. Aliquanto majorem calorem *J. Hunter* in rana generari testis est; ut hydrargyrus tubi in os animalis dati per quatuor gradus adscendat, in ventriculum detruso etiam vigenis *s*. Infecta demum, quæ singula nobis frigere videntur, collecta, solo obscuro motu, & agminis densitate, tantum calorem generant, ut humani sanguinis

*n* *Lister* l. c. *Tancredus Robinson* in *Epist. posth. ad Raium*, *Lancisi* l. c. p. 38.

*o* *Martine* *ess.* p. 331. 332.  
*p* *Kraft physic. theoret.* p. 293.

*q* *Idem* *ibid.*

*r* *Martine* p. 332.

*s* *Phil. Trans.* T. LXV.

p. 2.



calori æqualis, aut major sit  $t$ , & ægre denique manibus toleretur  $u$ . Numero apum tribuas, quod calorem generent, quem neque vespæ generant, neque crabrones. Sed etiam absque eo acervorum fotu, erucæ duobus super aerem gradibus calent. An vero calor ab animalibus generatus fecerit, ut eorum aliqua, quibus sanguis sponte frigere videtur, a frigore non occidantur  $x$ ? Vidit idem J. Hunter cyprinos caloris tantum generasse, ut non possent rigescere, & tum demum murem occisum, cum humectatis pilis, calor ab eo generatus diminutus esset  $x^*$ .

Avibus, quadrupedibus viviparis, & ipsis etiam piscibus cetaceis  $y$ , & pulmo est, & arteria pulmonalis aortæ fere æqualis. De horum animalium sanguine in universum nemo dubitat, quin caleat, & jam olim Sanctorius pronuntiavit, qui primus  $z$  thermometri ad medicinam facien-

$t$  Graduum nempe 97. *Martaldi Mem. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1712. p. 323. Conf. *Martine anim. simil.* p. 210. *Essays* p. 331. *Reaumur Mem. pour servir à l'hist. des insectes* T. V. p. 671. 672. Hinc in frigore pereunt *Bazin*.

$u$  *Neumann Chym. ex edit. Zimmermanni* p. 397. *Reaumur Mem. pour servir à l'hist. des insectes* T. V. p. 671.

$x$  *Martine* p. 330. 331. *Boerhaave Elem. Chem.* T. I. p. 415.

$x^*$  *Phil. Transf.* T. LXV. p. 2.

$y$  *Delphiho Marsouin calidissimus sanguis est, ut fumet Andry tr. des alimens du careme* p. 479. Adde *Tachard voy.* T. I. p. 32. *J. de Trevoux* 1740. p. 2230. *Richer voyage de Guyanne*.

$z$  In *Comm ad primum fen Avicen*. Inde ad ægros thermometri usum transtulit *Swammerdam de respir.* p. III. & ad animalia, deinde *G. Cock*.

dam utilitatem fenfit, etiam fub æquatore *a*, aut in æftivis ardoribus *b*, tamen fanguinem eo aere calidiorẽ effe, quem refpiramus; eademque *Caesaris Magati c* fuit obfervatio, & *Boylei d*, & *Boerhaavii e*. Aliquanto accuratius hæc definire oportet, cum inprimis hic a fummis viris diffideamus.

§. II. *An conftanter major atmofphæræ calore.*

Quando de calore agitur regionis, non adtinet eum narrare, qui perpetuus fit, idemque mediocris, & qui paffim in calidis regionibus non maximus eft, neque ad 86 gr. adfcendit, ut *Jamaicæ*, *Curaffaviæ*, *Cuduluri*, in *Antillis* infulis, *Bataviæ novæ*, in capite bonæ fpei, in ipfa æftuofa *Arabia*, in qua æftus per æftatem 85 & 90, & paucis locis 95 graduum fahr. fuit. Eae regiones nobis fervidæ videntur, non quod adeo enormes earum ardores fint, fed quod iil toto anno parum diminuantur, & noctu etiam parum decrefcant, uti *Cuduluri* totum difcrimen fere a 74 ad 77 gr. fuit. In tropica regione *Berbice* calor non infra 70 defcendit, neque ultra 96 adfcendit.

*burne of fea-difeafes, & Ill.*  
*Boerhaavii.*

*a* p. 318.

*b* p. 145.

*c* *De rara medicat. vuln.*  
p. 15. ed Venet. 1616.

*d* *Hift. fang.* p. 22.

*e* *Elem. Chem.* p. 192.



Qui vulgo recensetur calor, is in umbra mensuratur, & multo quam ad solem minor est. Hæc diversitas insignis est momenti; nam in umbra 75 gradus in sole 101 fuerunt, & ego Rupe, cum in umbra calor infra 100 esset, alias 117 alias 140 gradubus hydragyrum secundum album murum solem reflectentem adscendisse. Majorem etiam vidit Ill. *du Hamel*, ut in sole ad murum fuerit 167 graduum. Monspeli, cum in umbra esset gr. 30 in sole fuit gr. 60 Reaumur. omnino ut in priori adnotatione 9. In cubiculo 80 $\frac{5}{8}$  in sole 106 gr. fuit ap *Girardi h*. Cuduluri constanter per 15. dies gr. fuit 97, 98 & in sole 109 *i*. Sed etiam Monspeli, si fidum est experimentum *Cl. le Bon k*, cum in umbra calor esset graduum 31. Reaum., in sole fuit 80. In insulis Antillis in umbra ad 94 in sole ad 112 *m*. Sed etiam in Carolina calor solis fuit 120 *n* & 126 0 gr. calculisque recte positis 140. Ad Fluvium Senega calor ad 152 & in sabulo ad 191 adscendit.

*g Effets de l'air p. 71.*

*h Uva Ursi p. 41.*

*i Freylinghausen berichten in missionen.*

*k Mém. de l'Ac. de Monspel. Mém. de l'Acad. des scienc. 1706.*

*m Moultrie Febr. Flav. In Martinico 100 ad 141 Thibault.*

*n Phil. Trans. n. 487. 496.*

*o Chalmers diseas. of South Carolina p. 19. 22, 81, 26. 27. 81. 130. 131, 133.*

De eo nunc ergo calore quæritur, qui sit summus, quem homo tolerare possit. Eum utique non oportet in septentrione quærere, ubi non solum breviori tempore aer calet, sed etiam minori gradu, ut omnino non intelligam, quomodo sint, qui scripserint, calorem in universo orbe terrarum, omnibus computatis, summa totius anni inita, fere eundem esse. Etsi enim nunquam æstivi calores in borealibus ad solem 100 & paulo ultra graduum fuerunt, in Islandia, Petropoli, in sinu Hudsoni: in tabulis tamen nuperorum itinerum marinorum *s\** sub gradu 69 calor summus fuit 72. gr. Fahr. Borgesundi in Norwegia non superavit 70 gr. *s\*\**. Et qui balænas in summo septentrione persecuti sunt, media æstate gr. fere 32 Fahr. repererunt.

Mosambicensem aut Suaquensem calorem nimium credas, in quo sigilla liqueſcant *s\*\*\** plumbeæque glandes, & calcei torreantur, & cutis decedat *t*. Neque tamen penitus fabulosas vel istas historias dixerim, quoties eas cum venti Samiel, aut Harmattan, violentia comparavero, qui in desertis circa Euphratem fluv. Jamaicæ & alibi, subito mortales occidit *u*,

*s\** K. *Swensk Wet. Handl.*  
1759.

*s\*\** *Act. Soc. Drontheim.*

*s\*\*\** Boyle *nat. hist. of the air*  
p. 165. Kaempfer p. 322.

*t* Ludolph. *hist. Aeth.* 1. c.

*u* Quatuor millia hominum  
occidit Thevenot T. II. L. 2.  
c. 10. 16. vide Kaempfer p. 671.  
Balby *itin.* p. 33. Est Alfemari  
Avicennae L. I. T. II. doct. 2.  
c. 8.



etiam una die ad 4000, & pecora quæ deprehendit, necat, faciemque amburit  $\alpha$ , ut rubra tumeat, quasi ab ebulliente aqua percussa, & aquæ calorem eundem imprimat, qui sanguinis est  $\gamma$ . Ipse jam siroco ventus italis molestus a 72. gr. thermometrum coegit ad 112 ascendere, & denique languorem facit, ægre tolerabilem futurum, si diuturnus esset  $\gamma$ †. In Carolina calor 88 gr. somnum aufert, & gradu jam 97. vel 98. ægre fertur.

Deinde in ipsa mea patria non rarum est, ictus solis subito aut graves capitis morbos facere, aut ipsam mortem. Pekingi intra unicum diem, cum calore tantum 103. gr. plurimos mortales interiisse lego.

Demum peculiaris ille calor, quem in balneis experimur, plerosque in orbe terrarum liberi aeris æstus aut æquat; aut superat. Aquæ equidem minerales ad 114. 116. demum ad 150 ad 187 Fahr. ut in aq. de *S. Angelo & delle Colate* & ad 189½ gr. Pisciatellæ, ad 190 ut in Philip-pinis insulis, ad 190 ut in th. Aix en Foix,

$\alpha$  Chardin T. IX. p. 223. 224. 225. qui in Caramania ipse expertus est, & T. IV. p. 22. Thevenot voyag. T. III. L. I. c. 10. 11. 12. *Dampier of winds* p. 50. In arenosis Barbariæ Boyle histor. of the air p. 150. in Egypto Mallet T. II. p. 366. ed. belg. Habet etiam Perry p. 256. & Kaempfer.

$\gamma$  Thevenotus nisi fallor T. II. c. 34. 80. nec enim nunc ad manus est.

$\gamma$ † Brydone.

$\gamma$ \* Aponenses calent 52½ gradu: si Reaumuriani sunt, erunt gradus Fahrenh. 134. Vandelli diss. p. 7.

$z$  Nic. Andria.

ad 192. ut Cascianenses thermæ. Non tamen ideo eo gradu summum calorem continuerim, quem homo tolerat. Fert enim certa per exempla dudum nota 97. 98., 99 *d*, 100 *e*, 100 *f* & 116 gradus *g*, licet Cl. le Monnier calorem 40 grad. Reaumurianorum sive 120 fere gr. Fahr. tolerare non potuerit *h*. Sunt porro aegri, qui etiam 42½ & demum 47 gradum Reaum. per 7 vel 8 minuta in thermis ferant *i*, qui est 138 grad. Fahr. diutius toleraturi, si consuetudo *k* accerserit, multum enim ea potest. Celsus in hypocaustis Finnicis toleravit gr. 50 suos, inde didicit 60 ferre, & sunt qui ferant 75, qui aequales sunt gradibus Fahrenh. 167. Facilius vero tolerari siccum calorem quam humidum ibidem lego *k*\*. Quare etiam puella illa *du Hamelio* dicta calorem fornacis per 15 minuta ferre potuit, qui erat 135 gr. Reaum. &

*d* Libere in eo calore respiratur Senac in Heister T. III. p. 250.

*e* Martine anim. simil. p. 144.

*f* In aquis Bathonianis, per horas tolerari Glafs of Bath p. 27. Gradum 39 Reaum. plerisque convenire Mém. de l'Acad. 1752. p. 637. sed is est Fahrenheitii 113.

*g* In Russorum vaporariis 108 & 116. gradu calentibus per integram horam durant Gmelin flor. Sibiric. præf. p. LXXXI. Pene ardentem calo-

rem ferre Weber veränd. Russland. T. 1. p. 22.

*h* Mémoir. de l'Acad. 1747. Multos non ultra gradus 36 ferre Mém. 1752. p. 637. aut 113. grad. Fabr. Plancus aq. Pisan.

*i* Mémoir. de l'Acad. 1752. p. 636.

*k* In balneo vaporis prima die vix 6 minutis durant & pene diffuunt, inde ad 15 minuta edurant Springsfelds it. Carlsbad. p. 262.

*k*\* K. Svensk Wet. Acad. Handl. 1765.



aequabat gradus caloris Fahrenh. 336, calorem adeo multo majorem eo calore, quo aqua ebullit. Demum in illo aestu Caroliniano. ut aliqui mortales perierunt *k\*\**, ita alii & plerique vitales edurarunt *l*, calor vero Senegallensis & Caroliniensis etiam a laborantibus in sole aethiopibus toleratur, & calorem 115 graduum iidem aethiopes *l\** amant. Ita canes in vaporariis inclusi, gradu demum 113 *m*, 115 *n*, 122 *o*, & 146 *p* perierunt, & tolerarunt gradus 106 *q*, 109 *s*, 120 *t*, *t*, 126 *u*, & demum 146 *x*. in nostri *Dunzi* experimentis. Sed etiam in *du Hamelii* & *Tilleti* experimentis, cuniculos in calore 57. ad 59. Reaum. f. gradu 158 & 161. Fahr. vixisse videas. Idem *Ill. Collega* nuda animalia citius perire adnotavit, quam operta vestibus, ut calor cutem penetrare febremque excitare minus posset. Porro *Richmannum* calorem 125 graduum tulisse testis est *H. Brauns*.

*k\*\** Etiam in Europæ æstibus nonnunquam homines & animalia subito perierunt *Massa de febr. pestilen.* p. 146. *Derham phys. theol.* p. 17. die 8 Jul. 1707. Gamroni & homines pereunt, & canes *Kaempfer.* p. 721.

*l* *Phil. Transf.* n. 487.

*l\** *Chalmers* l. c. p. 18.

*m* *Duntze exp.* I.

*n* *Exp.* 2. 5 & 119. gradus.

*o* *Exp.* 3.

*p* *Exp.* 4.

*q* *Exp.* 6. per quatuor horas cum dimidia.

*r* *Exp.* 6.

*s* *Exp.* 6. Venæsectione revocatus est, qui eum calorem toleraverat p. 21.

*t* *Exp.* 3.

*u* Post sesquihoram demum in eo ardore periit canis *Experimenti* 5.

*x* Demum post 57 min. periit canis *Experimenti* 4. in calore 146. gr.

Demum etiam hunc aestum nupera experimenta superari posse vicerunt. Canis x†† quem 146 gradus dicebatur occidisse, sanus toleravit 220 gr. Deinde academici Angli gradus 198 202, 210 & 224 tolerarunt x†††, majores quam est æstus ebullientis aquæ. Verum etiam istos aestus superavit ille, de quo *Caroli Blagden* testimonium exstat, calor nempe 244 & 260 graduum, ut anxietas post 8 minuta accederet x††††.

Majorem ardoris excessum animalia frigida ferunt, si cum innato calore sui sanguinis comparaveris & constantem atmosphærici caloris tolerantiam. Primum in aquis calorem humani sanguinis æquantibus cyprini perpetim vivunt y; qui tamen calor totis, ad minimum, 92 z gradibus calorem sanguini eorum piscium familiarem superat, ut excessus inde idem sit, qui foret, si homo in calore fere 200 graduum viveret. Haec vero omnino multo majora sunt, postquam nuper didicimus in Philippinis insulis aquas esse 189 z†.

x†† *Phil. Transf. T. LXV. p. 1.* cum ad 110 gr. animalis calor descenderet.

x††† *Math. Dobson Phil. Tr. L. XV. p. 2.*

x†††† *ibid.*

y *Lucas l. c. p. 205, 206.* In calore gr. 72 vivunt *Muschbroeck instit. physic. p. 122.* inque tepidis oris thermarum ebullientium *Valisneri oper. T. III. p. 471. 472. T. V. p. 112.* Ad gr. R. 27. 29. 38.

vivunt cantharides & buccina *Vandelli p. 52.* tepet autem aqua 27mo. In thermis pisces & ranæ vivunt *Conring. calid. innat. p. 42. 43.* inque thermis Islandiæ calentibus *Anderson p. 17.*

z† *J. Plancus vir eruditiss. in therm. Pisanar. description p. 40.*

z *Phil. Transf. T. LXV. p. 1.*



## S. II. CALOR AN ATMOSPH. SUPERET. 59

Fahr. calentes, in quibus pisces vivant. Haec animalia cum ipsa ponas gradu 54. Fahr. calere, nunc in elemento 189 gr. calente vivunt, quod totis 120 gr. eorum nativum calorem superet, ejusque plus sit quam triplum, fere gr. 288. Ranas in Budensi bulliente aequa supervivere olim *Busbequius*. Arbores calorem ferunt 69. gr. R. & buccinum Jll. *Strange* teste vivit in thermis 88 graduum, cui calor nativus sit paucissimorum graduum supra 20.

In summo vero aestu calor corporis humani non sequitur calorem aeris. Dudum *Benj. Franklin* x\* adnotavit, se in aere 100 gradu calente omnibus ambientibus corporibus frigidiorum fuisse, & hydrargyrum ex aere exemptum sub alis descendere vidit *L. Chalmers*: deinde in calidis thermis 124 gradu humanus calor non superavit 112 x\*\*. In experimentis *Cl. Bankes* & fociorum calor humanus neque supra 108 adscendit, neque aeris calorem sivit in eo summo gradu aquae ferventis persistere, sed a 211. gradu decessit usque ad 198 y††. In calore aeris 120 & 130 gr. calor hominis sub lingua est 108 gr. y††. Aer 220 gr. calet canis, non supra 110 y†††.

Non ideo nimii caloris in aere ambeunte nulli sunt effectus. Pulsuum numerum vehementer crescere diximus; spiritus etiam laeditur & anxie-

---

x\*\* Ap. *Brown de viribus* ll. p. 182.

atmosphææ Edinb. 1770. & y† *Lucas* ibid. de aquis etiam  
*Franklin* lettres on différent su- Porcetanis.

jets.

y†† *Phil. Trans.* T. LXVI.

x\*\*\* ib. p. 101.

y††† *Phil. Trans.* T. LXV.

x\*\*\*\* *Haygarth* ap. *Falconer* p. 2.

tas supervenit, & intolerabilis demum sensus est aestus, neque absque periculo experimentum foret nisi homo fuga se letho eriperet. Quare neque mirum est, denique in majori caloris gradu animal perire. Avicula in calore 65 gr. Reaum. f. 178 Fahr. periisse dicitur, ex febre, ut credit Cl. *Tillet*, putrida 2\*. neque tamen etiam post eam sanguinis violentiam putredo adparebat. Ex calore cubiculi lipothymia & pene suffocatio *Hagedorn*. Sed etiam in aquis hoc ipso gradu calidioribus, quarum aestus ad gradus Fahr. fere 113 adscendit, etsi pisces pereunt 2\*\*, ranae tamen vivunt *a*, quarum sanguis 40 gradibus minus calet: quae iterum memorabilis caloris est tolerantia.

### §. III. *Calor Humanus, varius.*

In thermometro sub alas hominis dato argentum vivum ad 32 *Reaumurii b*, 94 *c*, 95. 96. *d* 98 *e*, 99 *f* Fahr. gradus in temperato aere descendit, ut

2\* *Mém. de l'Acad.* 1769.  
2\*\* Pereunt in gradu 96. *Muschbroeck*. In calidissimis aquis ranæ pereunt *Targioni viagg* T. II. p. 419. De Porcetanis *Lucas of waters*. T. III.

*a* *Cocchi bagni di Pisa* p. 59.

*b* In thermis Aponensibus plantæ vivunt *Mappus de potu calido* p. 27. *Mém. de l'Acad.* 1734. p. 562. 563. 1738. p. 492.

*c* *Boerhaave Elem. Chem.* T. I. p. 415.

*d* *Schwenke* p. 44. 45. *Rutty synopsis of miner. waters* p. 594. *Fahrenheit* apud *Martine*. A de Haen l. c. p. 153.

*e* *Martine anim. simil.* p. 142. de suo calore *Essays* p. 335. In *Minorca ins.* 98. & semel 100. *Rutty* l. c.

*f* *Matty Journ. Brit.* 1750. p. 447. Nimis frigidum sanguinem fecerat *Boerhaavius*, qui calorem humanum ad. 92 gr. Fahr. calculis politis pu-



alius homo alio fervidiorem temperiem nactus est, & diutius mensura adhibetur *f*\*. Sanguinis ipsius, aut viscerum abdominis vivi animalis aliquanto major *g* calor est, ut uno duobusve gradibus Fahr. superet. Accuratus Cl. Ant. *Martin Rolandi fil.* reperit calorem humanum esse fere 36, 37 gr. Celsii, qui fere essent 96 gr. Fahr. Urinæ & lactis fere  $93\frac{1}{2}$  calorem æstivo aquales & paulo majorem; calorem in ala & inguine fere  $93\frac{1}{2}$  in pectore 90. *g*\*.

Calorem hunc paulo majorem facit Cl. *Home*, ut in infante nuper nato sit a 94 ad 100; anno  $4\frac{1}{2}$  a 94 ad 99; ætate media a 95 ad 98; in senibus a 98 ad 100.

Iterum calor uno alterove gradu vesperi quam matutinis horis major est & per noctem decrescit. Nuper Cl. *Brauns g\*\** reperit calorem in ore hominis esse  $97\frac{1}{2}$  gr. calorem urinæ uno gradu vel  $1\frac{1}{2}$  majorem. In febre hominem caluisse ad usque 108 gr.

Inde Cl. *Antonius Martin Roland fil.*, variis experimentis reperit, in variolis calorem pectoris fuisse 37 gr. Celsii; eundem calorem in manibus

tatat veget. stat. c. 1. p. 59. & Cl. *Sauvages*, qui 30 *Reaumurianos* gr. admisit effets de l'air, & magis adhuc *Pitcarnius* apud *Martine*, qui 90. *Fahrenh.* Nimis calidus potius fit, si dimidium calorem aquæ ebullientis ipsi tribueris *Phil. Transf.* n. 271.

*f*\* A de *Haen* l. c. p. 157. ad sex demum gradus liquor per moram adscendit.

*g* *Martine anim. simil.* p. 174. *Essays* p. 336. 337. 338. *Whytt physiol. ess.* p. 16. non adeo 12 gradibus, ut *Theophilus Lobb de febr.* n. 259. Urinam quatuor gradibus calidiorem facit *Hales* l. c.

*g*\* In *K. Svensk Acad. Wet. Handl.* 1764. 4. 1768. trim. 2. 1773. trim. 3.

*g\*\** N. *Comment. Acad. Petrop.* XIII.

36 pedum 34 Deinde tertio die calorem in pectore & in manu 38. Iterum alarum calorem 35. pectoris 34. manus 36 pedum 31.

Inter animalia multa sunt, quæ aliquanto magis calent, ut ex quadrupedibus carnivoris canes *h*, felesque *h\**, & cuniculi, quorum calor est fere 103 *h\*\** graduum, tum porci, phocæ, sanguinei animalis, quibus 102 in cute & 103 graduum in abdomine calor est *i*. Deinde aves etiam istas bestias superant. Inter femora enim gallinarum, & columbarum, & monedularum, liquor thermometri ad 103. 104. 106. 107.  $107\frac{1}{2}$  & 108 gradus adscendit *k*. in anserem ad  $107\frac{3}{7}$  in rubicilla ad  $111\frac{1}{5}$  *k†*. In corde monedulae *k\*\** 109 gradus *Whyttius* reperit, in recto intestino  $107\frac{1}{2}$ .

Sed etiam in hominibus per febres calor major nascitur *l*. In febre rubra tantum fuisse aestum legimus, qui de faucibus aegri exibat, ut medicus caput a vapore detorqueret *m*. In morbo bouum sanguis calidissimus *n*, etiam ad tactum fuit, inque malignis febribus aestus acerrimus *o*. Fuit, quæ balnei aquam suo aestu vehementer calefaceret, calida vero aestimatur aqua,

*h* Martine anim. simil. l. c. essays p. 336

*h\** Sanguinis calor duobus gradibus major est.

*h\*\** Brauns.

*i* Martine ibid. p. 337.

*k* Martine anim. simil. p. 142. essays l. c. *Whytt* l. c.

*k†* Brauns.

*k\*\** *Whytt*.

*l* Navier sur plusieurs maladies populaires.

*m* Fränkische Anmerkungen T. II. p. 105.

*n* Huxham sore throat. p. 58.

*o* Cl. Chomel in thes. Ergo tumidis hæmorrhoidibus birudines.



quae 100 gradum attingit. In pleuritide inf. Minorcae *p* aegrotantium aestus fuit grad. 102 & 104, idemque 102 grad. in flava febre *q*, in febre vero intermittente 104 *r* grad. & alias 106 & 108 *s*, in continua ad 109 *t*\*. Ultimum gradum caloris *Martinus* & *Naesman* ad 110 Fahr. fixerunt. Certe, qui summus caloris animalis gradus est, is in cane fuit, quem *Arnoldus Duntze* vaporario 146 gradu calenti incluserat. Is tamen in abdomine 110 grad. non excessit *t*\*\* in homine 112. *t*† Unicum enim experimentum nondum recipio, hominis, qui manus suae calore, thermometer *Fahrenheitianum* fregerit, qualia spiritu vini repleta 112 gradu terminantur *u*. Neque Surinami, in calidissima regione, sanguis magis incalcescit, quam nostratibus. In ore enim ipso thermometer gradum 94 ad 97½ indicavit *x*, & calorem humanum cum calore aeris non pariter intendi, neque sub aequinoctiali linea, quam in Europa, majorem esse, adnotavit *lll*. *Senacus y*, neque in maxima febre ultra 8 vel 10 gradus calorem animale superare *y*\*. In nuperis Britannorum periculis vidimus calorem humanum non supra 108 grad. ascendisse, etsi calor atmosphaerae ad 200 &

*p* Cleghorne of Minorca p. 245. 246.

*q* Essays medical and literary of a Society at Edimb. T. II. art. 29.

*r* Schwenke p. 57.

*s* Martine Essays p. 342. Schwenke p. 77. Tantum 100 in quartana Schwenke,

*t* Schwenke p. 77.

*t*\* A. de Haen p. 168.

*t*† Sauvages inflamm. p. 238.

*t*\*\* Duntze exp. 4. p. 26.

*u* Wolf vernünftige absichten n. 208.

*x* Algem. Magazin T. V.

*y* l. c. T. II. p. 247.

*y*\* Idem ibid. p. 246.

260 gradus auctus fuerat. Quare putarunt Cl. viri gaudere hominem vi, quæ calorem in atmosphæra minuat. Id repugnat experimentis alias repetendis, quæ ostendunt, hominem aerem ambeuntem per respirationem phlogisto saturare. Quare non plus inde deduxeris, quam eam esse legem, ut nulla violentia caloris exteri in vivo animale calorem supra 112 possit augere.

#### § IV. *Electrica materies.*

Sequitur ut de elemento agam duplici, pariter ut halitus volatili, quod nuper in sanguine Cl. viri ceperunt admittere, & cujus levem quendam hic gustum offero, cum rem novam, nondum satis constitutam, nullo meo proprio experimento illustratam, omnino indicare potius possim quam plene exponere.

Primum *electrica materies* in sanguine nostro perinde, ut in omni alio fere corpore, reperitur, ignea ea, cum phlogisto comparata proxime adfinis z, odore certe proprio phlogisti z\* subgravi, potentissimarum eadem virium. Ea in solito corporis humani statu nullum sui indicium edit, æquabiliter, ut videtur, per universum corpus distributa.

Eadem quando in torrentem per frictionem incitata, vel in corpus humanum congesta, se in vicinum corpus exonerat, minus ubertim ea dotatum,

---

z Winkler qua ratione ignis  
 & mater. electr. p. 167.

z\* Gerhard Mém. de l'Acad.  
 de Berlin 1752.



tatum vel vicissim ex corpore electo pleno in nostrum minus eo elemento dives recipitur, insignes utrobique effectus edit. Scintilla nempe ex quacunque corporis parteeducta ignis vim habet, vaporem pulveris pyrii & spiritus vini accendit, in corpore nostro, qua scintilla recipitur, dolorem facit insignem & concussionem, quæ late propagatur, uti major ejus vis est; demum si scintilla potentior, & ictus validior fuerit, animalia minora occidit, laceratis eorum vasis, & effuso sanguine: potentior etiam magna animalia denique necat, qualis ex ferreo cylindro exeuns, cum scintilla atmosphærico electo tonitruali onerata esset, *Richmannum* subito exanimavit. Singulare vero est, ictum in caput electricum animal fere occidisse, ut tamen ictus in sternum datus idem i suscitaret.

Idem elementum in torrentem incitatum pulsum duplo accelerat 2, & humorum motum duplo auget, respirationem incitat, ovorumque exclusionem præcipitat.

In sanguine habitat, & de sanguine ex vasis effuso scintillæ specie exsilit, & conspicuum etiam de vena incisa cum sanguine exsiluit, ut de musculo, tendine, nervo.

Negativa electricitas contraria facit, & liquorum motum retardat. Cum perspirante

1 *Coll. Haf.* II. p. 60.

effect. electric. in corpus anim.

2 *Gerhard. Mem. de l'Acad. de Berlin.* 1772. *Kastlin de*

*Tubing.* 1775. 4.

materia sanctoriana potissimum de pilis 4 & plumis psittaci emicat. In dorso felium notissimum, etiam in nonnullis hominibus abundat ut electricas scintillas de linteis excutiant, quibus amiciuntur. 5 Limbus electricus de corpore humano undique exhalat. 6

Per communicationem electrici 6\* sunt nervi, cula, fibra lignea. Non recipiunt electricam naturam pars serosa sanguinis, feri, muscoli sicci, intestina sicca, gelatina sicca. Perfert & communicat oleum animale, medulla, lymphæ, ungues, capilli. Conductores sunt globuli rubri, sal urinæ fusilis, intestina, ossa recentia, cutis humida, nec sicca; & uno verbo videtur per experimenta confici, corpora animantium sicca non esse electri conductores, & quæ videantur conductores esse, ea in ratione aquæ quam contirent, eo officio fungi.

Potentissimus stimulus idem electrum est, qui musculos & cor ipsum ad motum fuscitat, quo tempore ad omnes alios stimulos obsurduerunt. Vidi in gallinis aquis merfis tactum electrica virgula musculum caudam animalis & crus erexisse, vitam tamen non rediisse. Eadem est scintilla, quæ nunc demum de anguilla stuporifera conspicue emicuisse visa est, ut concussionis electricæ torpedinis non alia causa sit.

Idem electrum corrigit aerem 7 clausum, nec

4 Castillon in se ipso. Berlin 1776. Nov. Magaf. II. p. 485. 486.

5 Roux, Journ. 1775. Sept.

6 Poncelet.

6\* Rosier 1776.

7 Schintz, de electr. p. 28.



renovatum, & animal refocillat, quod in ejusmodi aere perituum anhelat.

### §. V. Halitus.

Solo tactu ignis, halitus etiam oculo percipitur. Nempe sanguis ex sani hominis incisa vena emissus, aut sanguis vivi animalis aeri utcumque expositus, fumum evidentem exhalat, quem etiam æstivo tempore adscendere videas, hiberno tamen magis. Eum vaporem nescio annon primus *Helmontius* c viderit, qui nuperis medicis nunc vulgo innotuit d. Est in eo subsalsus sapor, odorque paulum foetidus e, urinosi ingenii, acrior uterque in morbis f, gravissimus in variolis \* aliis morbis acutis i. Cum feri odore comparatus est. f\*.

Sed etiam urtica marina, quæ ab urendo nomen habet, vaporem, dum se constringit & dilatat, emittit, qui oculos acrimonia inflamat f\*\*. In animalibus carnivoris factidior est g, herbivoris mitior. De eo odore, qui epidemia Nea-

c *Aur. vital.* p. 577. edit. *Elzevir. oper. omn.*

d Conf. M. *Malpighius* de polyp. p. 430. *Thomas Cornelius* progymnasm. VII. *Phil. Verheyen.* L. II. p. 36. (spiritum vocat roriferum) *J. Maria Lancisius* p. 18. 19. ed. nuper. *Pet. Ant. Michelotti.* de separat. fluid. p. 55. *Thomas Schwenke.* l. c. p. 90.

e *Rob. Boyle* de conservat. corp. in vacuo M. *Malpighius*

l. c. *Lancisius* l. c. *Michelottus* l. c. *Schwenke* l. c.

f *Simon Pauli* in digress. de febre malign.

\* *Barthol. Mesny* ap. *Targioni* raccolta III.

i *J. Welthof* oper. pag. 140.

f\* *Butt.* spont. separ. p. 56.

f\*\* *Berthelot* de l'air.

g Is est vapor fætidus, qui de canis corde exhalabat *Ky-per.* de hum. pericard. n. 36.

politana g\* infecti fuerant, ipsi querebantur, & a miliari febre mori vidi, qui mortem suam se olfacere clamabat. Sed etiam de humano sanguine nonnunquam olidus vapor exhalat, & huic ipsi causæ imputatum est h, quod a tractatis vulneribus morbi exitiosi chirurgos invaserint. Lochiorum sanguis fætet \* sed id loco tribuas, ex quo fluit, & stagnanti in calore cruori.

Utique magis exhalat in calore majori, & plus feri etiam de grumo secedit. h\*

Idem vapor, quando levissimo ignis gradu adhibito de sanguine adscendit, & purissimis vitreis vasis excipitur, in aquam i coit, ut reliqui vapores, qui de corde, visceribus, membranisque animalium tepentibus exeunt. k Ea aqua parum odora l, pene insipida, nullum aut acidæ indolis signum, aut alcalinæ, cum aliis salibus commissa edit. m Eadem perspirationis materia esse videtur.

Hoc vapore amisso, reliqua sanguinis massa in eodem volumine plus habet ponderis. Discrimen ejusmodi facit Cl. *Jurin*, ut calidus sanguis 1053 partes pendeat, frigidus 1055. n *Georgius Martine* o aliquanto majorem diverfi-

g\* *Fasano*, p. 204.

h *Vauguyon* oper. de Chir. p. 242.

\* *Buttner Kindermord*. p. 12.

h\* *Butt. spont. sang. separ.*

i *Boerhaave Elem. Chem.*

T. II. p. 355. oper. 119.

k *Conf. L. IV. p. 295. 296.*  
ed. 1757.

l Odorem tamen inesse *Car.*

*Aug. v. Bergen hæmatosc.*  
pag. 8.

m *Boerhaave l. c.*

n *Diff. phys. math. VIII.*

pag. 204.

o *Essays of a Societ. at*

*Edimb. T. II. pag. 97. n. 7.*

pag. 99.



tatem reperit, ut pondus calentis sanguinis ad pondus æquale sanguinis frigidi se habere doceat, uti 135 ad 134. Iterum aliquanto majorem rationem facit amicus noster olim singularis *J. Fr. Schreiberus*, nempe 100. ad 99. *p*

### §. VI. *Phlogiston.*

Phlogiston f. id quod ignem capit, purum, aliud est a pinguedine, quæ præter id inflammabile plurimo acore constat. Hujus elementi incipimus dotes aliquas deterere.

Phlogisti odor cum acore in electrica est materie 1. In alimentis habitat, & a natura animali in electrum perficitur. 2

Ejus certa portio in sanguinis parte rubra salubriter inest. Pars superflua 3 de pulmone exhalat, nisi exhalaret magnorum morborum causa futuram. In sanguinem ex aere transeuns eum reddit inflammabilem. In adipe etiam abundat. 4 A phlogisto calorem esse, & a ferro ruborem puto hunc a ferro phlogiston accipit.

Eodem phlogisto motum muscularem *Cl. Priestley* tribuit. Per universum autem etiam continuo exhalat, & æquilibrium requiritur

*p* *Almagest*, p. 156. Priorem huic eandem facit *Martine*, sed insigniter certe differunt.

1 *Gerhard* 1, c.

2 *Priestley*, différentes sortes d'air.

3 *Moscatti*.

4 *Id.*

ad hominis integritatem, inter id phlogiston, quod ab alimentis accedit, & id quod exhalat. §

Longius progressus J. *Hunterus* 6 sanguinem vivere docet, & in vasa coagulatum se fingere. De ista quidem hypothese dicemus, quando de formatione partium corporis animalis dicetur. Vitam nostram in humore esse, cui pene toti amisso supervivimus, omnino non videtur probabile.

§. VII. *Pars rubra sanguinis sive cruor.*

*Ponderosior est sero & aqua.*

Diximus sanguinem, qui de vena fluit, continuo totum coire *q*, ut hactenus ejusdem ingenii totus liquor sit, qui vivi animalis vasis continetur. Verum post brevem utique moram in vase ampliter aperto, lentius in clauso *q*<sup>\*</sup>, sudat rubrum coagulum, & flavæ ex eo guttulæ adscendunt, qualis etiam aquula de conpuncta placenta per foramina stillat. Eadem aqua super cruorem natat, magna vero ejus pars penitus volatilis avolat, ut de unciis sex intra octo horas grana 64 *q*<sup>\*\*</sup>, & intra primas 24 horas sanguinis totius dimidia pars in vaporem consumpta aufugerint *q*<sup>\*\*\*</sup>. Ita pergit cruor minui, quoad ejus feri multum natum sit, &

§ Id.

6 *Comment. Med. XI.*

*q* *Almagest. p. 16.*

*q*<sup>\*</sup> *Butt. p. 6.*

*q*<sup>\*\*</sup> *Schwenke p. 85. Sextam ponderis partem C. Aug. v. Bergen l. c. p. 8.*

*q*<sup>\*\*\*</sup> *Schwenke p. 90.*



placenta in vase suo libera moveatur : manifesto argumento , duos in venoso , aut arterioso , vivi animalis sanguine diversæ naturæ humores esse , qui misti , dum animal vivebat , unum sanguinem constituebant.

*Cruorem* amamus eam partem vocare , quæ rubra , quæ ponderosior est , quæ globulis constat , quæ sola ferrum continet , & partem inflammabilem. In colore nihil est , quod dubium sit. Omnis enim aqua , quæ de cruore secedit , perpetuo flavescit , neque quidquam præter cruorem in animale rubet. Partem colorantem sanguinis perexiguam esse <sup>1</sup> novimus , & magnam vim aquæ tingere , etiam millecuplam <sup>2</sup> , & globulum ipsum rubrum subviridem esse <sup>3</sup> , atque a phlogisto <sup>4</sup> demum ruborem concipere , & demum nigrum fieri , si repletus phlogisto , in aere phlogiston recusante detentus , se suo phlogisto per exhalationem non possit liberare. <sup>5</sup> Ea omnia , cum meis experimentis comparata , eo redeunt , ut totus quidem globulus ruber sit , in centro vero iste rubor congestus intensior adpareat. De pondere possit ambigi , siquidem eximius olim & de universa naturali philosophia , & de sanguine auctor , cruorem in fero natum , tantoque leviores esse scripsit , ut ratio sit utriusque , quæ 1041 & 1154 , fere quæ 10 & 11 r ,

<sup>1</sup> Butt. I. p. 40.

<sup>2</sup> Ib. p. 41.

<sup>3</sup> Moscati.

<sup>4</sup> Id. ib.

<sup>5</sup> Ib.

<sup>q\*\*\*\*</sup> Butt. separat. Spont. sang. p. 11. 12. 13.

<sup>r</sup> Robertus Boyle append. ad hist. sang. p. 28. 57.

neque mirum est , Ill. viri auctoritatem alios scriptores in suas partes traxisse , cum ejusmodi experimenta instrumentum otiumque poscant , quo omnino multi eruditi viri , verique cupidi destituuntur. s

Olim ergo grumum sanguinis rubrum sibi permissum fundum petere monuit *Hieronymus Barbatius* t , idque experimentum alii u confirmarunt. Inde fit , ut grumi pars superior exalbescat. x Sed etiam globulos rubros sero graviores esse senserat *Antonius v. Leeuwenhoeck*. y Sed accuratius *Jacobus Jurin* z ponderis , quod specificum vocatur , sanguinis ad serum , eam rationem aestimavit , quæ est 1054 ad 1030 , cruoris vero solius ad serum , uti 1126 ad 1030. a *Georgius Martine* globulosam massam solam ad serum facit , uti 1093 ad 1022 , sanguinem vero , uti 1045 ad eundem numerum b. Sollicita cura *Petrus Musschenbroeck* c hæc pondera definierat. In homine sanguinem totum reperit ad aquam se habere ut 1046 ad 1000 , cruorem solum ut 1084 , serum

s Serum una sexta parte quam sanguis gravius est *Schreiber Element. med. mathematic. p. 235.*

t De sanguine & sero. pag. 154.

u *Pasta* l. c. p. 74. *Europ. medic. p. 264.* *Schwenke* pag. 102. *Jurin* l. c. pag. 99. 100. *Butt.* p. 49.

x *Petit* , *hist. de l'Acad. des Sciences*, 1733. p. 31.

y *Phil. Transact. n. 106.* deinde *Antonius de Heyde obs.* 86.

z *Phil. Transact. n. 361.* diff. VIII. p. 104.

a *Ibid.* p. 110. Experimentum dat 1034. Sed ob varias rationes eum numerum corrigat ad 1126.

b l. c. p. 104.

c *Instit. physic.* p. 364.



## S. II. CRUOR PONDER SERUM SUPERAT. 73

solum ut 1027 ad 1030. In cane sanguis arteriosus erat 1082, venosus 1062. In agno sanguis pendet 1060. serum 1019. In vaccis sanguis 1058, serum 1042.

Cl. olim medicus, *Swiftii* amicus & *Popii*, *Johannes Arbuthnot* rationem, involutam quidem, dedit sanguinis ad serum uti 1020 ad 1000. *d* Deinde *Thomas Schwenke* sanguinis pondus ad pondus feri reperit, uti 1173 ad 1142 *e*, cruoris vero seorsim sumti, ad idem serum comparati, uti 1204 ad 1142. *f* *J. Baptista Mazinus* rationem sanguinis ad serum admittit, quæ est 1886 ad 1803. *g* *G. Erhardus Hamberger* multa experimenta fecit, quæ eandem proportionem ponderis confirmant, feri nempe ad sanguinem venosum pondus in homine facit 400 ad 409, in cane uti 500 ad 515. serum vero sanguinis arteriosi suum ad sanguinem, uti 500 ad 525, neque in cane aliam rationem constituit. *h* Inde vir Cl. *Johannes Silberling* in eodem volumine sanguinis reperit partes 216, feri 209. *i*

*d* l. prox. cit.

*e* l. c. p. 123.

*f* l. c. conf. p. 62.

*g* *Mechan. morbor.* T. 1. p. 34.

*h* *Physiolog.* p. 4. In vacca eandem rationem feri, ad sanguinem, facit uti 519. ad 527, in equo uti 508. 528. in sue uti 503. 513. satis similes om-

nes.

*i* p. 15. Varias autem rationes reperit, ut sanguis ad serum modo esset uti 10. ad 8, modo uti 11 ad 10, modo uti 12 ad 10, p. 14. *diff. de humor. corp. human. gravitat. specific.* Argent. 1749. V. de rebus.

2206, feri ut 1938, ut grumus tota octava parte feri pondus superaret.

Ex his omnibus, paulum utique diversis, conficitur tamen, cruorem fero graviorem esse, hinc etiam sanguinis ex fero & cruore misti pondus feri gravitatem, minori utique discrimine, superare. Vera enim ratio ponderum specificorum rubræ albæque partis sanguinis vel ideo vix erui potest, quod cruorem sincerum habere non detur. *l*

Juvat etiam comparatum cum aqua sanguinis pondus addere, quale præcipui in experimentis viri constituerunt, etsi non ignoro, ipsam aquam, perinde uti sanguis, pondere alio esse, alioque, ut alia & alia purior fuerit. Ergo *Jurinus* sanguinis totius pondus, ad pondus aquæ reperit, uti 1051. 1053 & 1055 ad 1000, ut medius fere inter dissentientia experimenta numerus foret 1053. Cruoris solius pondus ad eandam aquam facit, uti 1126 ad 1000. *m* Porro vir Ill. *Thomas Schwenke*, per experimenta magna cum cura instituta, totum sanguinem ad aquam facit uti 1173 ad 1110, cruorem uti 1204 ad 1110, sive uti 12 ad 11 proxime. *n* Cl. vir *Petrus v. Musschenbroeck* sanguinis ad aquam rationem habet ut 1040 & 1056 ad 1000, feri ut 1027 ad 1000, cruoris absque fero ut 1084 ad 1000. *o* *Georgius Martine* sanguinem ad aquam facit uti 1056 aut 1057 ad 1000, ferum ut 1032. *p* *Mazinus* sanguinis

*l* *Gaubius pathol.* p. 163.

*m* l. c. p. 104. 108.

*n* p. 123.

*o* l. c.

*p* l. c. 94 & 100.



ad aquam rationem habet 1886 ad 1749 *q* :  
*Hambergerus* *r* 409 ad 385 : *Fridericus Hof-*  
*mannus* , celebrior ille Halensis medicus 615 ad  
 585. *s* *Cl. Silberling* sanguinem , in diversis  
 experimentis , aqua graviolem reperit  $\frac{10}{288}$  mis  
 deinde  $\frac{11. 12 \& 14}{288}$  mis ferum vero  $\frac{8. 10 \& 11}{288}$  mis *t* , &  
 alibi , sanguinem ad aquam facit uti 281 ad  
 261 *v* , ferum uti 272 ad 261. *Adolphi Fride-*  
*rici Hofmann* rationes sunt  $\propto$  sanguinis totius  
 ad aquam uti 2072 ad 1875 , grumi rubri uti  
 2206 ad 1875 , feri solius uti 1938 ad 1875 :  
 ut massa sanguinis decima nona parte sui pon-  
 deris aquæ pondus superet , ferum nonnisi tri-  
 gesima prima. *y* Ex *Martinii* experimentis  
 uncia anglici ponderis æquivalet 1 , 6526 poll.  
 sanguinis calentis , uncia vero sanguinis occu-  
 pat 1. 813 pollicis. *z* Ad aquam falsam *Johan-*  
*nes Arbuthnot* sanguinem & ferum comparavit ,  
 reperit sanguinem ad eam aquam se habere uti  
 26 ad 15 , ferum uti 300 ad 353. *a* Ad  
 aerem rationem recepit *Cl. Hales* , quæ est  
 841. I. *a*\*

### S. VIII. Sponte cogitur in scissile quasi hepar.

Mirum omnino videri possit meditato , cruor

*q* l. c.

*r* l. c. p. 3.

*s* *Med. system.* T. 1. p. 92.

*t* l. c. p. 14.

*v* p. 15.

*x* l. c. p. 5. 6.

*y* *Nov. hypothes. de reb.*  
*phys.* p. 17.

*z* l. c. p. 100.

*a* *Essay concerning the nature*  
*of elements.* p. 121, 122.

*a*\* *Hæmæstat.* p. 98.

rem , qui pene totus aqua sit *b* , cogi posse , & fluidissimum aquæ elementum inter sanguineas moleculas quasi coerceri , & una firmum stare. *c* Et tamen hanc coagulabilem sanguinis naturam facillima experimenta ostendunt. Diximus , ut in vivi animalis vasis sanguis in unguin's speciem coeat , quam primum perpetuo motu circumagici cessat. *c\** Emissus idem , si exigua massa fuerit , in laminas ruberrimas , lentas , tremulafque , ad gelatinæ modum Pezizæque hibernæ cogitur. Major massa aut in figuratum intra vasa sua grumum *d* , aut in latam figurabilem scissilemque placentam in patera coit , quæ sero continuo secedente in insulam solidescit , quam plurima aqua circumfluit. Eluta placenta quasi in cellulofum reticulum abit , in quo laminæ sunt. Dum ea aqua avolat *e* , evanescit insula , donec crusta rubra , subnigra , sicca , friabilis supersit , quæ patellae ambitum obducit. *f* Eam crustam celerius ex ruforum hominum sanguine nasci Cl. auctor existat. *g*

Coit autem in placentam in aere utcunque calente , certe in Europa , aucto calore etiam magis , ut ad 125 grad. fahr. *g\** Maximo in aestu omnia fluida corpora dissipantur. In frigore etiam absque sero *b* ante reliqua sanguinis

*b* Ostenditur in analysi , 85. Eller , *Mem. de l'Acad. des sciences de Berlin*. T. VII.  
 quanta in sanguine aquæ sit portio.

*c* Schwenke p. 147.

*c\** p. 20.

*d* p. ib.

*e* p. 38.

*f* De Haen *rat. med.* p. 84.

*g* Intra 24. horas Burggraf de aere & aq. *Francof.* p. 13.

*g\** Hensson *Phil. Transf.* LX. in vena ligata.

*b* Birch l. c. T. II. p. 445.



elementa congelatur *i*, in frigore nempe, quod 9. 10 gradibus Reaumurianis determinatur. *k*

Solent medici galli *l* nuperiores monere, duriora coagula esse, quæ ex sero nascuntur, & serum vi densabili cruorem superare, cum in frigida coeat, in qua sanguinis pars rubra fluiditatem conservat. *m* Verum certum est, etiam ex rubro cruore, dura nasci coagula, & quidni nascantur, cum in ea sanguinis parte, & terræ, & ferri, plurima sit portio. Et primum, ne membranas *Ruyschianas* sero tribuas, certum est *Ruyschium* una cum sero integrum sanguinem quassasse *n*, inque membranam vertisse, quam solebat medicis, qui se inviserent, ænigmatis loco ostendere. Totum etiam sanguinem de vena calentem, in lagenam receptum *p*, quassando brevi in membranam mutavit Vir Ill. *Antonius de Haen* *q*: recentem autem esse oportet, nam conservatus eandem membranam non reddit, neque ex sero ea membrana fit *r*, & ablata ea membrana tamen serum concrescibile superest. *s* Sanguis arteriosus post amputatos artus in cellulosam telam effusus, in fibras

*i* Diebold de aere.

*k* Idem ibid. p. 23.

*l* Petit, Mem. de l'Academ. des Scienc. 1732. p. 393. Senac T. II. p. 92. etiam Cl. Butt. p. 6.

*m* Petit, l. c.

*n* Thes. VII. n. 39. Thes. I. aff. l. n. 3. Thes. max. n. 158. Cur. renovat. n. 15. Thes. VI.

n. 15. conf. Bæhmer de præcar. polyp. p. 13. 14. Loescher Anthropolog. exper. pag. 35. Malphighius de polypo p. 126, sed inprimis Cl. de Haen,

*p* Haen p. 88.

*q* Idem p. 91. 92.

*r* Idem p. 87.

*s* Idem p. 94.

indurescit *t* & similia in fila, coriique speciem in aneurysmatibus coit. Denique rubra illa fila, fibræque solidæ placentæ sanguineæ, quæ ex sanguine in uterum effuso nascitur *v*, satis ostendunt, etiam ex rubro cruore firma coagula parari. In sanguinea crusta, quæ siccata in solidam naturam abiit, fibrosus & cellulosus habitus adparuit. *x* Demum etiam in vivo animale grumi sanguinis enati duriores fuerunt. *y* Id quidem non recusavero, secedere sensim globulos ipsos fundumque petere, per Cl. *Davies* experimenta.

Uti sponte grumus ruber ex fluido sanguine nascitur, ita firmitus coit idem, si præterea calor major accesserit, sive is circa 125 140 *z* gradum *Fabr.* aut aliquanto major *a* fuerit, sive demum omnino ebullientis aquæ fervorem attigerit: ita enim densus, & tamen intus rubens *b*, grumus nascetur. Etiam testudinis fluidissimus sanguis coctus cogitur. *c* Neque ob fluidarum particularum jacturam nova hæc soliditas nascitur, nihil enim grumi ponderi decedit, dum coagulatur *d*: & oportet utique adtractilem sanguinis vim hic adgnosceret, cujus efficaciam sublatus motus progressivus nunc liberam sibi reliquit.

*t* *Monro Essays of a Society at Edimb.* T. II. p. 173.

*v* *Smellie cases in midwifry.* p. 96.

*x* *Frank, Anmerk.* T. I. p. 446. 447.

*y* *Mem. de l'Acad. de Chir.* T. II. p. 21.

*z* *Schwenke* p. 106.

*a* pag. 136. Ad ignem coire vidit *Willisus* de cerebre. pag. 134.

*b* *Schwenke* p. 106.

*c* *Oexmelin, hist. des avant.* T. I. p. 86. 87.

*d* *Schwenke* p. 136. 137.



## Sec<sup>ti</sup>. II. CRUOR COGITUR ITER. LIQUESCIT. 79

Uti calor igneus, ita febrilis æstus sanguinis naturam compactilem auget. In valida febre vis cohæſionis sanguinis ab 8, 9 & 12 gradibus qui in sano homine sunt, crescit ad 32 *e*, 48, 56, & funesto equidem eventu ad 64. In homine sano, in placentam cruoris ante 24 horas emissi, dimissum octo drachmarum pondus grumum frangit, in febre vero etiam 70 drachmæ requiruntur, ut placenta foream recipiat. *f*

### §. VIII. Idem sibi permissus dissolvitur.

Grumus coacti sanguinis paulatim in libero aere, & in modico calore *g* aut 50 graduum, aut minori, in majori tamen celerius *g*<sup>\*</sup>, putrescit, & levior fit sensim, ut in aqua nunc natet, mergique renuat *h*, qui recens emissus continuo subsidebat. Ita in aquam flavam *i* & volatilem fætidamque *k* naturam degenerat, quoad, præter eam rubram crustam, quam dixi, nihil supersit: celerius tamen in juvene, in sene tardius cruentum grumum evanescere auctor est Cl. a Bergen. *l* Non sine risu videas celebrem olim medicum, sanguinem post elapsas 24 horas in aquam resolutum, pro re rara & aquae spadanae simili habuisse. *n* Sed etiam in

*e* Brownè Langrish modern. practice p. 68. 229. &c.

*f* Samuel Mibles, ad versionem primarum linear. physiolog. T. II. p. 357.

*g* Schwenke pag. 123. add. Pringle exper. p. 416.

*g*<sup>\*</sup> Butt. 1. c. p. 9.

*h* Schwenke p. 113.

*i* Harwei de gener. p. 160.

*k* Norford of cancrors tumours p. 107.

*l* 1. c.

*m* Schwenke p. 90.

*n* Heers spadacrene obs. 23 p. m. 207.

vivo homine maxima effusi in cellulofam telam cruoris coagula diffolvuntur *o* & evanescunt, ut ruber grumus in fuscum, tunc in viride, deinde in flavum liquamen redeat, maneatque a dissipato cruore similis fere rufus pulvis *p*, qualis a sanguine post exhalationem superest. Mirum exemplum juvenis recorder me vidisse, cui a praecipiti ex alto lapsu sanguineum, quasi alterum caput vertici accesserat, Is enormis, facile unius librae grumus, secundum cellulosa musculorum, & ossium spatia, in palpebrarum duplex intervallum, faciemque descendit, ut ea aethiopis similior esset: neque multis diebus interpositis, per eos, quos exposui, colorum medios gradus tota ea massa dissoluta evanuit. Idem calor incubantis gallinae sanguinem per menses fluidum retinet, neque cogi permittit. *q*

Sed in vivi etiam hominis vasis sanguis ita mutatur, ut amissa natura coagulabili pallidum in liquamen abeat, quod porro nulla arte, nullo alcohole corrigi cogique queat, neque membranas illas dare aptum sit. In cachecticis, chloroticis, *r* aliisque debilibus *s* scorbuticis *t*, & haemoptoicis *u* aegris res vulgo nota est, eoque refero eorum hominum historias, quos aiunt  
solo

*o* Heucher p. 349.

*p* Sub unguibus de dissipato sanguine superfuisse Schwenke p. 99.

*q* Birch l. c. T. III. p. 238.

*r* Freind *Ennenol.* p. 118. Edit. Oxon.

*s* Wepfer de apoplex. pag. 365.

*t* Huxham of fevers c. 5.

*u* Ex hæmoptoici sanguine membrana Ruyschiana parari nequit de Haen p. 95.



solo jure carniū vixisse  $\alpha$ , quod per arterias & venas sanguinis locum teneret. Memorabile vero est inprimis id resolutionis genus, quod in morbis acutis plerumque, tamen aliam etiam post febrem supervenit; nam in intermittentis febris principio sanguis lentus est, in fine floridior  $\gamma$ . In morbis acutis deterioris generis sanguis in principio sæpe sani simillimus; alias & fluidus est, & coccinei coloris, ut tamen placenta cruoris tenerior sit  $\alpha$ . Alias omnino crustam habet, ut in febre inflammatoria innatantem; aliquando densam; tenuem alias, sub qua nonnunquam sanguis dissolutus & tenuis sit  $b$ . Alias omnino nihil peculiare ostendit.

$\alpha$  Apud Lomerum c. II. p. 71. ed. belg. Hannes in diss. qua fetum per os nutrirī ostendit.

$\gamma$  Tabor p. 274.

$a$  Huxham of fevers T. II. p. 83. of sore throat. p. 31. 39. In principio anginae malignae densus, post aliquoties sectam venam merus nunc ichor est. Moultrie febr. flav.

$b$  Warren of the yellow fever. p. 11. Linings Ess. medic. and philos. T. II. art. 29. Hughes nat. hist. of Barbadoes. pag. 38. Nouv. voyage de Guinée p. 311. Floridus absque sero cogitur, post triduum vero flavus est & naturam coagulabilem exuit. In variolis dissolutus educitur, sic in petechiis Huxhami of sore throat. p. 37. of fevers. p. 52. 53. 58. 59. 62. Schwenke p. 129. Lister

de variol. p. 98. Bianchini lettere pag. 135. In Parisiensi morbo, celeriter ad mortem tendente, sanguis tenuis fuit, ut pulli cruor Memoir. de l'Acad. des sciences 1749. p. 119. In angina maligna similia habet Huxham of sore throat. pag. 52. & in febre nosodochiali jam pro vecta Pringle de morb. castrens. p. 296. Sanguis in malignis amittit mucosum elementorum vinculum Borden du poulx p. 303. In peste sanguis floribus & ruber est. Obs. sur la peste p. 343. In vaccarum lue dissolutus est. Hannæus in libello de ea lue proprio p. 19. Hannöver viehseuche p. 27. Ipse adeps mollis est Ens morb. osterod. p. 81.

Verum paucos intra dies hæc ita mutantur, ut nulla nunc crusta coriacea coeat, & universus sanguis tenuis, niger aut decolor, glutinosa natura destitutus adpareat; demum in peculiari illa maligna infularum Antillarum & regionum tropico subjectarum febre tota corporis universitas, ipse demum adeps, flavo colore suffundatur, & serum sanguinis potissimum flavum sit. Ita variolæ sanguinem disponunt, ut cruor ruber facillime dissolvatur *b\** Inde etiam funestissimæ illæ hæmorrhagiæ fluidi sanguinis, qui in malignis febribus *c* saniosus de auribus, oculis, naribus, ore, utero intestinisque, & de cute vesicantibus emplastris erosa, aut cum sudore *d* erumpit; & in peste *e* de naribus, utero, & de incisa vena, aut scarifata cute fluens vix coerceri potest *f*; idemque in simili putredine, quam serpentum morsus *g* sanguini imprimit, ex auribus, naribus oculisque manat, tum in morte subita ex vapore sentinæ putrido *h*. Etiam hæ hæmorrhagiæ fere funestæ eveniunt *i*, & raro evadunt, quibus in *k* variolis sanguis per urinas exiit, doctissimis anglis testibus. A putredine

*b\** *Sarcone vajuolo*, p. 136.

*c* In Europæis malignis & petechialibus febribus *Huxham of sore throat* p. 60. 61. *of fevers* p. 44. In febre flava *Linings l. c.* *Warren l. c.* *N. voyage de Siam* p. 211.

*d* *Huxham of fevers* p. 44.

*e* *Muralt chir. Schriften* p. 587.

*f* *Timonius in gener. chronol. hist. of seasons* p. 154.

*g* *Piso hist. nat. Ind.* p. 276. de morsu serpentis Ibiracoa.



enim hæc dissolutio est, quæ vires cordis potentissime destruit, ut tenuitas ea sanguinis cum pulsu minimo *k*<sup>\*</sup> fere jungatur, neque vulgo putetur id malum auxilia fere admittere, siquidem corrupto sanguini sua nativa densitas reddi nequeat *l*. Neque tamen hoc triste præsagium adeo fidum est *k*<sup>\*\*</sup>, quin subinde in variolis, petechiis aliisque febribus putridis, post hæc funesta sanguinis dissoluti indicia, homo mortis periculo eripi potuerit, & sanguis priori densitati restitui, cortice peruviano, & acore potissimum minerali adhibito. Cl. *Prosper d'Emportes*, qui in Dominici insula medicinam fecit, ejusmodi hæmorrhagias minime reformidabat, neque infelix Jamaicensis medicus *Williams*.

Cæterum horum omnium testimonia adeo numerosa coram habeo, ut omisisse maluerim, ne lectori tædio sim.

Sed etiam alii in corpore humano humores coagulabilem naturam per morbos amittunt *m*, &

*b* Continuo sanguis de ore, naribus & auribus exiit cum magna putredine *Rutty synopsis*. p. 148.

*i* In peste v. *Murali* l. c. *Labadie de la peste à Toulouse* p. 1620. *Radczinski hist. nat. Pol. I.* p. 367. In febre flava *Linings* l. c. in morbo fere eodem, quem sudorem sanguineum vocat *Helvetius pertes de sang.* p. 87. 88.

*k* *Lister* l. c. *Sydenham*.

*k*<sup>\*</sup> *Mem. de l'Academie des sciences*. 1749. p. 119. *Huxham of sore throat.* pag. 39, 60, 61. *Linings* l. c.

*k*<sup>\*\*</sup> p. 33.

*l* De sanguine *Schwenkè* p. 129. de ichthyocolla putrida *Lister aq. medic. Angl. T.* II. p. 90.

*m* In scorbuto, ut vocat, vaccarum lac non cogitur *Planque bibl. T.* III. p. 22.

ipsum unguen articulorum , & adeps , & lac.

§. X. Cruoris & feri in sanguine portio.

Quæ nuper exposita sunt, non permittunt certam feri ad grumum rationem esse *n* : cum enim tot ex causis feri copia aut crescat, aut diminuatur, cum cruor perpetuo aliquam feri copiam exfudet, quæ ipsi decedit, adeoque feri portio crescat, donec de cruore vix supersit quidquam, non oportet certam utriusve elementi ad alterum rationem sperare. Nihil ergo ab expectatione nostra alieni est, quando clarissimi scriptores alias & alias de utriusque in sanguine partis rubræ, quam diximus, & flavæ, rationes admiserunt. Oportet autem eos audire, quorum major est auctoritas. Qui minimam feri portionem fecit *Hambergerus*, eam æstimavit ad tertiam sanguinis partem, inque homine rationem ejus ad cruorem fecit 109. 212, ut tamen ea ratio paulatim cresceret, & denique serum ad cruorem esset, uti 145 ad 176 o. Tertiam, & paulo ultra, neque tamen penitus dimidiam, recepit *Browne Langrish p.* Rubri sanguinis partes 62. albi 38 reperit *Raymondus Vieussens q.* Æqualem utriusque portionem facit *Robertus Boyle r* & *Carolus Drelincourt s*, &

*n* Conf. *Gaubius pathol.*  
p. 153.

*o* *Physiolog.* p. 6.

*p* *Medical practice* p. 74.

*q* *Des liqueurs* p. 25.

*r* *Apparat.* p. 54. *append.*  
p. 24. Plus utique repererat

cruoris, sed negat inde concludi posse, serum a cruoris copia superari.

*s* *Canicid.* X. exigua nempe diversitas fuit: *Cheyne English malady* p. 120.



*Ad. Frid. Hofman t*, & nuper *Cl. Davies*.  
 Quinque cruori duodecimas, fero septem ad-  
 signat *Johannes Tabor u*. Quinque feri, tres  
 cruoris partes æstimat *Hombergius x*: duas ter-  
 tias feri, cruoris unam *Thomas Schwenke y*.  
 Tres quartas partes feri, unam cruoris admittit  
*Franciscus Quesnai z*, nosterque amicus *Schrei-  
 berus a*, & olim *Frizimelica b*, inque alio expe-  
 rimento *Carolus Drelincourt c*. Sed etiam alibi  
*Robertus Boyle* cruorem feri quadruplum fecit *d*.  
 Quintam partem cruori, reliquam fero tribuit  
*Petrus Senac e*. Septem partes feri, uni-  
 cam cruoris, in destillatione leni & 110 caloris  
 gradu invenit *Thomas Schwenke f*. Septem  
 etiam octavas partes feri, unicam cruoris facit  
*Hermannus Boerhaave g*. Decimam tantum  
 cruoris portionem, admittit *Carolus Augustus a  
 Bergen h*, decimam vel duodecimam *Johannes  
 Bohn i*, duodecimam, sive unciam in libra *Cl.  
 Archiater & Eques Nicolaus Rosen k*. Tanto  
 nempe minorem grumi portionem quisque defi-  
 nivit, quo ferius ad experimentum accessit, &

*t* l. c. p. 17.

*u* p. 62. ad experimentum non optimum.

*x* *Mem. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1712.

*y* p. 92.

*z* *De la saignée.* p. 14. & dimidia minorem in nov. edit. p. 51.

*a* *Almagest.* p. 54.

*b* Apud *Welsch mictomime-  
 mata* ll. n. 98. pro sanguine arterioso, sed intra sex horas,

*c* *Canicid.* l.

*d* l. c. p. 55. de destillato sanguine.

*e* T. ll. p. 83. Addit exper-  
 rimenta accurate capta fuisse.

*f* p. 120.

*g* *Chem. T.* ll. *Process.* 119.

*h* *Hæmatoscop.* p. 10.

*i* *Circul. Anat. phys.* p. 172.

& in *Act. Erud.* Dec. l. ann.  
 l. p. 126. 127.

*k* *Anat. beskrifning.* p. 198.

quo plus feri per moram grumus sudaverat *l*. Multa vero sunt, quæ hanc portionem turbant. Si ex amplo vulnere sanguis saliverit, plus, fere in ratione 3. 2. feri secedet, quam quidem secederet, si vulnus exiguum fuisset: idem etiam majori parte feri liberatum crassamentum solidius erit *l*\*; & sanguis, qui pleno flumine exundaverit, plus feri amittit; minus qui lente secundum brachium labitur *l*\*\*.

Aliæ tamen etiam rationes sunt, quæ faciunt, ut diversam utriusque elementi portionem reperire possis. Plurimum enim hic potest victus, ætas, vitæ ratio, febrilis æstus, languor aquosus hominis.

Quo robustior homo fuerit, & athletico habitui propior, eo major cruoris in sanguine portio est, & concretio celerior, & durior *m*. In animalibus calidioribus, avibus, cane, carnivorisque feris, crassamenti major est portio *n*. Contra in debilibus feri copia augetur *o*, ut duæ tertiæ sanguinis partes aquosæ sint *p*, & denique de sanguine vix nisi serum supersit *q*. Ipsi vidi, & sæpe, in animalibus frigidis, quæ absque cibo languerant, experimento subjectis, vix quidquam rubri in vasis fuisse *r*, ut arteriæ

*l* Pasta ad Roncallum in Europ. Medic. p. 263.

*l*\* Butt 1. c. p. 12.

*l*\*\* p. 13.

*m* Schwenke p. 38. Robinson of food and discharges p. 65.

*n* Shebbeare pract. p. 249.

*o* Idem pag. 279. Schwenke p. 38. 171. 172.

*p* Schwenke p. 174.

*q* Lucas Schroek Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. IX. obs. 211. Quesnai fevr. T. II. p. 433.

*r* Exp. 4. 12. 16. 71. 73. 74. 75. 77. 78. 81. 84. 85. 86. 172. 182. 218. 219. 225. 226. 233. du second mem. sur le mouvement du sang.



inanes viderentur , venæ male plenæ , quod enim inane videretur *s* , id par est creditu , lymphatico humore repleti. Ita etiam in homine pene ex fame pereunte , sanguis valde tenuis & decolor fuit *s*\*. Contra in validis bestiis , & abunde pastis vasa , utriusque generis , uberrimo sanguine replentur *t* , & globulorum tanta in eorum vasa copia circumfertur , ut fero vix locus supersit.

Porro in juniore animale plus est feri , si cum globulis comparaveris *v*. In sex pueris feri rationem ad cruorem reperit *Bryan Robinson* *x* , quæ est 9187 ad 10000. Quo majorem ætatem attingit animal , eo magis globulorum rubrorum ad serum portio crescit. In media ætate globulos facit *Idem* vir Cl. 10000 , serum non supra 7143 *y*. In senio & ista portione major cruoris est copia , ut cruor quidem semper sit ut 10000 , serum nunc ut 6908 *z*. Ita fit , ut in ætate ineunte , & adulta , & vergente , feri ad 10000 partes cruoris partes sint 9187. 7143 , & 6908. Senibus copiosissimus cruor *Thomas Schwenke* *a*. Idem crassamentum sanguinis in adultis densius est. *a*\*

Calor æstivus sanguinem in Carolina meri-

*s* Conf. p. 24. 25. 189 ejus *de cerebro & nerv.* p. 134. *second memoire.* ed. 8.

*s*\* *Kirkland of gangrens.* *x* *Essays* p. 425.

p. 78. *y* p. 426.

*t* Passim ut *Exp.* II. & p. *z* p. 425.

23. 24. *a* p. 92.

*v* *Schwenke* pag. 92. *Willis* *a*\* *Robinson Essays on anim.* *æcon.* T. II. p. 425.

dionali ita diffolvit, ut exigua de grumo portio supersit *a\*\**. Contra in morbis, quo quisque fuerit acutior, eo minor in sanguine feri portio supereft *b*. Periculum a celeri morbo abesse persuadetur *Georgius Cheyne c*, quamdiu feri dimidia, aut quarta demum in sanguine portio est. In febre intermittente serum non supra tertiam quartamve totius sanguinis partem efficit *d*, quartamque *e* in acuta febre, & quintam *f*, & sextam denique *g*.

Alterius generis *Guilielmi Harveii h* experimentum est, qui sanguinem de animale continuo a pastu emissum saniosum reperit serove plenum, post jejunium vero, aut urinam uberius redditam, aut multum sudorem, eundem sanguinem in grumum densatum invenit. Id ita intelligo, ut sanguinem eo tempore inspicias, quo chylus in lympham abiit, duodecima z fere post cibum sumtum hora.

## §. XI. *Partes sive Elementa cruoris. Globuli*

Ad subtiliores sensim particulas indagandas

*a\*\** *Chalmers diseases*. P. I. quam in quartanis. *Idem* *ibid.*  
p. 114.

*b* *English malady* pag. 120. *e* Drachmas 16 gr. 22. ex  
B. *Langrish* l. c. pag. 74. drachmis 22. gr. 16. *Browne*  
*Langrish*.

*Schwenke* p. 56. 57. 93. *Quess-*  
*nai des fevr. cont.* T. II. n. 43. *f* *Idem* octo drachmas grana  
16. ex drachmis 49. p. 68. seqq.

*c* *Diseases of body and mind.*  
c. 4. p. III. *g* *Idem* drachmas 16. grana  
15. ex drachmis 97. granis 16.  
p. 69.

*d* *Browne Langrish modern.*  
*practice* p. 232. Cruor magis  
viscidus in quotidianis quam  
in tertianis, in istis tenacior est, *h* *De generatione anim.* pag.  
161.

*i* *Lomer* p. 239 & *belg.*



descendimus , quæ in cruore animalium reperiuntur. Initium faciemus in iis elementis , quæ sponte sua , absque ignis tortura , in vitali humore adparent , quamprimum industria aliqua , & vitrorum convexorum potestas diametros auctura accessit : inde ad eas mutationes transaturi , quas salium vis , admistiquæ alii succi sanguini inducant , aut ignis violentia.

Quoties lente vitrea , non valde quidem obsectorum diametros augente , in frigidis animalibus & in pullo , qui ovo continetur , calido animale *k* , sanguinem sua per vasa meantem contemplamur , toties utique rubras in universum & rotundas particulas videmus , quæ per liquorem , ne microscopii quidem auxilio conspicuum , feruntur. Eum enim tenuem liquorem continuatus motus demonstrat , quando uno globulo ex quiete in motum acto , alius longe distans globulus , & demum plures globuli in motum revocantur , quæ continuïtas communicati motus locum habere non posset , nisi primus globulus cum secundo per invisibilem liquorem conjungeretur. Mecum sentit Cl. *Spallanzani*.

Hos globulos in propriis oculis meis sæpe vidi , quando ciliis lumen candelæ excludebam. Tunc enim in opposito linteo , vel in charta , & cylindrica vasa & globuli per ea vasa celeriter

---

*k* *Philos. Transact.* n. 102. 129. *Antonius de Heyde obs.* 106. *Birch l. c. T. III.* p. 379. 86.  
*Brunner de pancreate* p. 128.

moti nudo oculo conspiciuntur. Eosdem etiam globulos vidi, cum per exiguum foramen inspicere. Hæc experimenta fuscæ & ornate Cl. *Meisterus* descripsit.

Sed sanguinem de vase eximere, aqua diluere, inter duas talci laminas recipere non placet: his enim artificiis nativa figura globulorum mutari potest.

Inventionis laudem ad *Marcellum Malpighium* refero, ut tamen ipse vir Ill. non penitus perviderit, quæ ipsi natura obtulerat, atque adipis glebularum se vidisse persuasus fuerit, quando verissimos sanguinis globulos viderat. *Sanguineum nempe vas in omento hystricis* citat, in quo globuli pinguedinis propria figura terminati rubescerent, & coralliorum rubrorum vulgo coronam emulantes visi sint. Hæc jam anno 1665 scripsit l. Serius, & aliquot equidem annis serius, civis etiam Delphensis *Antonius van Leeuwenhoeck* globulos in sanguine rubros vidit, die 15 augusti anni 1673 m. Cum tamen *Idem* hoc in argumento diligentissime versatus sit, novæque in sanguine particulas multa per animalium genera persectus laboriose descripserit, suam certe lauream, neque indecoram meretur.

## §. XII. Omnino vera, sui generis sanguinis sunt elementa.

In horum globulorum historia oportet solli-

l De omento & adiposissimis ductibus, Editionem Londinensem cito p. 42.

m Ipse diem indicat *Philosoph. Transact.* n. 102.



citis & lentis passibus progredi. Cum enim nuper plures insignes viri in cruoris globulis microscopio contemplandis versati fuerint *J. Maria a Turre*, *F. Fontana*, *Guil. Hewson*, *Lazarus Spalanzanus* & alii, mirum est, quam diversa sint, quæ quisque horum clar. virorum vidisse se putat, ut neque inter se eos conciliari possim, neque cum meis numerosissimis certe contemplationibus. Commune noviter reperiatarum rerum, neque injustum fatum est, ut serius aliquanto fidem impetrent. Præstiterit enim aliquantum in dubitatoris partes declinasse, quam novas, neque fatis firmas undique opiniones, absque judicio aut examine recipere. Ergo alii quidem globulos rubros erronea ab observatione natos esse scripserunt, neque dari in nostro sanguine moleculas, quibus rotunditas perpetua sit; huc *Nicolaus Hart-sloeker* *n* pertinet, alioquin in *Leeuwenhoeckium* iniquior, & difficilis nova recipere *Elias Camerarius* *o*. Sed etiam nuper vir elegantissime doctus *J. Zacharias Platner* *p* sphaericas has moleculas rejecit, & sanguinem non globulosum, & ramosum potius sibi adparere scripsit *Archibaldus Adams* *q*. Verum etiam ita nollem globulos rubros intelligi, uti pleraque fluida componi, aut vulgo scribitur, aut ab insigni

---

*n* *Extrait critique* p. 5. A core aliquo & aere compositas liquoribus heterogeneis inmixtis explicat. dicit.  
*p* *De suppurat. cohib.* n. 4.  
*o* *Specim. medicin. elect.* *q* *Philos. Transact.* n. 35.  
 Diff. IV. p. 48. Bullas ex vis-

experimentorum auctore *Petro v. Muschenbroeck* *r*, aut ab *Ill. Gaubio* *s* intellectum est. Ex theoria enim sola, & absque sensuum fide, globosa elementa liquoribus tribuuntur, ut elementorum facillima discessio explicetur. Sic neque oleum, aut hydrargyrus, aut fumus carbonum, eo modo, quo sanguinis moleculæ, globulis constat. Nam in argento quidem vivo molecularum figura incerta est: adtractione vero in globulos majores, acervosque particularum figurantur. In oleo cum aqua subactō *t*, inque emulsionem abeunte, ejusdem generis globuli nascuntur, adipis ab aqua circumscriptæ massulæ, quibus neque magnitudo constans est, neque color ruber, neque ferri elementum. In sanguineis globulis omnia alia sunt. Solidi, perpetui, circumscripti, certa magnitudine & figura, certa ferri portione prægnantes, in fluido invisibili moventur, & adtractione mutua non egent, ut in globulos figurentur.

Neque adeo in sanguine, perinde ut in aliis liquoribus animalium, communi lege factos globulos reperio, ut etiam in bile *v*, sudore *x*,

*r* *Essais de physique*, p. 367.

*s* *Patholog.* p. 161.

*t* Eo lactis globulus refero, *Leeuwenhoeckio* dictos, pellucidos, variæ magnitudinis inde in *Phil. Transact.* n. 102. *Birch* T. III. p. 380. *P. Senac* T. II. p. 657. *Boerhaave Prax. Med.* T. I. p. 211. & *Petr. Ernest.* v. *Asche de natur. spermatis* n. 59. &c. tum chylosos illos & illi *Ill. viro* dictos.

& *Aschio obs.* 51. 52. Globulos adipis etiam *Delphenis* observationum auctor habet *Phil. Trans.* n. 106. compres-  
sos, exiguosque, & in pure *Ill. Senac* p. 659. Cum aceto subactum oleum globulis comparat *Cheyne philos. princip.*

*v* *Asche obs.* 60. 61. Minimos addit esse.

*x* *Leeuwenhoeck* l. modo cit.



saliva *y*, lacruma *z*, urina *a*, etiam putrida *b*,  
 liquore prostatico *c*, pancreatico succo *d*, am-  
 nii humore *e*, femine demum *f* similes globuli  
 sint, aut in nervis *g*, medullave spinali *h*  
 aliisque rebus *i* reperiantur, a bullis forte aeris,  
 aliisque peregrinis particulis natæ, quæ olim  
*Leeuwenhoeckii*, nuper vero Cl. *Petri v. Asche*  
*k* voces sunt. In nullo enim alio liquore  
 ejusmodi globulos, copiosos, certos, constantes  
 hætenus vidi, quos in ranis, bufonibus, pisci-  
 bus *l* variis, in lacertis, squillis, cancris, ara-  
 neis, libellis *m*, cochleis *n*, aut *Leeuwenhoeckius*,  
 aut alii idonei testes viderint. In chylo & lacte  
 globuli etiam sunt, adfinis cum sangui-  
 neis naturæ.

### §. XIII. *Figura globulorum.*

Nomen sphærulas indicat, & vulgo pro  
 sphærulis habentur, sphærulasque in calidis  
 animalibus depinxit *Antonius v. Leeuwenhoeck o.*

*y* Ibidem perpaucos. *Asche*  
 ff. 62 - 68.

*z* Ibid. pariter paucos.

*a* *Leeuwenhoeck Anat. & con-*  
*templat.* p. 40. *Exper. & con-*  
*templ.* cp. 56. *Asche obs.* 69.

*b* *Asche obs.* 76.

*c* *Idem obs.* 49.

*d* *Idem obs.* 50.

*e* *Idem obs.* 53. etiam in  
 putrido femine.

*f* p. 102. &c.

*g* *Leeuwenhoeck Philos. Tran-*  
*sact.* n. 108.

*h* Ibidem n. 136.

*i* n. 17.

*k* Materiem per se cohæren-  
 tem sponte in globulos for-  
 matam esse p. 103.

*l* *Second memoire.* c. 1. tot.

*m* *Leeuwenhoeck exper. &*  
*contemplat.* p. 280.

*n* *Lister de cochl.* p. 95.

*o* Innumeris locis, qui con-  
 tinuo citabuntur.

Ipse tamen belgicus inventor in frigidis *p* animalibus, inque avibus *q*, hactenus ab ea figura recessit, ut glebularum sanguinis tres inæquales diametros faceret, quarum gratia *particulas plano-convexas* vocarentur: sectiones nempe elliptici corporis figuris suis exprimit *r*, quæ crassitiem pene nullam, longitudinem latitudine aliquanto majorem haberent. Nuper etiam clarissimi viri, in Anglia *s* & in Gallia *t*, figuram harum molecularum lenticularem faciunt, quæ & ipsa denominatio inæquales diametros, & crassitiem longitudine minorem exprimit.

Ego quidem & in frigidis bestiolis, & in calidis, has particulas contemplatus sum, & quidem plus ducenties: eas vero semper rotundas reperi, ut nunquam latitudine minorem longitudinem viderim *v*: crassitiem vero, quatenus per microscopia de crassitie judicatur, semper insignem repperim *x*, cum intensior in medio color sit, oræ vero sensim expallescant, quod idem & Cl. *Meisterus* vidit, & *Hewsonus*. Deinde, cum globulos vario in situ, per minimas inprimis venulas

*p* *Epist. prior.* quas sub nomine *anatomiae* & *contemplationum* latine versas ediderunt, n. 38. p. 54. & in altera enumeratione p. 51. in *experim.* & *contemplat.* *Epist.* 60. p. 78. in *continuat. arcanor. natur.* pag. 218. Consentit *Wyerus Guilielmus Muys de fibr. musc. fabric.* p. 300. *Mistichelli de apoplex.* p. 42.

*q* *Leeuwenhoeck* iisdem fere

locis, ut *Ep.* 60. p. 78, *Muys* 1. c.

*r* v. c. *epist.* 38. p. 54.

*s* *Henricus Mihles Phil. Transf.* n. 460.

*t* Ill. *Senac.* in *essais de physique* T. II. p. 360. ed. 1753. & *traité du cœur* T. II. p. 556.

*u* *Second memoire Exp.* 2. 3. 5. 19.

*x* *Ibid.* *Exp.* 2. 11. 17. 19.



moveri cernerem, nunquam aciem globulorum vidi, ut quidem me vidisse oportuerat, si omnino planam latitudinem haberent, tenuemque aciem. Sed etiam solare microscopium, quo enormiter rerum visibilium imagines augentur, sphaerulas, pisces non minores, ostendit *y*: Quare mihi quidem nondum causae est satis, quo minus pro veris sphaerulis habeam, aut certe ejusmodi rotundis moleculis, quarum crassities reliquis duabus diametris nullo discrimine cedat, quod oculis percipiatur. Cl. demum viri & quibus plurimum tribuo, *Lazarus Spalanzanus* & *Felix Fontana*, & Cl. *Meisterus* pariter sphaericas viderunt, & *Cas. Pozzi*. Sed etiam in *Leeuwenhoeckii* verbis videor mihi contradictionem percipere. In cancris nempe, & squillis *z* & araneis *a*, frigidae utique classis animalculis, globulos constanter vocat, qui ex minoribus globulis componantur *b*: modum etiam icone exprimit, quo coalescant *c*. Verum ejusmodi compactio solidam, non planam, utique moleculam efficit. Pallentes forte *d*, & ad centrum parum saturatius tinctas, piscium moleculas vidit, quas ob eam ipsam causam non crederet crassitiem habere. Angulosos globulos *e*, aut caudatos *f* partim observationis vitio tribuerim,

*y* Ibid. Exp. I.

*z* *Experim. & contempl.* p. 128. f. 5. 6.

189.

*a* *Contin. arcan. natur.* pag.

316

*b* *Exper. & contempl.* p. 451.

*c* *Exper. & contempl.* p. 2.

*Continuat. arcan. natur. epist.*

*d* *Exp. nostr.* 4.

*e* *Fränkische anmerkungen.*  
T. I. p. 22.

*f* *Mihles* 1. c.

partim globulorum deformationi. Nam & ipse effusos in oblongam & vermiculi similem speciem degenerasse vidi g.

Cl. vero vir *J. Maria a Turre*, microscopiis insignissime argentibus usus, vulgaribus quidem vitris pariter ut nos sphaericos vidit, acrioribus vero & diametrum 256es & demum 1960es argentibus, omnia alia reperit.

Esse nempe sacculos membranofos, quos globulos vocant, complanatos, lymphâ plenos, qui ipsi fiant ex tribus ad sex usque particulis oblongis: quæ particulae & ipsae vesiculae sint, quae in majorem annularem sacculum abeunt, & vicissim discedunt & separantur. Integra vero vesicula, quam globulum vocant, plana est & ovata.

Quae causa sit hujus a nobis, & fere ab omnibus aliis incisforibus dissensus, nondum intelligo, nisi illa ipsa nimis acris vis microscopii mutatis umbris Cl. viro fraudi fuit, qui interim, dum mediocribus usus est vitris, similia vidit nostrorum.

Inde *Guilielmus Hewson* simplices quidem particulas dixit, tamen ut planae sint, & vesiculae liquore plenae. Memorabile vero est, quod in aqua sphaericam figuram recuperare fateatur.

Nunc globuli sanguinei perpetuo in aqua natant, parum ab aqua vulgari diversa, & is status iis naturalis est, quem Cl. viro teste in aqua induunt.

In



In nonnullis etiam animalibus sphaericos vidit & eandem crassitiem in medio sphaerae, perinde ut nos. Ut omnino de solis conclusionibus, non vero de re visa inter nos discrimen esse putem.

Legi & cum ea fide, quam Claris viris debemus. Neque tamen possum de mea sententia discedere, qui numerosissima ejusdem semper eventus experimenta fecerim, & consentientes viros peritissimos habeam *Fontanam, Spalanzannum, Casareum Pozzi*.

#### §. XIV. *Magnitudo.*

Magnitudinem his moleculis constantem tribuit *Antonius v. Leeuwenhoeck*, neque ego diversitatis memini, quam observaverim, paucis equidem animalium generibus usus, iisque fere frigidis. Verum idem clarus Belga eandem omnino globulorum rubrorum in omnium, etiam corporis sui mole diversissimorum, animalium sanguine reperit, ut bovis in cruore non grandiores, quam in rana sint, & eadem in cuniculo, ove, homine, bove, earum sphaerularum magnitudo redeat, neque quidquam in cete differat, minimove pisciculo *h*. Ita *Cl. Muysius* in sanguine galli indici, gallinacei, passeris, aselli, porcelli, hominis, bovis, ovis, talpae, murisve aequae grandes globulos vidit. In homine & simia aequales esse *Fran-*

---

*h* Continuat. arcanor. natur. tamen etiam ovata corpuscula  
p. 220. *Phil. Transf.* n. 293. alia aliorum dupla p. 300.  
*i* p. 298. 299. 300. Habet

*ciscus Boissier k.* Sunt tamen etiam , qui dissentiant. Nam in piscibus , quam in calidis animalibus majores facit *Johannes Tabor l* , & in lacerta humanis majores , etiam duplo *Cowperus a* , quem hactenus fecutus est *Henricus Baker* , *b* ut certe majores faceret. Vir clarissimus *Vincentius Menghinus c* non eandem in variis animalibus globulorum sanguineorum magnitudinem esse , gravis testis adfirmat. Cl. *Spalanzanus* in salamandra duorum generum globulos facit , oblongos alios , minores alios & sphaericos , cæterum in omni animale æquales. Cl. *Hewson* aliam aliamque in diversis animalibus molem facit , minorem in cete quam in piscibus frigidis , in raja skate maximam , in pullo majorem quam in gallina.

Mihi ad hæc discutienda experimenta accurata non suppetunt , neque videntur , si absque dubio rem definire oporteret , quæ hactenus , absque micrometro a me capta sunt , penitus sufficere , nihil tamen vidi , quod suadeat , inaequali esse magnitudine.

Non magis in ratione consentitur , quam globuli rubri , etiam cujusunque animalis , diameter ad pollicem habeat. Noningentesimæ parti pollicis æqualem diametrum Cl. *a Turre* facit. Mille milliones ejusmodi globulorum non majores esse arenula , phrasis est *Leeuwenhoeckii d* ,

*k* *Memoire sur la maladie des bœufs.* p. 17.

*l* *Exerc.* p. 58.

*a* *Philos. Transact.* n. 280.

*b* *The microscope made easy* p. 126. Decies majores in rino aquatico *Hoglonse* p. 352.

*c* *Comm. Bonon.* T. II. P. II.

p. 258.

*d* *Exper. & contempl.* pag.

162. Tanto minores uncia facit

*Boerhaave de viribus medic.*

p. 35.



qui alibi globulum uni  $\frac{1}{25000}$  arenulæ æqualem fecit *e*, ejusmodi autem arenulam diametrum habere scribit  $\frac{1}{24}$  pollicis æqualem vir olim eximius *Wierus Guilielmus Muys f.* Propius ad eandem diametrum definiendam accessit *Jacobus Jurin g*, qui diametrum bis millesimæ pollicis parti æqualem tribuit, deinde *h* paulo accuratius  $\frac{1}{1940}$  pollicis, quæ mensura ipsi *Leeuwenhoeckio* placuit. Proxima Ill. viri *J. Theodori Elleri i* mensura est, qui cum  $\frac{1}{1960}$  pollicis comparavit. Minorem fecit *Stephanus Hales k*, neque majorem diametrum dedit, quam  $\frac{1}{3240}$  pollicis. Ad  $\frac{1}{2189}$  digiti geometrici diametrum olim æstimabat *J. Fridericus Schreiber l*, ad  $\frac{1}{3600}$  *Johannes Tabor m*, quæ mensura neque *Petro Senac n* displicuit, neque *Thomae Morgan o*, neque amplissimo *Gesnero p* nostro. Denique vir olim in experiendo celeberrimus *Johannes Theophilus Desaguliers* tantillam rubro globulo diametrum fecit, ut esset  $\frac{1}{79200}$  pars *q* uncix. Ego quidem cum minorum corpusculorum mensuris non fatis habeo consuetudinis, ut

---

|  |  |
|--|--|
| <i>e Phil. Transf. n. 106.</i>           | <i>l Elem. phys. math. p. 309.</i>     |
| <i>f l. c. p. 333.</i>                   | <i>m p. 59. experimento non</i>        |
| <i>g De aq. fluent. mot. inter</i>       | <i>valde subtili usus.</i>             |
| <i>diff. p. 46.</i>                      | <i>n Traité du cœur, T. II.</i>        |
| <i>h Phil. Transact. n. 377.</i>         | <i>p. 655.</i>                         |
| <i>art. 7. ex eadem mensura fili</i>     | <i>o Philos. principl. pag. 187.</i>   |
| <i>argentei.</i>                         | <i>Addit, sibi ea mensura mino-</i>    |
| <i>i Memoire de l'Acad. des</i>          | <i>res videri.</i>                     |
| <i>sciences de Berlin. T. VII.</i>       | <i>p De natur. fluidor.</i>            |
| <i>k p. 16. ex Jurini, ut lego,</i>      | <i>q Course of experimental</i>        |
| <i>priori experimento in Phil.</i>       | <i>philosophy T. I. p. 29. ad cal-</i> |
| <i>Transf. n. 255. relato, qui liber</i> | <i>culos equidem Le euvenhoe-</i>      |
| <i>ad manus non est.</i>                 | <i>ckianos.</i>                        |

inter magnorum virorum opiniones iudex federe sustineam. Comparavi tamen, ad microscopium solare, globulum sanguineum cum plumula de alâ papilionis sumpta. In alio experimento lens augebat corporum diametrum, ut 250<sup>es</sup> se ipsa major videretur, & tamen globuli diameter non videbatur vigesimam partem pollicis excedere. Id experimentum, quod minime velim supra merita laudare, diametrum globuli faceret ejusmodi, ut ad pollicem in eadem ratione se habeat, quæ est 5000 ad 1.

#### §. XV. Color.

Etsi hæ sphaerulæ in universum rubræ sunt, obque eas solas sanguis reliquus rubet, non tamen constanter idem iis color est. In animale sano, valido, beneque saturo, etiam singulæ sature purpureæ sunt *r*. In aliis animalibus, malignius pastis, & debilibus, pallent eadem, inque luteum colorem degenerant. Neque hæc in colore globulorum varietas independet, quod palleant solitarii, congesti vero aucto colore rubescant *t*, ut plusculis Cl. viris

*r* Second memoir &c. exp. 5. 8. II.

*s* Second memoir exp. 4. II. 16. & p. 188.

*t* Inde ruborem pendere, & acervatos rubere, singulos neutiquam A. v. Leeuwenhœock *Phil. Trans.* n. 106. *Anat. & contempl.* p. 54. *Experim. &*

*contemp.* p. 205. *Epistol. physiol.* T. IV. p. 336. *Lancisi* p. 21. *Verduc tr. de l'usage des part.* T. I. p. 209. *IV. Guil. Muys l. c.* p. 300. *F. Quesnai Oeconom. anim.* T. III. p. 36. *Dom. Mistichelli de apoplexia.* p. 42, &c.



visum est , ut rari flavi visi sint Cl. *a Turre & Reichelio*. Etsi enim color a congestione corpusculorum utique intenditur *v* , certum tamen est, etiam solitariis  $\times$  globulis, in sano animale, innatam purpuram insidere, ut mecum vidit Ill. *Felix Fontana, & Spalanzanus*, neque eos, seorsim inspectos & sigillatim, aut pellucere, aut rubrum colorem deponere, uti quidem passim scribitur; etsi id quidem verum est, ubi in vase capillari pauci sunt, nudum oculum in eo vasculo colorem rubrum non percipere. Oblique illapsa lux argentei quid his globulis adspergit *y*, quale & alia in corpuscula fluida jubar projicitur, neque iis corporibus proprium inhaeret, verus tamen rubor inest. Contra in venis etiam majoribus *z*, numerosi in debili animali & congesti globuli flavum colorem conservant. In eadem etiam vena, non satis nota ex causa, alterum globulorum torrentem flavum, alterum saturate purpureum fuisse, alias monui *a*. Non decet dissimulasse, Cl. *Spalanzanum*, cui merito plurimum tribuo, flavum quidem globulorum colorem vidisse, sed ad refractam lucem rejecisse. Verum mihi quidem, si ulla oculo fides haberi potest, de flavedine globulorum certissime constat. Vide quæ dixi *a\**.

*v Senac T. II. p. 662. Malpigh. posthum. p. 123. Lancis l. c. p. 21.*

*x Exp. 3. 5. 8. II. 12. 119. Subrubellos esse fränk. anmerk. l. c.*

*y Exp. 14. 15. Etiam hoc phænomenon vidit Ill. Archiatrorum Comes l. c.*

*z Prem. mem. p. 17.*

*a Exp. 13.*

*a\* p. 23.*

§. XVI. *Copia.*

Variam horum globulorum rubrorum in pel-  
lucente humore copiam esse posse, satis intel-  
ligitur. Inanes, aut quas oculus inanes repe-  
rit, arteriæ venæque, utique invisibilem liquo-  
rem continent, in quo aut paucae rubrorum  
globulorum lineæ *b*, aut omnino ne eæ quidem  
lineæ *c* continentur; nempe his in exemplis  
ratio globulorum ad lumen sui vasis, adque  
diaphanum elementum, in quo moventur,  
exigua est. Id phænomenon in captivis anguillis  
*Leeuwenhoeckius* viderat *d*. Contra, quo quodvis  
animal robustius fuerit, eo major vis globulo-  
rum est, ut in ranis bene pastis, bufonibusque  
vix spatium videas, quod rubro globulo non  
repleatur. Consentiant ea Cl. Britannorum  
theoriæ, qui plethoræ naturam non in universi  
sanguinis, sed in rubrorum globulorum abun-  
dantia *e* posuerunt. Non vero unquam vasa  
animalis vivi vere inania esse, facile dederim,  
& pelluciditatem liquoris, quo permeantur, eum  
inconspicuum reddere. Nam in ejusmodi va-  
sis, quæ vacua videntur, solitarii & longe a se  
invicem remoti globuli tamen celeriter moven-  
tur, & novas a corde acceptas succussiones sen-  
tiunt, quod quidem fieri non posset, nisi cordis

---

*b* Exp. 81. 85.

*c* Exp. 71. 73. 74. 75. 78.  
81. 84. 86. 172. 182. 218. 219.  
225. 226. 233. &c.

*d* Contin. grecan. natur. pag.

358.

*e* *Georgius Martine Essays*  
*of a Society at Edimb. T. II.*  
*p. 83. Bryan Robinson of food*  
*and discharges p. 65.*



impetum liquor aliquis ad anteriorem globulum perferret.

Pauciores equidem in frigidis animalibus, quam in calidis globulos esse, si cum fero comparaveris, jam *Leeuwenhoeckius* auctor fuit, eamque ipsam rationem dedit *Thomas Schwencke f*, cur frigidus animalium unico corde præditorum sanguis flavescat. Paucos etiam in cochleis cruoris globulos esse, feri plurimum, *Listerus g* reliquit, & accuratior *Vincentius Menghinus h*, pauciores in anguilla quam in rana, in rana rariores quam in homine globulos reperit, raros etiam in piscibus, avibusque. Verum hæc ego omnia ad languentium animalium nimis frequentes incisiones refero, satis certus, in robusto bufone, ranaque bene pasta, & rubicundissimum sanguinem esse, nullo gradu, quam in homine pallidiorem, & in arteriis & venis microscopio oppositis tantum globulorum numerum moveri, ut pluribus non sit locus. Sic in pullo qui ovo continetur.

§. XVII. *Mollities. Elater. Figura num mutabilis.*

Difficile est experimentis de his globulorum rubrorum dotibus definire, adeoque & in definiendo magnam scribentis modestiam esse oportet, & dubitantis facilem excusationem. Cum tota placenta sanguinea cum elatere mollis sit,

---

*f* p. 119 Idem cruoris in terrestribus animalibus rationem tanto majorem facit, ut aquatili-  
*g* *De cochleis.* p. 45.  
*h* l. c. p. 258.

cumque pinguedinem in globulis nostris suo loco  
simus demonstraturi, non repugnem, globulos  
de plastica gelatinæ natura esse *i*, ut tamen  
aliquanto figuræ suæ tenaciores esse videantur,  
quos nunquam, tot in experimentis, aut adpul-  
sos ad parietes vasorum fuorum comprimi figu-  
ramque mutare, aut resumere laxatos viderim,  
aut demum in angustiis vasorum minorum mu-  
tatis diametris in ellipticam figuram transiisse,  
cujus longior axis longitudinem sui vasis seque-  
retur, angustior diametrum canalisi sui metire-  
tur. Minime ignoro, quam multi, quamque  
clari in experiendo viri & mutare figuram vide-  
rint, & resumere sibi commissos, ipsum nempe  
principem *Antonium v. Leeuwenhoeck k*, deinde  
*Guilielmum Comper l*, & inter eos, qui cum  
vitris convexis consueverunt, *Fridericum Wilhel-*  
*mun Horch m*, *Henricum Baker n*, & *H. Mihles o*,  
& *J. M. a Turre*, ut alios graves *p* auctores, &  
*Gerardum v. Sovieten q* omittam, qui in lacertæ  
pulmone *r* rem optime adparere addidit; porro

*i* Elasticos vocat *Franciscus*  
*Quesnai æconom. anim. T.*  
*III. p. 41. & G. Martine*  
*Edimb. essays l. c. & alii: &*  
*credit Cl. Schwenke*, posse  
adunatos, innatoque elatere  
resilientes, ferum interjec-  
tum excludere *p. 110. Compac-*  
*tiles & figurabiles vocat Gau-*  
*blius vir clarissimus l. c. p. 162.*  
*k Exper. & contemplat. p. 61.*  
*l Phil. Transact. n. 280. ap-*  
*pend. ad Bidl. Tom. III. f. 4.*  
*m Miscell. Berolin. T. VI.*

*p. 115.*

*n Microscope made easy p.*  
*136.*

*o Phil. Transf. n. 460.*

*p James Keil of muscular*  
*motion p. 163. P. Senac T.*  
*II. p. 657. J. Frid. Schreiber*  
*almagest. p. 232. Francis. Boiss-*  
*sier de Sauvages Mem. de Ber-*  
*lin 1755. p. 44. Douglas on heat*  
*p. 136.*

*q Comment. T. I. p. 195.*

*r l. c. An ex Compero, qui*  
*idem animal citat?*



*Cl. Reichelium*, & *L. Spalanzanum* unico fere in exemplo, & *Felicem Fontanam*. Cupidum certe pulchri phænomeni, non voluntas, neque in iterando experimento pertinacia destituit, sed natura utique noluit, quem avidus acceperem, eventum industriæ meae dare. In numerosissimis animalculis minoribus globulos solitarios per minimas venulas ferri vidi *s*, perque frequentes earum venarum anfractus iter sibi aperire. Vidi, quantum ad suadendam eam opinionem fatis est: sed id utique non vidi, quod sufficiat ad convincendum hominem unice verit studiosum; micatio enim aliqua adfuit *t*, alteriusque subinde facieculæ lucidæ modo, & modo obscuræ, in globulo alterna apparitio. Ipsam figuræ mutationem nunquam certo vidi *v*, neque probabilis ea mihi visa est consideranti, quanta velocitate *x* per minima vascula hi globuli ferantur, quos æquum erat lente reptare, si suo circulo maximo incuneati vasculi parietes dilatarent, lumenque sibi cum propriæ figuræ mutatione pararent. Sed neque *G. Hevuson* figuram mutari vidit, neque *Caldanus*: Neque oleosum illud striarumque aemulum coaguli genus *y* huc trahi debet, quod sæpe utique vidi: globuli enim, qui eam faciem induerunt,

---

*s* *Memoire sur le mouvement du sang.* Exp. 64. 119. 120. 121. 124. 125. 126. 127. 128. 132. 138. 143. 144.  
*t* *Exp.* 14. 15.  
*u* *Exp.* 8. 14. & p. 20. Negat etiam *Cl. Krugerus*, & experimentum *Leeuwenhoeckii* rejicit de refrigerat. sang. in pulm. p. 16.  
*x* *Exp.* 119. 121. 124. 125. 126. 127. 128. 132. 138. 139. 143. 144.  
*y* *Exp.* 18. 20.

figuram suam non mutarunt , cum paulo post , incisa vena , novoque reddito sanguini motu , priorem in sphaerularum naturam redeant z. Vidi etiam , sed rarius in polygonum quasi rete abiisse a. Denique Cl. *Meisterus* globulos in proprio oculo saepissime repetito experimento cum conspexisset , neque figuram variabilem reperit , neque magnitudinem.

§. XVIII. *An aere elastico repleantur.*

Communis haec opinio fuit , ut globuli sanguinei pro bullis haberentur , ex aere elastico factis , quem cruoris lamina includeret. Eo tota secta Iatromathematica inclinavit , ab ipso retro Praeceptore nostro *Johanne Bernoullio* b , & *Jacobo Keilio* c , neque defuerunt etiam inter alios d physiologiae scriptores , qui eandem opinionem reciperent , & nuper Cl. *Stevenson* e tumorem venarum in pedibus in calidam demersis ad sanguinis rarefactionem maluit referre , quam ad vasorum laxationem. Ita etiam J. F. *Schreiber* f , non ejusdem caeterum sententiae

z Exp. 18.

a Exp. 5. Bonannus microgr. p. 92. ic. 116. Senac tr. du cœur. T. II. p. 658.

b In l. de muscutorum motu edit. Michelottianæ n. 5. p. 6.

c De secret. anim. & de motu muscul. p. 100. Deinde Jeremias Wainewright of air p. 65.

Georgius Cheyne Philos. princip. p. 304. Thomas Knigh of heat p. 41. Georgius Erhardus Hamberger physiol. p. 16. 17.

d Joh. Bohn circul. anat. physiol. p. 179.

e Essays of a Society at Edinburg. T. V. P. II. p. 866. seqq.

f Exp. 3. 9. 17. 198, 214.



auctor tamen in arteriis pulmonis globulos elasticam naturam induere docuit.

Multis vero modis hujus hypotheosos infirmitas evincitur. Nam ipse oculus, hos globulos absque præjudicata opinione speculatus, non bullas videt, intus pellucido, aut invisibili quocunque fluido plenas, sed crassas massulas, in media convexitate opacissimas, quas oportet, ex hypothesi, in centro pellucidissimas esse, quod plurimus ibi aer, & coloratæ laminæ longius a se invicem remotæ essent. Facile autem bullas pellucas in iisdem ranis distinximus *g*, multo quam globuli rubri majores, quas etiam *L. Spalanzanus* vidit. Sed neque quisquam vidit aut collisos in resistentes arteriolas globulos, aut in alios globulos impulsos, comprimi, inque minus spatium redire, & exstat *Antonii v. Leeuwenhoeck* confessio, nunquam ejusmodi quidquam se vidisse *h*.

Deinde, cum aer utique in frigore densetur, & laxetur in calore, dudum observatum est, rubrum cruorem omnino ne in summo quidem frigore in minus spatium redigi, ex *Samuelis Aurivillii i*, clarissimi nunc Upsaliensium professoris, testimonio, & ipsius demum *Ill. viri Francisci Boissier k* consensu. Sed etiam *G. E. Hamberger* fassus est, ne a columna quidem 36 digitorum argenti vivi cruorem in angustius

*g* *Almagest*. p. 344.

*h* *Contin. arcan. natur.* pag.

III.

*i* In diff. de vasor. pulmonalium & cavitatum cordis inæ-

quali amplitudine n. 26.

*k* *Frigus glaciale sanguinem in minus spatium non comprimit des effets de l'air p. 48. elem. physiol.* p. 138.

spatium conprimi *l*. Porro cum ex professo in hanc litem inquireret Clariss. olim *Jacobus Jurin m*, facile vidit sanguinem aerem aliqua memorabili portione continere non posse, ne ea quidem, qua in aqua continetur, cum ruber globulus, totusque cruor, aquæ pondus internum superet, longe levior futurus, si aerem lamina unica colorata obvolutum contineret.

Iterum, cum aer aut in majori calore se expandat, aut in vacuo spatio, neutro modo globuli aut in summo calore se habent, aut in inani loco. Etsi enim Cl. vir, de secta Iatromathematica, sanguinem in calore ebullientis aquæ quadragesima *n* parte prioris voluminis, deinde in nuperioribus scriptis tantum ducentesima *o* rarefieri scripsit, inque febribus sexcentesima *p*, nostris tamen in experimentis *q*, cum calor multo major adhiberetur, nullum omnino voluminis incrementum in globulis adparuit. Ita neque in spatium ab aere evacuaturn *r* dimissi globuli grandescunt. Ut omnino hanc hypothesin dimittere liceat.

### §. XIX. Num ex filis.

Nova est sententia Cl. viri *J. Henrici Lange*,

*l* De uno pulsu. p. 4. physiol.  
p. 18.

*m* In Philos. Transact. n. 361.

*n* De inflammat. p. 42. de toto vero sanguine fermo est, in quem variis modis aer se admiscere potuit.

*o* Des effets de l'air p. 32.

*p* Ibid.

*q* Second memoir &c. Exp. 6. 7.

*r* Jurin l. c. & in diss. VIII. p. 100. Morgan philosoph. princip. of medicine p. 114. Williams of the yellow fever. p. 15.



qui globulos sanguinis pro glomeribus filorum habet, in figuram globosam ita compactis, ut altero fine in centro jungantur, altero se per ambitum diffundant *r\**. Eam sanguinis fabricam putat in morbis acutis mutari, ut globulus in suas fibras dissolvatur *r\*\**. Verum ea fila neque ego unquam vidi, neque quifquam Cl. virorum, qui in globulorum natura indaganda laboraverunt.

§. XX. *Num in alios globulos minores rubri globuli dissiliant.*

*Quibus argumentis adfirmetur.*

Majoris etiam momenti hanc quæstionem esse persuadeor, cum divisione globulorum, tamquam altera columna, systema humorum tenuiorum nitatur. Eo accuratius adeo audire oportet, quæ pro hac divisione stabilienda adferuntur. Ergo *Antonius v. Leeuwenhoeck* in proprio stercore *s* globulos ex sex aliis compositos, aliosque vidit, trigessimæ sextæ parti sphaerulæ sanguinæ æquales: inque boum & equorum excrementis *t* alios globulos sextæ, alios trigessimæ parti rubri globuli æquales. Porro in equi urina *v* globosas moleculas percepit, quæ ex sex sphaerulis componebantur, sanguinæ æqua-

*r\** Remed. domest. p. 155. 34. ad R. Hooke dat. p. 38. 165. Nov. verit. p. 46. *t* p. 39.  
*r\*\** Nov. verit. p. 49. *v* p. 40.  
*s* Anat. & contemplat. Epist.

libus : eademque singulae in alias sex minores sphaerulas resolvebantur. In urina humana  $x$  multas particulas vidit , sextae parti rubri globuli aequales. In ipsis cerevisiae  $y$  faecibus iterum globulos , ex sex aliis conflatos , inque vini faece  $z$  minus certae formae rotundas particulas vitris suis adtigit , quae duabus , tribus , sex & ultra minoribus sphaerulis constarent. In vino , sulfuris fumo medicato , & sphaerulas ex sex globulis compositas , & earum in sex minores moleculas dissolutionem distinxit.

His , & similibus aliis experimentis confirmatus , anno 1680  $a$  in eam sententiam inductus est , chyli globulos fingi in sphaerulas sextae parti sanguinei globuli aequales , ejusmodi vero sex sphaerulas in unum globulum sanguineum componi , cum imprimis in chylo & lacte  $b$  globulos videret , sextae parti sanguineae moleculae aequales. Multa inde vidit , quae eam opinionem fulcire videbantur. In squillarum  $c$  & in cancrorum sanguine  $d$  globulos percepit , ex sex pellucidis sphaerulis compositos , inque salmonis  $e$  sanguine ex sex ovalibus planisque particulis. In aqua porro globulos sextae parti sphaerulae sanguineae aequales vidit , aut certe se vidisse credidit , in unam sphaerulam san-

$x$  *Exper. & contemplat.*  
*Epist.* 56. p. 13.

$y$  *Id. ibid.* p. 2.

$z$  p. 6. 7.

$a$  l. c. p. 3.

$b$  *Ibid.* p. 12.

$c$  l. c. p. 189.

$d$  l. c. p. 451.

$e$  *Continuat. arcanor. natur.*

*Epist.* 128. p. 218. 221. f. 4.



sanguineae simillimam sola agitatione compingi *f*, eamque majoris globuli formationem iconibus expressit *g*. Vicissim globulos majores iterum dissolvi, inque sex rotundas moleculas singulos discedere conspexit, ex quibus primum coaluisse videbantur: eam resolutionem & in vino sulfure vitiatum *h*, & in cerevisia *i* repetiit. In sanguine demum *k* moleculam rubram quamlibet sex in sphaerulas dissilire expertus est, quae molliores essent illis in vini & cerevisiae faecibus globulis, & aliquanto difficilius invenirentur.

Eodem modo addito sale volatili oleoso plerisque globulos in sex minores resolvi *l* addit, ut non alius quam minor ejusmodi globulus superesset. Ita factum est, ut minime dubitaverit, de sero perinde, ut de cruore, pronunciare, & ipsum hunc tenuiorem humorem ex globulis componi *m*.

Sed neque in hac subtilitate Cl. viri industria substitit. Viderat suo *n* in stercore, inque bubulo *o*, particulas trigesima sextae parti rubri globuli aequales, quales cruorem humanum constituunt: in chylo vero particulas multo iis minores, quas cum sexta parte rubri globuli comparaverat. Inde, ejusdem anni

*f* *Experim. & contemplat.*  
p. 10. 11.

*g* loc. modo citat. *exper. & contempl.* p. 2. *contin. arcan. natur. Epist.* 128. f. 5. 6.

*h* *Experim. & contempl.*  
p. 8.

*i* *Ibid.*

*k* *Ibid.*

*l* *Ibid.* p. 35. 36. 87. *Phil. Transact.* n. 145.

*m* *Philos. Transact.* n. 117.

*n* *Anat. & contemplat.* p. 38.

*o* *Exper. & contemplat.* p. 12.

1680 novembre M. confecit *p*, globulum rubrum sanguinis humani componi ex sex minoribus sphaerulis: has singulas sex minoribus pilis fieri, & etiam has minimas sphaerulas forte ex minoribus iterum globulis constare, ut omnino unicus ruber humani sanguinis globulus ex 36 *q*, & forte ex 216 minoribus globulis compingatur, inque eos iterum dissolvi possit. Denique sale volatili *r* adjecto globulos ita adteuari vidit, ut in particulas trigesima sextae parti suae molis abirent, adeoque sanguineum globulum ex triginta sex aliis sphaerulis post nupera sua experimenta confidentius pronunciavit s.

§. XXI. *Aliorum experimenta, & hypothesis Boerhaaviana.*

Non frequentes utique aliorum scriptorum propriae de minoribus globulis adnotationes occurrunt. Luteos tamen orbiculos in vasis minoribus prior jam *Malpighius t* vidit. Deinde *Johannes Tabor v* globulum rubrum ex minoribus particulis componi, lente vitrea adhibita expertus comperit. Minores pellucidos globulos se vidisse auctor est *Carolus Augustus de Bergen x*, de

*p* l. c.

*q* Adde *continuat. arcan. natur.* p. 222.

*r* *Experim. & contemplat.* p. 88.

*s* *Contin. arcan. natur. pag.* 222.

*t* *Posthum.* p. 123.

*v* *Exercit.* p. 59. 60. Moleculas in sanguine vidit, quæ ad globulum rubrum se habeant, uti *1*, ad 3415. p. 60.

*x* l. c.



de eorum numero non perinde certus; Globulos in sanguine albos dixit *Johannes Bonhomme* y; decolores *Henricus Baker* z, qui in minorem ramulum de trunco arteriolæ redierint. Flavorem meminit *Franciscus Boissier* a; & compositionem minorum globulorum in unam massam congestorum; credit suis se oculis percepisse illustris testis *Stephanus Hales* b. Seri flavos globulos vidit etiam Cl. *Lëdermüller* & *A. C. Lorry*. Seri globulos modico tepore adhibito in plures massulas secedere auctor est *Thomas Schwenke* c. Addi potest; rubrum cruorem manifesto crassam naturam suam; pulchramque purpuram deponere, inque flavum serum degenerare: eam vero mutationem physiologi ita interpretantur; ut discessionem in minores massulas demonstret d. In minores massulas abire; non tamen certo numero, neque in serum; gravis auctor est *Hieronymus David Gaubius* e; neque ipse ab ea opinione alienus fui f.

Huc revoces *J. Maria à Turre* experimentum, qui anulares suas vesiculas in particulas illas minores oblongas quibus constat; quoties motus sanguinis acrior urgeret; diffiluisse vidit. His; & aliis forte; quæ secundum ingenium magno viro suppeditabat; argumentis; celebrem

y *Cephalotomie* p. 309.

z l. c. p. 136.

a *Pulsus theor.* p. 24.

b *Hæmastat.* p. 96.

c p. III.

Tom. III.

d *Schwenke* p. 112. *Wyer*  
*Guil. Mays* l. c. p. 100.

e l. c. p. 162.

f *Comment.* ad prælect.  
*Boerha.* T. II. p. 322.

hypothesin superstruxit *Hermannus Boerhaave* g,  
 „ esse nempe in sanguine globulos rubros, mole-  
 „ cularum, quæ in humanis humoribus repe-  
 „ riantur, maximos: eos globulos ex sex sero-  
 „ sis sphæculis compactis nasci, inque ejusdem  
 „ iterum generis sphæculas resolvi. Porro  
 „ globulum serosum, flavum, sive secundi  
 „ generis, componi ex lymphaticis pellucidis  
 „ sphæculis, inque easdem iterum comminui h;  
 „ in rubro itaque globulo & sex serosos, &  
 „ triginta sex lymphaticos globulos coalitos  
 „ contineri. Verum neque his limitibus divi-  
 „ sionem globulorum terminari: licet oculo-  
 „ rum acies ultra nihil separet i. Nam longo  
 „ procul dubio ordine globulum etiam lym-  
 „ phaticum ex minoribus, & invisibilibus, mul-  
 „ tarum serierum sphæculis componi, omnium  
 „ vero ultimum & tenuissimum globulum esse,  
 „ qui fluidum constituat spirituum nomine  
 „ notius. Sua vero singulis globulorum serie-  
 „ bus & propria vasa esse, arteriosi generis,  
 „ venosique: serosas nempe, & lymphaticas  
 „ arterias venasque, & perspirantia demum  
 „ vascula, & spiritalia k.

Hanc hypothesin, late per pathologiam etiam  
 regnaturam, plurimi recentiorum medicorum

g *Instit. rei Medic.* n. 226.  
 & in *prælect.* & de *viribus*  
*medic.* p. 82.

h Lympham ex dissiliantibus  
 rubris globuli nasci recepe-  
 runt præter *Boerhaave prælect.*  
 T. II. p. 325. etiam *Antonius*

*Deidier physiolog.* p. 34. F.  
*Quesnai de la saignée nov.* ed.  
 p. 418. *Lorry des alim.* p. 156.  
 seqq. & alii.

i l. c.

k *Ibid.* n. 246. *prælect. acad.*  
 T. II. p. 323. 324.



& mathematicorum admiserunt *l*, ipseque *Petrus Antonius Michelotti m*, belgicæque in primis scholæ doctores *Thomas Schwenke n*, *Johannes de Gorter*, *Gerardus v. Swieten*, alii.

§. XXII. Qui contra scripserint.

Ut fere fit, quam plurimo cum plausu plerique receperunt hypothesein, eam pauci primo, sensim plures, infirmare susceperunt. Primus, ni fallor, *Johannes Tabor*, alioquin de *Stablii* secta homo, negavit, visum sibi globulum ferofum, qui in minores sphæriculas discederet o. Inde *J. Maria Lancisi*, cum globulos sanguineos curiose contemplatus esset, nunquam ex minoribus moleculis componi vidit *p*. Porro eruditissimus olim collega noster *J. Godofridus Brendel q*, proprio libello ostendit, fieri non posse, ut una & diametri ratio, & voluminis aucti, globulorum majorum vera sit, quales *Leeuwenhoechius* habet.

---

|  |  |
|--|--|
| <p><i>l</i> Georgius Martine l. c. p. 58. Clifton Wintringham senior de podagra p. 28. Cl. Adrianus Helvetius æconom. animal. ubique, &amp; in hist. de l'Acad. des Scienc. 1725. Martinus Noguez anat. du corps humain p. 508. Servatius Augustinus Villers physiolog. p. 161. J. Franciscus le Fevre operum p. 47. Josephus Lieutaud physiolog. p. 84. 85. Franciscus Quesnai (lymphaticum nempe globulum sex in minores dividi) æcon. anim. T. III. p. 41. 78. &amp;c. J. Frid-</p> | <p>ricus Schreiber Element. med. Phys. math. L. II. c. 2. Almagest, p. 168. Ernestus Jeremias Neisfeld de secretionibus p. 52. Thomas Kinneir of nerves p. 6. 7. Franciscus de Sauvages physiolog. p. 126. m Leeuwenhoecki nempe experimenta probat de separat. humor. p. 284. n l. c. p. 109. o l. c. p. 60. p l. c. p. 21. q Programmatae Gottingæ anno 1747. edito.</p> |
|--|--|

Sed imprimis *Petrus Senac*, qua pollebat ingenii acie, copiosius contra *Boerhaavianam* globulorum sanguineorum divisionem dixit, negavitque serum, aut lympham, globulis constare *r*, eosque, qui pro flavis globulis aliquoties ab *Antonio v. Leeuwenhoeck* habiti sunt, omnino rubros quidem globulos, sed solitarios, fuisse, suoque imposuisse pallore, perspicax suspicatus est. Porro acervos fuisse globulorum, quos bonus senex ex globulis conponi putavit *t*; neque quemquam vidisse duos globulos uniri, ut in unum confluant *v*; neque ejusmodi coalitionem probabilem videri; neque vicissim certa fide innotuisse, globulum rubrum in minores sphaerulas discessisse *x*; neque demum ex rubris globulis dissipatis lympham nasci, cum globulis destructis ipsa supersit *y*, *Idem Ill. Auctor* ad notavit. Nuper demum *Cl. Spalanzanus & Felix Fontana* & coalitum particularum unius globuli rejecerunt, & dissolutionem, tum *Cl. Davies*.

§. XXIII. *Quid in globulorum divisione firmum videatur.*

Auctoritas hinc amati præceptoris, inde contraria argumenta & experimenta, fecerunt, ut propriis, neque paucis, periculis in naturam globulorum sanguineorum inquirerem *z*. Ea

*r* *Traité du cœur*, T. II.  
p. 91. 660.

*s* *Ibid.* p. 662,  
*t* p. 659.

*v* p. 658.

*x* p. 665,

*y* p. 96.

*z* *Memoir, sur le mouvement du sang.* c. I,



experimenta, ut numerosa fuerunt, in eo demum consenserunt, præter globulos rubros, unius classis & magnitudinis, nullam in sanguine indigenam sphæram reperiri: qui vero globuli passim & mihi *a*, & aliis, flavi visi essent, eos ipsos globulis rubris minime minores, de eodem genere esse, & unice pallere, quod in languente bestiola experimentum factum sit *b*.

Porro icones *Leeuwenhoeckianæ* confirmant, globulorum omnino acervos fuisse, quos in salmone pro sphæra ex minoribus sphæris composita habuit vir Cl. Ita enim toties in meis periculis visa sanguinis coagula cum *Leeuwenhoeckii* figura *c* consentiunt, ut nihil magis. Deinde neque unquam aut dissilientem in minores globulum rubrum ullum vidi, aut vicissim minores sphæras in majorem unicam coalescere. Videntur autem rubri globuli nimis suæ figuræ, sui que voluminis tenaces esse, neque ejusmodi aut regularem divisionem, aut coalitionem admittere: in coagulo enim, & sanguineo grumo *d*, & unguine *e* demum quasi oleoso, in quod ii globuli per quietem degenerant, figuram, quam amisisse videntur, conservant, facileque recuperant immutatam. In

*a* Ibid. exp. 3. 4. 11. 13. 16. 179. 186. 205. 208. in *Continuat. arcan. natur. epist.* 119.

17.

*b* p. 57.

p. 117.

*c* *Epist.* 128. f. 4. Confer ejus agmina globulorum in *exper. & contempl.* p. 178.

*d* *Exp.* 160. 161. p. 303. &c.

*e* p. 35.

ipsis demum Ill. *Elleri* experimentis adparuit, falem marinum, nitrum, falem Epfomenfem, alumen, variis modis globulorum unionem mutare, ut fanguis aut cogatur, aut folvatur, & tamen figuram globofam in eo coagulo, aut in folutione fupereffe *f*; demum ipfum falis, & nitri, & vitrioli fpiritum, qui vehementer fanguinem coagulant, globulos tamen neque deftruere, neque mole minuere *g*. Serum denique, per quod ipfum rubri globuli moventur, totum ita pellucet, ut ne quidem oculis percipi poffit, & rubri globuli per inane ferri videantur, etiam *Josepho Antonio Puati* teſte *h*, graviffimo equidem viro.

Deinde globuli rubri in lympham deliqueſcere non videntur, qui & inflammabile elementum plurimum contineant *i*, & ferrum *l*, quo lympham *m* pene tota caret, & cujus ejuſmodi firmitas eſt, quam leni calore deftrui poſſe non debeat ſperari. Sed idem calor, qui cruorem in lympham reſolvit, idem etiam lympham adtenuat, & eam indolem deftruit, ob quam a potentiori acore, & a vini ſpiritu cogitur, ut non probabile ſit, coagulabilem naturam in lympham fupereffe poſſe, ſi in eam cruor contabuiffet. Quare, quoties ruber ſanguinis grumus in flavum liquamen diffluit, vel omnino globulorum moles diminuitur, ut porro & armato

*f* l. c. p. 13. 15.

*g* Ibid. p. 16.

*h* De morbo Navanian. p.

104.

*i* Sect. iſtius n. 42.

*l* Sect. iſtius n. 47.

*m* Sect. III. n. 8.



oculo propria subtilitas eos subripiat *n* ; aut simplicius , grumus ruber serum quidem exsudat , quod inter rubros globulos continebatur , neque tamen ad eorum naturam pertinebat. Quando vero diutius adservatus sanguis & globulosam fabricam amittit & colorem , & in aquam resolvitur , tunc utique adiposa globulorum natura per putredinem , lenisque caloris operam , in aquulam pallentem eliquatur , uti omnis adeps per putredinem contabescit. Nullo autem experimento constat , ejusmodi in ichore globulos esse , aut eam naturam superesse , quæ cum corporis humani integritate consistere queat.

Nunc , si ista conferas cum iis , quæ dudum contra vasorum decrecentes series monuimus *o* , & ea vasorum quasi per gradus pergens diminutio , & perinde respondens globulorum in minores sphaerulas dissolutio , pariter infirmo fundamento niti videbuntur. Non id nego , & tenuiora vasa dari , & his aptos tenuiores humores : id volo , de iis humoribus pronunciari non posse , aut globulis constare , aut eos globulos perpetua scala ex rubris globulis natos esse , inve rubros globulos iterum compingi posse. Coagula caeterum globulorum ex quiete nata , ipse vidi *p* , & modum , quo vascula minima præ pallore *q* invisibilia , oculis conspicua

*n* Theoria est III. Senaci , T. II. p. 666. etiam experimento nixa. Etiam sale corticis peruviani admisto ita extenuantur , ut porro oculis percipi non possint.

*o* L. II. p. 217. seqq.

*p* Conf. p. 35.

*q* In experimentis numerosis 71. 91. 92. 95. 183. &c. Second Memoir. &c.

rubraque reddi possunt, dum sanguinis copiosioribus undis perfluuntur. Inverso experimento intelligitur, ut possint rubra etiam vasa evanescere, quando pariori sanguine adluuntur. Nam & rubor diminuto globulorum numero decrescit, & albor membranarum cum earum crassitie augetur *r.* J. Maria a Turre idem se vidisse existimat, quod vidit *Leeuwenhoeckius*, nempe unum globulum, qui dissipatus fuerit.

§. XXIV. *Aliqua cum globulis facta experimenta.*

Cl. *Hewson* globulos cum variis liquoribus & aquis composuit. Ab aqua diximus intumescere, & in sphaerulas turgescere, & demum dissolvi, quod pene incredibile videtur, qui nativi aquosi feri hospites sint: ab acore non acerrimo pariter dissolvi: non ab alcali: ab alumine, spiritu vini & vitrioli corrugari, a putrefactione asperas reddi, & demum dividi. Nihil ego hujusmodi vidi, neque figuram aut ab aceto, aut a spiritu nitri etiam fumante mutatam, tantum ut terreum, luridumque, colorem ab his acidis liquoribus contrahant.

§. XXV. *Num in sanguine viventis animalis fibrae sint.*

Antiqua res est fibra sanguinis, nam & auctor libri *de carnibus* s habet, qui inter *Hippocraticos*



adservatur, & imprimis *Aristoteles*, qui fibras calidorum animalium sanguini inesse, non perinde timidorum *t* animalium cruori, & earum fibrarum gratia sanguinem concrefcere scribit: hinc sanguinem damae cervique, meticulosarum bestiarum, minus firmiter cogi, omnino vero non coire eum sanguinem, de quo fibras eximeris *u*: quae eadem *Galen*i *x* est sententia: quam hactenus correxit *Johannes Fernelius y*, ut damarum etiam & cervorum in sanguine fibras reperiri adderet. In scholis medicis, cum aliis *Galen*i placitis, receptæ fibræ diu absque contraria voce regnarunt, & inter recentiores etiam scriptores & elasticas *z* esse, & contractioni articularum reniti, & esse contractionis capaces & relaxationis *a* alii scripserunt; alii cum muscutorum fibris compararunt *b*; aliis ipsas fibras ex animali, & ex vegetabili etiam cibo, in corpus humanum rapi, & fibrarum nostri corporis intervallis adponi, ut omnino eadem fibra nunc hominis sit, quæ modo fuit oviculæ *c*, probabile visum sit, & gravi atque nuperrimo scriptori tertium cum cruore & sero sanguinis ele-

*t* *Histor. anim.* L. III. c. 6.  
*De partibus anim.* L. II. c. 4.

*v* *Histor. animal.* L. III. c. 8.  
 & 19. *Part. anim.* l. c.

*x* *De elementis* L. II.

*y* *De sanguin. natur.* L. VI.

c. 7. In cervi cruore etiam modo, quo cibi in ventriculo fibras reperit *Al. Petronius* conter. quæ quidem epistola apud *Cagnatium observ. var.* Cl. *Boeri* nomen præ se fert, p. 56.

*z* *Hecquet de la trituration* T. I. p. 60. &c.

*a* *Question sur la hoisson* Ejusd.

*b* *Willis de cerebro* p. 130.

*c* *Archibaldus Pitcarne* de

mentum fibra est *d*. Neque defuit, qui fibras diminutas in globulos abire scripserit *d*<sup>\*</sup>.

Duplici potissimum experimento naturam fibrosam sanguinis confirmare tentarunt, quibus ea sententia placuit. Placenta nempe sanguinis ex suis vasis effusi, sponteque sua coacti, solidarum quasi partium reticulum refert, in quarum areolis serum sedet. Eas solidas particulas pro fibris habent. Ita *Malpighius e*, & clari viri discipulus *f*; & ipse *Malpighii* adversarius *J. Hieronymus Sbaralea f*<sup>\*</sup> pari fere modo rete sanguineum descripsit. Porro nuper vir Cl. *Vincentius Menghinus g* fibras sanguinis linteo impositi, ab elutis aqua adfusa globulis separavit: & Ill. vir *Hieronymus David Gaubius* & Cl. *Kronauer* de sanguine frigefcente, & stagnante, multa frigida abluto, filamenta fere membranosa obtinuit *b*. Demum Cl. *Butt* de sanguine rubram portionem eluit, ita massam albam superesse reperit firmam & tenacem, quæ sit pars fibrosa sanguinis *b*<sup>\*</sup>.

Et omnino sanguis, qui in frigidam de nare destillat, continuo in oleosam striatamque crustam expanditur, quæ aquæ innatat. Ab ea vero macula continuo lineæ per aquam descendunt

*d* H. D. *Gaubius* patholog. p. 160.

*d*<sup>\*</sup> *Fizes* de liene p. 123.

*e* l. c. p. 125. 126. de polyp.

*f* *J. Maria Lancisius* l. c. p. 21. ed nov.

*f*<sup>\*</sup> *Mentis & oculi vigil.* p. 105, 106.

*g* *Comment. Bonon. T. II. P. II. p. 254.*

*b* p. 158. Habet etiam fibras *Shebbeare T. II. p. 20.* ex quibus corium sanguinis credit coalescere.

*b*<sup>\*</sup> l. c. p. 3.



fundumque petunt , quæ in calida in nebulas abeunt, cum alcohole vero vini in pelliculas *i*. Si majori copia , ut ex vena pedis incisa , sanguis frigida exceptus fuerit , etiam evidentius pellucidæ fibræ in aqua nascuntur , quæ se amplexæ & cohærentes, ad vasis fundum descendunt *k*.

Iterum , ex sanguine in aqua agitato fibrosa lanugo nascitur , quæ fundum aquæ petit , Ill. nostro olim socero auctore. In suillo sanguine quassato fibræ oriuntur *l* , quæ membranas constituunt. Sanguis suillus , per horam percussus , involutus erat substantia ex fibris membranam referentibus facta, carnis omnino simili , in qua, plurima aqua macerata , fibræ albæ adparuerunt *m*. Et sanguis animalium crustaceorum exsiccatus in musculosam & fibrosam carnem abit *n*.

Cl. *Davies* sanguinem in aquam emissum fieri docet in reticulum fibrarum albarum ; & similes fibras obtineri , sanguine in phiala concusso , albas eas , glutinosas , & elasticas.

Huc etiam polypi revocari possunt , fibrosi utique , quasi cellulosa tela misti , quæ fibras connectit, sive ii in corde reperiantur *o* , sive ex sanguine de vena misso in fervida nati fuerint *p*.

*i* Antonius de Heyde obs. 87.  
*Senac* T. II. p. 103.

*k* Fernelius l. c. L. VI. c. 7.  
*Bartoli del ghiaccio* p. 184.  
*Malpighius posthum.* p. 45.  
*Sylva de la saignée* T. II. p. 357.  
*Schwenke* p. 104. *Bruynsteen de inflammat.*

*l* *Teichmeyer de polyp.* n. 12.  
*Anthropolog.* p. 65.

*m* *Boehmer de præcavend.*  
*polyp. gener.* p. 14.

*n* *Lister de humorib.* c. 22.

*o* *Teichmeyer de polyp.* n. 10.

*p* *Schulze in physical. belustig.*  
T. III. p. 1065. 1066. 1067.

Denique non defuerunt testes , qui in sanguine , pariter ut globulos , ita fibras se vidisse referant , *Philippus* nempe *Verheyen* q & *Johannes Bonhomme* r.

§. XXV. *Quid contra eas fibras adferatur.*

Primus , quantum quidem memini , *J. Alphonsius Borellus* s fibras sanguinis hactenus impugnavit , ut inter ejus humoris elementa nollet recipere. Phænomena utique , quibus fibræ solebant stabilire , non ignoravit vir Cl. ; in viventis tamen hominis sanguine fibras negavit reperiri , quæ nimis magnæ sint , neque minimis vasculis corporis humani recipi possint. Neque defuerunt , qui Claro viro venirent in subsidium t , neque *Boerhaavius* fibras sanguinis admisit.

Qui vero paulum longitudinem fibrarum sanguinearum meditatus fuerit , & gracilitatem , & mollitiem , is continuo persuadebitur , nullo modo fieri posse , ut vis a corde veniens hujusmodi longum flexileque filum per minimorum vasculorum angustias & anfractus promoveat , quod æquum sit , ad primam quamque vasculi flexionem inpingere , & repulsum in se ipsum convolvi.

q L. II. p. 32.

r *Cephalotomie* p. 309.

s *De mot. anim.* L. II. Prop. 132. p. 265. 266.

t *Johannes Bohn* *circul. anat.* p. 169. *Hieronymus Sbaragli* l. c. p. 9. *Guilielmus Comper* ad *Bidl.* T. 23. f. 16.



Sed in vivi animalis sanguine nihil unquam fibræ v simile adparet ; aut in meis experimentis ; aut in alienis , aut in emissio cruore ; quamcunque convexorum vitrorum vim adhibueris. In sero utique sanguinis , capillari vitrea fistula recepti , ramenta *Malpighius* x reperit ; quæ in solidum corpus coire vidit. Sed ea non debent pro fibra sanguinea citari ; quæ a sero diversa sit.

Denique utiliter monuit Ill. *Schwenkius* y omnino fibras , quæ in frigida colliguntur , in vivo animale adesse non posse ; cum in calore , qualis est vivi animalis , dissolvantur & evanescant. Ipse demum Ill. fibrarum defensor *Gaubius* fibras in vitali sanguinis statu nondum reperiri fatetur z. In calidam , si sanguinem de vena emittas , nullæ fibræ generantur a.

Quæ vero experimenta pro fibris producuntur , eorum aliqua ad membranam sanguinis pertinent , quæ potissimum ex sero coacto fit b : pleraque ad mucaginem , quæ in sanguine plurima est , & in aqua frigente colligitur c : aliqua ad gummosas particulas , quæ cum sanguine circumcumeunt , fluidas hactenus , dum vita & calor superest , ad coeundum vero aptas , quando frigus accessit & quies.

v *Schwenke* p. 103.

x *Posthum.* p. 45. Habet etiam Ill. *Senac* particulas in lymphæ ramosas T. II. p. 91. 660.

y p. 102. 103.

z p. 158.

a *Bartoli* l. c. *Schwenke*

p. 103.

b Conf. *Floyer præternatural. state of humours* , p. 9. *Senac* T. II. p. 104.

c Sect. III. n. 5. *Moscatti nuove sperienze.* Butt separ. *Spont.* p. 30. qui serum coire ponit , filis inter se connatis.

§. XXVI. *Sal sanguinis, num oculis percipiatur.*

Transimus paulatim ad ea sanguinis elementa, quæ demum per alia corpora admista innotescunt, neque in sani vivique animalis sanguine sponte sua se oculis offerunt, sales nempe, oleum, terram, ferrum, aerem. Et salem quidem sanguini inesse sapor *d* prodit. Sanguis nempe de naribus sanissimi hominis stillans, propriæque linguæ oblatus, vehementer falsus videtur, ut obiter aquam falsam exprimat, cui centesima, & major etiam pars salis communis inest. Salem ergo continet, & uberiores, quam quidem saliva, aut mucus, cum quorum humorum sale lingua consuevit. Non ideo a marino sale est, quem in cibis receperimus. Animalia enim fera, quæ nullum salem culinarem admittunt, pariter falsum habent sanguinem *e*. Quis autem is sal sit, nondum inde definitur. Oculum equidem armavit *Leeuwenhoeckius*, ut definiret, crediditque se variis in humoribus animalium sales vidisse, neque eos unius generis. Ergo marino quidem similem, cubicumque salem vidit in lente crystallina *f*, inque sanguine *g* de quo aquæ pars exhalaverat, tum in cancri vitali humore *h*, & squillæ *i*, & aranei *k*. Similia fere in sanguine

*d* Macquer Chym. prat. p. 458. *Quesnai* æcon. anim. ed. vet. p. 150. Jus carnis absque adjecto sale coquendo falsum fit *Schneider* de catarrh. p. 233.

*e* Falco, *Peyer* obs. 48.

*f* Anat. & contemplat. p. 8.

*g* Philos. Transact. n. 117.

*h* Exper. & contemplat. p. 452.

*i* Epist. physiolog. p. 11.

*k* Contin. arcan. natur. p.



experimenta *Lancifius* addidit *l*, & *Wierus Guilielmus Muys m*. Alias porro particulas salinas sanguinis, spiculorumque similiores, *Dominicus Guilielmus n* describit, & *Philippus Verheyen o*; quales equidem particulas in sudore etiam *Leeuwenhoeckius* viderat *p*, spicula in vipera-  
rum vero veneno depinxit eruditissimus olim medicus, *Richardus Mead q*, inque aselli majoris humore crystallino *r* idem iterum Delphen-  
sium civis, quem toties citavimus.

Nos, ut fateamur quod verum est, harum rerum nihil simile vidimus unquam, & eas, quæ in siccato sanguine striæ vitro adhæserunt *s*, non differre credimus ab iis nondum certæ naturæ salibus, quales plurimos *Bakerus* depinxit. In vivi animalis sanguine angulosi quidquam aut linearum simile circumfluere, ea mole, quæ oculis armatis se offerat, atque adeo vasorum minimorum diametro aequalis sit, id quidem non videtur cum eo expedito circuitu conciliari, qui ad vitæ integritatem adeo necessarius est. Nihil nos, dum valemus, a sanguine vasa nostra percurrente patimur, quum continuo incommoda percipiamus, quam primum puri sales cum sanguine circumfluunt. Cum salem polychrestum

*l* Diff. IV.

*m* De fibra musc. p. 100.  
*Philos. Transact.* n. 339.

*n* De sanguinis natur. & constit. n. 52. In siccato equidem sero particulas vitro adhærentes speculatus est.

*o* L. II. p. 33.

*p* Exper. & contempl. p. 390.

*q* Of poisons. p. 15. ed. IV.  
T. I. f. 10. In apis veneno  
Idem.

*r* Epistol. physiol. p. 10. 12.

*s* Ut in *Guilielmini* experimento.

sumsissem, bis fornicationem in pedum plantis, manuumque volis per aliquot horas, inque lingua titillationem percepi, cum interim urina acris manaret.

§. XXVII. *Ut mutetur a salibus mediis admistis.*

Variis modis ad naturam hujus salis, aliorumque elementorum sanguinis indagandam acceditur, admistis salibus, per observatos morbos, per putredinem, denique ignis tortura adhibita. Salium autem, & spirituum, aliorumque humorum admistorum phaenomena prima repetemus, postquam aliqua monuerimus. Experimenta Cl. virorum, quae citabimus, alia cum toto sanguine capta sunt, alia cum cruore a sero separato, neque semper facile fuit distinguere, quae ad sincerum grumum, adve totam massam pertinent. Quoad tamen ejus fieri potest, scopus noster est de rubra parte sanguinis dicere, sive ea pura fuerit, sive admistum serum phaenomena grumo propria non valde vitiaverit. Deinde cavere oportet, ne omnia, quae sanguini accidunt, solis admistis salibus tribuantur: ita cruor sibi relictus sponte sua stat, nullo equidem sale admisto, ut non continuo sali alicui imputari debeat, si sanguis post aliquam moram in placentam coiverit <sup>s\*</sup>.

Ex

---

<sup>s\*</sup> Monet, ut ab effectu aquae nobis caveamus, *Snellen theor.* p. 266. 267.



Ex hac ipsa forte cautela poterit fieri, ut ex lites componantur, quæ de vi nitri aut cogente sanguinem, aut solvente agitatae fuerunt. *Stahlius* t enim a nitro, tanquam frigus inferente pharmaco, sanguinem addensari docuit, non improbabili ratiocinio usus: alii contra, & princeps *Fridericus Hofmann* v, & nuper *Franciscus Boissier*, x a nitro sanguinem potius solvi maluerunt, uti ab aliis mediis salibus solvitur.

Ergo primo ea communis salium mediorum, & lixiviosorum natura est, ut sanguinem plerumque fluidum reddant y, aut liquidum conservent, colorem vero rubrum aut firment z, aut omnino augeant a. A nitro sanguis neque solvitur, neque cogitur, in meis quidem experimentis b. Admisso enim nitro laminae equidem cruoris floridissime rubentes nascuntur,

t *Opusc. phys. med. tum Cl. Viri P. Valcarenghi medicin. ration. p. 79. & Auctoris des leçons de Chymie p. 4. Sanguinem inde in gelatinam cogi Thomas Schwencke p. 145. & Eller l. c. p. 13. ut tamen globuli separati & ordinati sint Eller. Omnes humores humani a nitro admisso densantur Imbert. quæst. med. XII. p. 42.*

v *De acido & viscido p. 51. tum alii præstantes viri Malpighius de polyp. p. 132. Ant. de Heyde obs. 87. Verheyen L. II. p. 31. Th. Schwenke in exp. p. 189. Boecler & Volmar in disp. ad definiendam litem proposita, an nitrum sangui-*

*nem coagulet. Denique Ruttý synopsis. p. 52.*

x *Inter omnes sales sanguinem fluidissimum reddere, sur l'effet des medicaments p. 39.*

y *Boerhaave Elem. Chymia T. II. p. 378. 379. Malpighi p. 132. Addit, imprimis si moti fuerint, Thomas Schwenke p. 190.*

z *Ne brevi, ut alias solet, in obscurum spadiceumque colorem elangueat.*

a *Boerhaave l. c. Eichel in disp. qua Experim. circa sanguin. contin. n. 34. p. 21. n. 44. p. 25.*

b *Second Memoire exp. 29. 34.*

verum eæ, etiam absque nitri ope, pariter ex eodem sanguine coeunt. Color autem vividissime coccineus c utique nitro debetur, quo sale non aliis lætiore purpura sanguinem ditat. Et tamen, is ipse sal, ad novem omnino grana in duabus uncis aquæ dissolutus, in præstantissimorum virorum experimentis, canem subito occidit d, quem ejus periculi exitum quidem mallem casui tribuere, cum nihil ultra miæctum a nitro in sanguinem injecto aliis, magnæ auctoritatis scriptor e, citatum viderit. Cæterum, si de lite illa omnino definire oporteret, crederem nitrum sanguinem potius resolvere, siquidem leviolem reddit f, neque mea experimenta penitus repugnant g. Putredini potenter resistit g\*.

Sal febrifugus *Sylvii*, & in universum sales neutri ex alcali minerali & acore compositi, putredinem adjuvant g\*\*.

Alii sales medii utcunque similia faciunt. Sal marinus cum sanguine commistus floridum b colorem facit, cæterum coagulationem neque valde promovet, neque impedit i, nisi motus

c *Clayton miscell. cur. T. III. p. 347. Petit, seconde lettre p. 34. Schwenke l. c. Hales hæmæstat. p. 154. Eller memoir, de l'Acad. des sciences de Berlin T. VII. p. 13. Sauvages sur l'effet des médicaments p. 37. Exp. meor. 26. 27. 28. 29. 34. Ruttý l. c.*

d *Clayton l. c. Petit l. c.*

e *Malpighius l. c. p. 131.*

f *Silberling l. c. p. 16.*

g *Exp. 27. 28.*

g\* *Mesny ap. Fargioni III.*

p. 38.

g\*\* *Ipey verhandel der Maatschappij te Haerlem XVI. 2.*

b *Verheyen T. II. p. 29. Eller l. c. p. 13*

i *Sharagli l. c. p. 121. 122.*

Stat in gelatinæ rubræ speciem

*Schwenke p. 106. 146. 189.*

*Eller l. c. addit globulos separatos & ordinatos manere.*

Fluiditatem conservat *Ruttý*

*l. c. tab. AA. & adtenuat*

*p. 143.*



acceserit, qui etiam solus coagulationem impedivisset *k*. In venas vivi animalis impulsus sitim fecit, ultra non nocuit *l*.

Tartarus solubilis ruborem auget *m*, ut nitrum, in venas tamen impulsus enecuisse visus est *n*. Cæterum non oportet dissimulasse, subitam hanc liquidorum, inprimis frigentium injectionem, etiam quando natura humoris innocentissima est, animalia occidere. Ita legimus ab aqua injecta *o*, & a lacte *p*, & ab oleo *q*, in venas dato animalia subito periisse.

Sal Epsomensis sanguinem perinde floridiorum reddit, fluidumque, globulorumque distinctionem conservat *r*. Sal mirabilis cogit utique sanguinem *s*. Sed is ipse sal etiam aquam, ut notum est, coagulat.

Nitrum calcarium variorum fontium, mirabilis salis adfines, sanguinem fere cogit *s\**, & lac, tum sal polychrestus *s\*\** & prunellæ.

### §. XXVIII. *Ut ab acidis.*

Sales acidi leniores, sanguinem alias cogunt, alias aut non cogunt, aut omnino diluunt *t*.

*k* Schmenke p. 106.

*l* Phil. Transf. n. 335.

*m* Petit Epist. II. p. 34.

*n* Ibid. p. 37.

*o* Sandris de statu sanguinis, p. 100. Gelida erat.

*p* Lomer de corde c. 2. conf. L. III. p. 228.

*q* Oleo injecto alter canis subito perit, alter post soporem Phil. Transf. n. 335.

*r* Eller l. c. p. 15. Ruttý p. 76. de vulgari sale factitio.

Addit minus tenacem reddere.

*s* Idem ibid.

*s\** Ruttý p. 60. 90. 116. 130. Aqua tamen sulfureo nitrosa minus tenacem reddidit p. 525.

*s\*\** Ruttý p. 78. tenaciorem sanguinem facit & firmiorem

Schmenke p. 190.

*t* Ruttý p. 210.

Tartarus regeneratus sanguinem fluidum reddit, servatque, & floridum *t*\*. Cremor tamen tartari, qui terram propriam conjunctam habet, sanguinem separavit, ut pars inferior cogeretur, & globuli in planitiem conprimerentur *v*. Vinum sanguinem diluit, neque coire finit, etsi a vino generoso venis injecto in pulmone coagulatum sanguinem reperit *Carolus Gianella x*: semper enim oportet memores esse, quam facile a morte sanguis his in vasis, absque alia causa admista cogatur, in cane etiam magis.

Acetum sanguinis fluiditatem non mutat *y*, nec auget *z*, cæterum peculiarem, ingratiſſimum luridumque colorem in sanguine admistum producit *a*: ut omnino non alius liquor inamoenius cruorem tingat, quam quidem is beneficus acor. Neque *J. Baptiste du Hamel b* aut *Freindii* experimento *c* contra ea, quæ ipse vidi, fidem tribuere possum, qui ab aceto destillato sanguinem cogi viderunt. Satis autem notum est, acetum destillatum simplici & naturali potius debilius esse. In venas vivi animalis

*t*\*\* Boerhaave Chem. Elem. S. II. p. 379.

*v* Eller p. 14.

*x* Saggi di medicin. ital. p. 47.

*y* Second memoire Exp. 27.

Quesnai æcon. T. II. p. 66.

Drelincourt apud Manget Biblioth. T. I. p. 951.

Verheyen L. II. p. 31.

Boerhaave l. c. p. 378.

Schwenke p. 190.

Non diluit, nisi tritus accedat Kru-

ger diætet p. 214.

*z* Eichel p. 34. Sauvages act. des medicaments p. 37.

*a* Ibid. exp. 27. 28. 34.

Drelincourt apud Manget bibl.

anat. T. II. p. 951.

Eichel p. 31.

Verheyen l. c. p. 29.

Sauvages l. c. Luteum inde fieri (ab aceti spiritu) Boyle

append. ad hist. sang. p. 101.

Recte, si terreum aut luto-

sum colorem intelligit.

*b* Hist. Acad. p. 75.

*c* p. 177.



datum alias non nocuit *d*, alias animal post eam infusionem extinctum fuit *e*, sive id aceti culpa factum est, sive casus vim suam exseruit. Non facile explices, ut *Caelius Aurelianus* scripsisse potuerit, gelatum ab aceto solvi.

Sal acetosæ, quem intelligo essentialem, & acidum fuisse, sanguinem in lividum concretum mutasse visus est, ut tamen globulorum ordo incorruptus maneret *f*.

Sales acidi fossiles sanguinem magis mutant, potissimum tamen, si acorem igne expuleris, ut sincerum ad cruorem misceas. Alumen aliter & aliter egisse videtur. In Cl. *Stormii* experimento sanguini livorem impertiit atrumque colorem: secundum alios solutum sanguinem aut non cogit adfusum *g*, aut cogit, ut tamen rubedo conservetur *h*, magis vero cogit, si pulverem aluminis majori copia adfuderis *i*. Venis inmissum idem alumen occidit *k*.

Solutio vitrioli potentius operatur, & in sanguine cinereum coagulum flocculentum excitat *l*, ut globuli in filamenta mutantur. Vitriolum album, quod metallicum aliquid ad-

*d* Petit l. c. p. 37. cum ad duas uncias infudisset, *Courten Phil. Trans.* n. 335.

*e* Pinelli de podagra p. 230. *Sproegel* p. 79. A copia aceti occisum animal *Freind* p. 182.

*f* Eller p. 15.

*g* *Quesnai* T. I. p. 103. *Schwenke* p. 148. 149.

*h* Eller p. 13. conf. *Schwenke* p. 190. *Ant. de Heyde* obs. 87.

*Rutty* T. AA. *Baglivius* & cogere, & obscuro lividoque colore tingere auctor est p. 464.

*i* *Eichel* p. 30. *Schwenke* l. c.

*k* *Philos. Transact.* n. 210.

*l* Eller l. c. *Schwenke* p. 196.

Mireris de viridi negare, ut solvere aiat Cl. *Rutty* p. 262. 263. cum tamen aquas vitriolicas ferum & salivam dicat cogere p. 268.

mistum habere videtur, sanguinem admistum coagulat, & injectum in vivi animalis venas cogit *m*. Sal martis, qui & ipse vitrioli genus est aliquanto magis artificiosum, sanguinem solutus addensat *n*, ejusque tinctura nigrum ipsi colorem impertit *o*. In venas inmissa anima martis bestiam letho dedit *p*. Vitriolum cæruleum, cupreum & potentius, sanguinem & plerosque humores cogit *p*<sup>\*</sup>, etiam aquæ eo vitriolo fetæ *p*<sup>\*\*</sup>.

Vehementius iterum sanguinem mutant acidi liquores, quos multus ignis de salibus exegit. Diluti equidem mitius hactenus sæviunt. Spiritus vitrioli debilior, & aluminis, & sulfuris liquor sanguinem nondum cogunt *q*, & potius diluere videntur *r*, & in venam injectus spiritus salis dilutus, & aqua regia debilis, animal non occidit *s*. Sed etiam vitriolicus liquor longo usu sanguinem valde inflammatorium arthritici homini potius diluisse visus est *t*. Meraciores iidem spiritus utique totum cum fero sanguinem cogunt *v*, nigrumque *v*<sup>\*</sup> reddunt.

*m* Courten l. c. & subito occidit. De hungarico vitriolo Deidier de la peste in collect. p. 534.

*n* Wrigth de ferro p. 31.

*o* Silberling p. 18.

*p* De Heyde obs. 90.

*p*<sup>\*</sup> Ratty T. AA. & p. 262. 263.

*p*<sup>\*\*</sup> Idem p. 291.

*q* Malpighi l. c. p. 131. Pitcarne Element. med. math.

p. 36. Quesnai l. c. p. 26.

*r* Colonius de thermis p. 20.

*s* Arcissewsky de curatione podagræ p. 96. 97.

*t* Petit l. c. p. 37. Spreegel exp. 56.

*v* Ant. de Heyde obs. 87. Eichel n. 39. de Haen l. c. p. 112. &c. Birch. hist. of the R. Soc. T. I. p. 509.

*v*<sup>\*</sup> Subvirides globulos. Butt l. c. p. 52.



Inprimis autem spiritus falis sanguinem coagulat *x*, coloremque ad atrum tendentem inducit *y*, globulos tamen non destruit *z*. Ejusmodi massa cruoris nigro carboni similis incorrupta manet *a*. Sed etiam dulcis, ut vocant *b*, falis spiritus sanguinem addensat, minus tamen valide. In venas injectus spiritus falis necat, & in iis animalibus, quæ enecuit, sanguis per totam venarum seriem ad cor usque in grumos coactus reperitur *c*. Etiam aqua regia injecta occidit *d*.

Nitri spiritus sanguinis colorem per ipsas etiam vasorum vivi animalis membranas, in lutulentum terreumque *e* colorem mutat, unguinisque modo lentum cogit stare. Nudum sanguinem adfusus cogit *f*. Etiam dulcis sanguinem addensat *g*. Meracus in venam vivi animalis injectus necat *h*, iterumque ab ejus acoris violentia sanguis in venis brachii cavaque vena, & dextra aure, & ejus lateris ventriculo, & in pulmone in grumos fixus repertus est *i*. Cum sicco san-

*x* Boerhaave, *Pictarne* l. c. *Freind* p. 177. *Schwenke*.

*y* Plerique priorum.

*z* *Eller* l. c. p. 16.

*a* *De Haen* p. 112.

*b* *Freind*, *Schwenke*. In venas tamen receptus enecuit.

*c* *Sproegel* exp. 57. 58.

*d* *Borrich.* de sang. p. 85. De spiritibus acidis in universum v. *Aalsen* in disp. de humorib. Leid. 1671. edita.

*e* *Second Memoire* Exp. 24. 25. Nigrum vocat *Petit* p. 34.

*Fædum* *Schwenke* p. 195. *Pallidum* *Eller* l. c. *Limosum* *Drelincourt* l. c. *Terreum* *Birch* l. c. Subvirides globulos reddere *Butt* p. 52.

*f* Cogit utique apud III. viros *Schwenke* l. c. *Pictarne* p. 36. *Boerhaave*, *Bagliv.* *Freind*, *Boyle* appar. p. 58.

*g* *Freind* p. 176.

*h* *Purmänn* *Lorberkranz* L. III. p. 274.

*i* *Fracassatus* l. c.

guine etiam magis fervet, quam vitrioli oleum *k*.

Spiritus vitrioli debilior sanguinem nigricantem reddit *l*, & coagulat *m*, ut fere limum referat, & ab ipso oleo vitrioli diluto coagulum terreum & molle nascitur *n*. Debilis sulfuris spiritus injectus aliquando non occidit *o*, alias *p*, forte non satis dilutus, & ipse, & sulfuris per campanam *q* paratum oleum animal enecuit, in *Cesarei Pozzi* experimento etiam subito, & sanguinem coegit.

Violentior acidus liquor, qui de vitriolo stillat, & spiritus vocatur, sanguinem coagulat, subnigrumque facit, & durum *r*: in venas missus canem occidit, & cruorem in polypos vertit *s*. Oleum vitrioli, qui idem spiritus est meracior, sanguinem atro colore tingit *t*, & cogit *v*. In vivi animalis venas impulsum pariter mortem infert, & sanguinem in grumos addensat *x*. Sed præterea cum eodem cruore effervescebat, &

*k* Grew parts of animals p. 250.

*l* Verheyen L. II. p. 32. Eller p. 16. Globulos nigros reddere. Butt l. c.

*m* Boerhaave, Bagliv. l. c. Borrich l. c. Manget Biblioth. anat. T. II. p. 169. Eller l. c. Inæqualiter addit cogere Fracassatus de cerebro p. 414.

*n* J. Maur. Hofman disquis. anat. pathol. p. 178.

*o* Borrich l. c. Colebatch append. concerning acid. and. alcali, qui canem edacem addit reddidisse. Oleum sul-

furis vocant, qui innocuum reppererunt, Criscentius de febr. p. 65. Cockburne of sea-sicknesses p. 115.

*p* Fracassatus Philos. Trans. n. 27. de cerebro p. 411. 413.

*q* Ettmuller chirurg. infusor. r Eller l. c. p. 16.

*s* Freind l. c. du Hamel p. 88. Bagliv. p. 465.

*t* Eichel p. 29. Æruginosum vocat Pitcarne.

*v* Eichel p. 29. Pitcarne p. 34. Freind, Bagliv. Malpighi.

*x* Zolicofer de dolore p. 11.



calorem fervendo excitat *y*. Non inde protinus alcalina in sanguine indoles demonstratur. Nam etiam aqua *z*, & ipsa demum glacies *a*, cum oleo vitrioli sincero incalescit.

§. XXIX. *Ut a salibus per lixivium factis.*

Antiqua opinio est, sales hujus generis, quos vulgo alcalinos dicunt, sanguinem fluidum *b* reddere, & conservare, ne crassamentum nasci possit *c*; deinde ruborem *d* augere, & ab acidis mutato sanguini suum colorem reddere, & limpiditatem *e*. Hinc coagulo ab acidis salibus facto hanc quasi antidoton jubent opponere *f*.

Fixis in universum salibus, fluidam naturam cum sanguine communicari *g* graves auctores sunt, tum de sale aut oleo tartari *h* sigillatim, & de calcis aqua *i*. Rubrum ab hac classe

*y* Pitcarne p. 34. Eichel l. c. Bagliv. Cum sicco tamen sanguine pariter fervet, & cum cervi cornu Grew parts of animals p. 249. 250.

*z* Boyle de origine formar. p. 34. Sgravesande Elem. phil. Newton n. 2449. Charas mem. de l'Acad. des scienc. 1692.

*a* Boyle l. c. p. 84.

*b* Drelincourt apud Manget l. c. p. 951. 592. Huxham of sore throat. p. 53. Eller l. c. p. 14. Petit, Bagliv. Ant. de Heyde obs. 87. Butt p. 52.

*c* Huxham l. c.

*d* Eller l. c. Bagliv. l. c. Petit Epist. II. p. 34. Schwenke p. 190. Butt p. 52. Eichel p. 22. (de fixis salibus) Freind p. 161. Drelincourtius equidem subni-

grum colorem impertire fatetur l. c.

*e* Eichel p. 24. 28. Rutty de aquis alcalinis tab. CC.

*f* Drelincourt p. 951.

*g* Dodart projet pour servir à l'histoire des plantes p. 236. Freind p. 167. de absinthii sale & genistæ. Boerhaave l. c. Drelincourt. Eller p. 13. Rutty p. 406. tab. CC. & AA.

*h* Petit p. 26. Vieussens de remot. & proxim. p. 224. Bagliv. p. 463. Borrich p. 85. Fracasatus p. 418. Broen de duplic. bile veterum p. 225.

*i* Colonius l. c. Whytt on limewater Ed. II. p. 102. nempe crustam minus tenacem fieri, si in aquam calcis dimiseris, quam si calida pura fueris usus,

colorem intendi , perinde legimus *k*. Sic de salibus volatilibus *l*, alcalinæ classis, similia proposita sunt, nempe liquefieri sanguinem *m*, & ejus rubeum colorem conservari *n*, & augeri *o*. Exempla producta sunt in spiritu salis ammoniaci *p*, sanguinis *q*, cornucervi *r*. Hinc iterum deductum est, in peste, & in morbis malignis, sanguinem ab alcalina vi eliquari *s*, acidaque antidotorum loco esse, quæ alcalium crimina reparent, sanguinique suam coagulabilem indolem reddant.

Verum equidem mihi nondum certum est, aut ruborem, aut fluiditatem, sanguinis ab ejusmodi lixiviosis salibus augeri.

De fluiditate primum, deque salibus fixis, *Franciscus Quesnai* ejusmodi sales coagulum sanguinis durius reddere reperit *t*. Oleum tartari sanguinem, si una digesseris, in syrupum vertit *v*,

*k* *Freind* l. c. *Pitcarne* l. c. *Broen* l. c. *Fracassatus* l. c. *Eller* l. c. A tinctura antimonii *Eller* p. 77. A cineribus rufficis *potash Rutty* p. 406. a nitro murali alcalescente p. 407. a sale urinæ p. 111. equidem minus lixivioso; ab aquis alcalinis tab. CC. a nitro tab. AA.

*l* *Boyle Phil. Transf.* n. 145. 204. *Eller* p. 14. Fixos sales etiam fluidiorem reddere sanguinem.

*m* *Pechlin de purgant.* p. 100. *du Hamel* p. 88. *Eichel* n. 46. *Boerhaave* l. c.

*n* *Boerhaave.*

*o* *Major Chirurg. infus.* p. 223. *Phil. Transf.* n. 204. *Manget bibl. T. II.* p. 169.

*p* Diluere sanguinem *Boyle apparat.* p. 58. *Schwenke* p. 191. *Bagliv.* p. 464. floridum reddere *Freind* p. 150. de *Heyde*, *Birch T. I.* p. 509. tum de urinæ spiritu similia.

*q* Eo ad grumum sanguinis adfuso ruborem nasci floridum *Boyle apparat. ad hist. sang.* p. 42. 43. *append.* p. 116. 118. *Floyer of the præternatural state of humours* p. 158.

*r* Ruborem augere sanguinis *Floyer* l. c. *Birch* l. c.

*s* *Drelincourt* l. c. p. 951. *Huxham*, *Boerhaave &c.*

*t* *Oeconom. anim.* Edit. I. p. XXVII. præf.

*v* *Petit Epist. II.* p. 35.



albumque in cruore coagulum excitat x. Sanguis cum sale tamarisci, artemisiæ, rorismarini, thymi, & meliloti in forte coagulum abiit y. Hinc idem tartari oleum in venas impulsum, canem alias occidit z, ut sanguis omnino coactus & viscidus arterias infarciret a. Alias in *Bourgelati* experimento in floriditate nihil mutavit.

Deinde colorem in sanguine non rubrum produxisse, sed subnigrum b, obscurum c, atrocinerum d, nigrum denique e, auctores existant.

Putredinem a sale sodæ augeri *Υπερ e\**: & porro a volatilibus salibus, ex urinoso genere (& nonnunquam a fixis), grumum nigriorem fieri, cæterum communi sententiæ addictus fatetur Cl. *Eichel f*, deque sale ammoniaco, equidem nondum omnino alcalino, auctor est Cl. *Schwenke g*, a quo ad cruorem admisto gelatinam fature rubram nasci, etiam *Ellerus* vidit h. Deinde in nuperis experimentis suis spiritum salis ammoniaci sanguinem in eandem massam tenacem, inque carbonem abituram cogi, testis est

x Boyle apparatus. ad hist. sang. p. 59.

y Pitcarne p. 40. 41.

z Colebatch append. concern. acids and alcal. n. 215. post aliquot dies; continuo vero in experimento Cl. Courten Philos. Trans. n. 335. & Sprogelii L. I. p. 88. Eadem videntur Etmuller chir. infusor. de Heyde obs. 90.

a Sprogel l. c.

b Drelincourt.

c Bagliv. p. 463.

d Pitcarne p. 40.

e Helvetius éclaircissements, p. 18.

e\* Verhandel der Haerlem Maatschapp XV. 2.

f n. 35. 46.

g p. 189.

h p. 14.

Clarissimus vir *Antonius de Haen* i. In venam injectus idem, quem modo diximus, falis ammoniaci spiritus, animal enecat *h*, nisi parva dosis adhibeatur *l*, & solet ab ea administratione sanguis per venam cavam undique coactus reperiri *m*. Ita & cantharides injectæ, pariter & lixiviosæ, & volatiles, sanguinem nigro colore tinxerunt, & coagularunt *n*: earumdem tinctura, etsi non coegit, nigerrimum tamen reddidit *o*.

Has contrarias opiniones, ut conciliarem, sanguini sano, & recenter de vena emissio, inque diversa vascula recepto, oleum tartari per deliquium natum adfudi, spiritumque cornu cervi. Iste quidem sanguinem nigriorem reddidit, coagula etiam nubeculosa & membranosa, non multis horis duratura, excitavit. Grumo coacto adfusus idem nihil mutavit.

Oleum vero tartari utique & sanguini, & grumo rubicundum, elegantem colorem conciliavit, non tamen supra 24 horas superfuturum. Coagula idem in recente sanguine striata, radiata, laminata, & pene membranosa excitavit, quæ ultra biduum superfuerunt,

i p. 112.

*h* Petit Epist. II. Drelincourt l. c. p. 951. Bautzmann in diss. de peste Leid. 1673. de eodem Drelincourtii experimento locutus; Courten philos. transact. n. 335. Zollicofer l. c. van Aalsen etiam ab unico scrupulo injecto.

*l* Petit l. c. Eo refero non funestum eventum in experimento Harderi Apian. obs. 25. *m* Zollicofer l. c. *n* Veratti Comment. Bonon. T. II. Part. II. p. 108. *o* Baglivi l. c. p. 464. Exprim. de vesic. II.



neque sponte natos grumos impedivit, solvitve.

Cæterum sales ex lixivio enati non quidem semper, ut scriptum est, aliquando tamen & in febribus potissimum, urinosum spiritum adfusi de sanguine coegerunt adscendere.

§. XXX. *Quid inflammabiles spiritus.*

Liquores, qui flammam admotam concipiunt, si sinceri fuerunt valdeque meraci, sanguinem equidem cogunt *p*, in fibrosi cujusdam parenchymatis aut infantilis hepatis speciem *q*, idque coagulum durabile persistit *r*. Ejusmodi coagula a liquore vini stillatitio facta vidi *s*, & a terebinthinæ oleo *t*, vivorum in hominum vulnera calide instillato. In gelatinam albam ab eorum liquorum vi sanguinem cogi non vidi *v*. Diluti iidem sanguinem non cogunt *x*. In venas injectum alcohol vini enecat *y*, late coacto in placentas sanguine *z*: dilutum idem inebriat, & apoplexiam movet, neque occidit *a*.

*p* Boyle apparat. p. 29. append. p. 13. Boerhaave l. c. p. 379. Freind p. 160. Pitcarne p. 36. Schwenke p. 192. Second memoir. Exp. 27. 28. 34.

*q* Second memoir. Exp. 27. 28. Fabricius ab Aquapendente etiam odorem & saporem hepatis in sanguine nasci, reliquit de format. ovi p. 55.

*r* Schwenke p. 192.

*s* De eo intelligenda fere loca n. 15,

*t* Younge curr. triumphal. terebinth. p. 42.

*v* Eichel p. 32.

*x* Solvere potius Malpighius p. 132. de Heyde l. c.

*y* Ant. de Heyde obs. 90. Petit p. 23. Courten Phil. Transf. n. 335. Freind p. 168. Sproegel exp. 50.

*z* Sproegel l. c. Second memoir Exp. 31. 36. & exp. fere n. 3.

*a* Courten l. c. Bagliv.

Sed etiam oleum juniperi sincerius, & ab aqua liberum, sanguinem cogit *b*, pariterque spirituosæ, quas vocant, essentia *c*, & tinctura *d*, quæ liquorem vini continent. Sales volatiles oleosi pelliculam, crustæ pleuriticae similem, excitant *e*, aqua vero cinnamomi leve, & gelatum concrementi genus *f*. Laudanum liquidum Sydenhami sanguinem potius liquidum retinet *g*, globulos tamen quasi glutine adunit. Spiritus vini, dum sanguinem addensat, pondus specificum, quod vocant, auget *h*.

Arfenicum, dubium corporis genus, sanguinem cogit rubrumque reddit *i*. Venena ex plantis sumpta in venas vivi animalis injecta fere sanguinem fluidiorem reddiderunt, gummi guttæ, cocculi, nux vomica, aqua laurocerasi. De sale viperæ *i*\* legi, cogere sanguinem, apud scriptorem non satis certum. Hydrargyrus utique, confirmato eventu, sanguinem dissolvit. Visus est sanguis, cui crusta inerat, serumque nullum adfuerat, post usum vesicatorii confestim serum habuisse absque crusta *i*\*\*. Cæterum infinita alia cum variis succis instituta experimenta, apud Cl. viros

*b* Schwenke p. 196.

*c* Eller p. 17.

*d* Schwenke p. 194.

*e* Leigh dissert. p. 79.

*f* Baglivi p. 464.

*g* Eller l. c. Aliter Cl. Stancarus in Comment. Acad. Pe-

trop. T. I. qui potius cogi scripserat.

*h* Silberling p. 16.

*i* Eller p. 15.

*i*\* Salmon chirurg. p. 858.

*i*\*\* Lysons essais, Class. viat. p. 29.



legere oportet , quos citavi *k*. Obiter autem ex iis , quæ repetii , discas , quam parum ad medicamentorum virtutes dignoscendas utilitatis ab his experimentis possis sperare. Arsenicum enim , summum venenum , sanguinem fere ut beneficum illud nitrum mutat. Acetum inter omnia pharmaca tristissimum colorem sanguini inducit , non ideo minus innocuum. Acidi liquores & lixiviosi pariter cogunt.

§. XXXI. *Per hæc experimenta sanguinis natura nondum innotescit.*

Ex his experimentis nondum ostenditur , sincerum aliquem salem in sanguine habitare. Acidam indolem neque aliquis cum lixivioso sale fervor demonstrat , neque odor , neque sapor , neque aliud signum liberi acoris. Sed neque lixiviosa indoles perfecta huic humori inest. Cum nullo acido liquore fervet , solo oleo vitrioli excepto ; sapore non est alcalino ; neque colores excitat , quos id salium genus producere solet ; neque præcipitat , quæ ab acido liquore dissoluta fuerunt. Id equidem per experimenta ostenditur , quæ nunc proponemus , esse in sanguine eam naturam , quæ adjuta ab aeris calore , aut a motu muscutorum

---

*k* R. Boyle, Car. Drelincourt, Archibaldum Pitcarne , Georgium Bagliovi , Joh. Freind, Thomam Schwenke , Joh. Theodorum Eller. Veniam fere rato retuli , maxime quæ ab infusione venenorum sumpta plurima ad L. III. jam relata sunt. Verum hic nihilominus idoneo loco leguntur.  
vel ob ea peto , quæ hic ite-

aucto , aut demum adjecto aliquo sale fixo in putredinem abeat. Is corporum status nondum quidem ad alcalici classem ea transfert. Neque enim frequenter humores in corpore humano vivente lixiviosi fiunt. Etiam in ardente febre lotium *l* , ut acre sit , nondum tamen cum aceto effervesceat , & unicum experimentum , neque forte satis fidum *m* , existat sanguinis podagrici hominis , qui sirupum violarum viridi colore tinxerit. In equo tamen asthmatico reperio utique sanguinem violarum syrupum colore viridi tinxisse apud Cl. *Bourgelat*. In morbo mucoso ( morve ) equorum sanguis cum spiritu vitrioli fumat , & odorem edit urinosum. In febre maligna urina alcalinam naturam induxit , cum non plures tribus horis stetisset. Plura alias. Hactenus tamen ad alcalinam naturam sanguis accedit , ut omnino , levi exhalatione , quo ad sapam redigitur , qualem *extractum* vocant *n* , ad lixiviosam utique indolem disponatur ; ut aqua , qua grumus sanguinis digestus eluitur , signa præstet lixiviosæ indolis *o* ; ut siccus sanguis cum acidis liquoribus effervesceat *p* , crustæque , quæ de siccatis sanguineis placentis supersunt , alcalini quid habeant *q* ; ut putrida urina cum spiritu nitri ferveat *r*. Ut præterea &

*l* Boerhaave *Prax. Med.* T. I. p. 190. *Langrish modern. practice* p. 98.

*m* Colebatch of the gout p. 256. 431. deque sero doctrine of acids asserted. p. 450.

*n* Verheyen L. II. p. 38.

*o* De Haen l. c. p. 84.

*p* Grevv l. c.

*q* Haen l. c.

*r* Palucci lithotomie perfectionnée p. 58. Schaper de mass. sang. corp. p. 31. de bile Roederer.



& sanguis *r*\* & universum corpus ad citam putredinem, promptam alcalinæ naturæ evolutionem exponatur. In febre acuta aliquot sunt exempla de manubus cineribus clavellatis elutis *r*† spiritum urinosum adscendisse. Qui vero sanguinem in morbo acuto negant putrescere, ii in verbo ludunt & id solum negare volunt, esse perfectam dum vivimus, qualis in cadavere est, putredinem. Bilem *Roedererus* solam negat alcalescere. Putredo vero adeo prope ad naturam lixiviosam accedit, ut acidissimi quique fructus, aut mero acescente frumento pasta animalium corpora, quando computruerunt, nulum nunc ab admoto igne aut essentialis acidive s falis, aut ammoniacalis, aut fixi *t* demum, vestigium repræsentent, exque iis, pridem adeo acidis corporibus, sinceri nunc sales alcalini soli adscendant. Adeo vero certo volatilem salium generationem putredo adjuvat, ut, qui post aquam sales adscendebant acidi, ii nunc alcalini, & volatiles ante aquam adscendant *v*. Sed etiam in animalium carnibus putredo non impedit, quin solita urinosa elementa suppeditent *x*, & olea potissimum ita adtenuantur, ut calore nunc levi cum sale volatili in summas phialas sustollantur *y*.

*r*\* *Collin de Arnica* exp. 3.

*r*† Apud *Model*.

*s* *Boerhaave Elem. Chem.* T. II. p. 289. & seqq. *Natura animalis acorem destruit* *Malouin Chymie pratique* T. II. p. 441.

*t* *Boerhaave* l. c. p. 290.

328. *Macquer* l. c. p. 425.

*v* *Neuman Chym.* T. III.

p. 14. *Boerhaave* l. c. p. 326.

*x* *Navier sur l'amollissement des os* p. 7.

*y* *Idem* *ibid.*

§. XXXII. *Sanguis putrescendo alcalescit.*

Verum hæc omnia follicite debent exponi, cum nuper alii Cl. viri putredinem ab alcalina natura separaverint. In eo quidem consentiunt omnes, & in febre acuta statum putredini & naturæ alcalinæ similem nasci, & a morte. Neque alcali a putredine destrui, quod dictum est, constat: & omnino placentam sanguinis die 10, 20, 30, spiritum perinde alcalinum dedisse, & fortius die 16 & 24, quam primis diebus *b*; & debile alcali nasci, quando sanguis in principiis est putredinis, multo vero fortius, quando putredo longius progressa est. Mature tamen in tabescentibus partibus animalibus putredo nascitur, etiam quando neque cum acore fervent, neque cæruleos succos viridi tingunt *c*. Auget adeo naturam alcalinam *d* putredo, quam primis diebus fermentatio acida morabatur. Qui negarunt alcali nasci, aut certe nasci in libero aere, ii nimis pauca experimenta contemplati sunt *e*.

§. XXXIII. *Sanguis putrescit a motu musculorum, a febre.*

Corporis vehementior exercitatio sola uri-

*b* Collin de arnica.

*c* Idem.

*d* Id. exp. 16.

*e* Pearson.



nam fætidam , acrem , urentem reddit , sudorem ingratum nidorem olentem , sanguinem acrem , febresque omnium ardentissimas , & subitas mortes. Ea mala ex unico die pedestris itineris successisse visa sunt *a*. Qui imperia ducis ad exercitum deferabat *b* , ex ardore in officio nimio , is ipso die pugnae periit. Cursorem publicum , qui magni momenti nuntium adtulerat , summa cum velocitate , intra biduum memini ex pessima febre periisse. Ex itinere sub dio nimio febris ardens , & hydrophobia vera successit *c* , qua in observatione memoria dignum videtur , humores acres in humano corpore natos , eandem venenatam efficaciam exserere , quam quidem virus canis rabidi. Similia a convulsionibus gravioribus fiunt , quæ & ipsæ ad motum musculorum vitiose auctum pertinent. Huc possis referre ob frequentiores pulsus , quod juniora animalia celerius putrescant *d*\*.

Sanguis & universum corpus animale sibi permissum in aere atmosphærico non frigido putrescit eo celerius quo major calor est , ad gradus fere 100. , cujus certa experimenta habeo *d*\*\* ; majori enim calore ferum dissipatur , neque

*a* Buchner de motu voluntar. excedente n. 12.

*b* Ven. & Doctiss. Vir. Cam. Falconet des fievres. p. 19.

*c* Ger. v. Sovieten Commentar. T. III. p. 537. & in dia-

rio , quod edidit Cl. Vandermonde 1757. mens Jul.

*d* Willis de convuls. p. 173.

*d*\* Pearson de putredine.

*d*\*\* Mesny ap. Targioni recolta T. I. p. 451.

cruor nunc putredinem concipit. Sunt qui sanguinem minus celeriter quam carnes ajunt putrescere, ut & mihi in dissectionibus quandoque visum est: sunt qui celerius, ut prius sanguis faeteat, tunc caro, inde ferius bilis & urina *d\*\*\**.

Cum factore ergo serum sanguinis, sanguis, humores universi eam naturam induunt, ut cum acore compositi ferveant, ut syrupum violarum viridi tingant, ut igni subjecti ante ipsam aquam falem volatilem edant, ut alcalini sint.

#### §. XXXIV. *Putredinis phenomena.*

Accuratius vero speculanti progressus putredinis adparuit, fætidum vaporem exhalare, validissime si in vase angusti colli putredo sedem habuerit.

Post eum vaporem putridum, factorem naturamque alcalinam minui & evanescere, & quod reliquum est de putrescente animali, in terram fatuam insipidamque abire. Una, resoluta omnium partium nexu, membranæ primæ & viscera in tabum solvuntur, & denique terreum pollinem sui reliquum faciunt.

Putes adeo putredinem cum alcalina natura conjungi.

---

*d\*\*\* Roederer de bile.*



Negant alii , tunc maximam alcalinam vim in putrescentibus esse , quando putredo summa est. Non nasci addunt , alcali in aqua marina putrescente , etiam si fætor nascitur , & vapor inflammabilis. Videri ad alcali generandum pertinere , ut multum sit in putrescente corpore phlogisti , ut eo in statu minus olei picei super sit. Cæterum ita intelligo putredinis progressum , ut incipiat natura alcalina gigni in sanguine inque putrescente materia animali ; ita expediri primo alcalinos vapores : una magis & magis adipem resolvi , & putridum eum vaporem prævalere ; dissipato adeo & alcali volatili & phlogisto consumpto , inertem materiam superesse ; sic cum pauciori phlogisto mistum acidum salern alcalinum odorem spargere ; phlogisto vero uberius resoluta fætozem putrem adscendere , qui proxime alcalinæ materiæ destructionem præcedit.

In animalibus cursu nimio ad mortem usque exercitis , eadem , vel horum etiam majora fiunt. Cervus vehementissime a venatoribus agitatuz perit , cum fætido sanguine vulnus stillaret *e*. Animalis ad cursum violentum coacti carnes cito putrescunt *f* , ut argentum tingant , & cochleari discerpi possint *g*.

---

*e* Baynard *Psychrolusia or of* III. p. 501. *T. Schuvenke*  
*cold baths* p. 328. p. 52. 54.

*f* Lister *de humorib.* p. 54. *g* Willis *pharmac. rational.*  
*Boerhaave Prælect.* Acad. T. II. p. 91.

Quæ motus musculorum, eadem febris facit, quæcunque ejus origo fuerit : dum sanguinis motum vehementius augeat. Humores in febre *h*, & in variolis *i*, & in petechiali genere *k*, flavaque illa infularum antillarum peste *l*, ad putredinem accedunt, & sanguis fætidus per os & nares erumpit. In malignis febribus frequenter fætet *l*\*. In variolis confluentibus penetrabilem fætorem sæpe expertus, nullis aceti in planas patinas expositi contrariis vaporibus satis emendare potui. Ipsum inde lac ebutyratum, & citri succus putrefeit *m*. Fætent ante mortem, qui febre paludosa putrida laborant *n*. Sudor cadaverosi fætoris in febribus exitialibus halat *n*\*. Fætorem combustarum solearum similem, adeoque alcalinum, in malignis, sudoremque enormiter olentem *Seegerus* observavit *o*. Funestus cadaveris odor in hominibus peste laborantibus *p* percipitur, qualem ab ægro ipso adgnitum mini in bibliopola propriæ mortis certa præsentia dedisse : & *Cl. Fasano* teste Neapoli in exitiali febre olfaciebant *p*\*. In febre inficiente miseri se contagium recepisse sentiebant, cum ingratum terræ odorem in ventriculum descendentem

*h* *Hofman* de gener. sal. morbosor. *Huxham* on sore throat, qui veros sales alcalinos produci credit. *Pringle* p. 429. Addit idem, quamprimum perspiratio cessat.

*i* *Huxham* of fevers p. 52. 53. Sanguis fætidus *Mesny* apud *Targioni* T. III. *Nerucci* lettere p. 64.

*k* *Idem* ibid. p. 62.

*l* *Linings* Essays and observat. of a Soc. at Edimb. T. II.

*l*\* *Kirby* febr. mal.

*m* *Schwenke* p. 55.

*n* *Pringle* p. 211.

*n*\* *Zeeumfch* gesellsch. I. p. 646.

*o* *Pleurit. morbo miliari critice solut.* Fætidus in peste sudor *Fallop.* de bubon. pestil. p. 9. & in febre carcerum *Pringle* on jail fever p. 299.

*p* *Muralt* Chirurg. schriften p. 578.

*p*\* p. 207. Sic *Bagliivi* oper. p. 251.



perciperent *p\*\**. Is autem in peste odor inficit, lateque malum propagat *q*. Mira virulentia humorum in hominibus est, qui peste pereunt, & sanguis ipse fætet *r*, & vapor sumti de pestilente bubone puris igne [subjecto] halans quasi fulminis ictu male curiosum medicum prostravit *s*. Sanguis fætidus, niger & fluidus per nares, gingivas, asperam arteriam, alvum, aliasque per vias erumpens in febre variolosa *s\**. Adeps animalium, de bubula classe, lue interemtorum, olentissimus est *t*. Undique gangrænæ, sanguis dissolutus, faeces fætidissimæ *t\**. Corpora hominum peste extinctorum *v*, aut paludosa febre *x*, continuo putrescunt. Hæc confirmantur ex acidis sudoribus, quos morbo jam remittente in petechiis observarunt Cl. *Strack*, *Rosen*, *Grainger*, aliique, signa fracti domini alcalini. Huc etiam referas, quando satis repetitò ea experimenta confirmata erunt, Cl. *Tichy* memorabilem adnotationem: in urina nempe febricitantis, sed ad crisin dispositi, hominis sales angulosos mediæ naturæ se offerre, qui nulli generantur, quando putredo dominatur, & effectus funestus est futurus. Inde enim, non certe improbabiliter, arguitur, alcalinæ naturæ in sanguine victoriam id omne acidum

*p\*\** *Lind fevers and infect.*  
p. 244.

*q* *Idem ibid.* p. 589.

*r* *Zarinus de miss. sanguin.*

*s* *Alprunner in Zodiac. Med.*

*Gall. T. II.* p. 104. & apud

*Vaterum de pestilent.* p. 30.

*s\** *Werlhof variol. morbill.*

p. 540. *Storch IV jahrg.* p. 636.

*t* *De Haen verhand. van de*  
*rundveeziekte* p. 8. & cito  
deflagrat *Ens morb. osterod.*

p. 87.

*t\** In febre maligna *Lepecqus*

p. 415.

*v* *Art de faire les rapports*

p. 336.

*x* *Pringle* p. 211.

delere, quod urinofam naturam temperabat, falesque sanguinis ammoniacis fimiles reddebat. Adparere vero fales medios, quando victa putredine natus acor rediit, & cum alcalino elemento in medium falem restituitur. Ob avolans putridum fætidissimi sudores in febribus salutares sunt, ut vulgo notum est  $x^*$ , & in peste  $x^\dagger$ .

Sed & aliæ causæ, hætenus febribus adfines, similes in sanguine & humoribus corruptiones producunt. Ipse victus mere carneus  $y$ , febrem facit, ut sanguis putrescat. Idem in fame fit  $z$ , cujus effectus subitasque humorum putredines, alias exponemus. Abusus salium volatilium, quos juvenis majori copia adfueverat esitare, hæmorrhagias de intestinis, naribus, gingivis, pruritum intolerabilem, febrem hæcticam  $a$  mortemque intulit, novo argumento, quam cognata feбри alcalina natura lit.

Calor nimius aeris, non quidem adeo subitam  $b$  putredinem infert, ut animal vivum tabescat, fæteatve; id tamen efficit, ut celerime  $c$  carnes corrumpantur, uti vicissim glacies putredinem moratur; & cadavera occisorum,

$x^*$  *Razoux Nosol* p. 220.

$x^\dagger$  *Hodges*.

$y$  *Huxham of the malignant sore throat* p. 62.

$z$  *Idem* *ibid.* p. 62, 63.

$a$  *Idem* *ibid.* p. 68.

$b$  Nam sanguis non fætuat

in calore 109 & 110. graduum Fahrenheiti *Dunze* exp. 4. 6.

$c$  *Idem* exp. 1. 2. ut etiam aer altero die per cellulosa intervalla effunderetur.



quos nives obruerant , totis sex mensibus incorrupta supersunt , quoad æstatis redivivus tepor putredinem accersat *c*\*. Idem venti illi ardentes orientis efficiunt *d*. Mercurii vis per vasa corporis humani sanguinem resolutum ita agitatur , ut fætidissima inde animæ corruptio nascatur *e* , & urinæ *f* , & sudoris , utque sanguis ipse fæteat *g* , unaque febris oriatur non exigua *h* , & , ex peritorum certe virorum fide , hac quidem ex causa vera alcalina degeneratio in humoribus locum habeat , salivaque sirupum violarum colore tingat viridi *i* , & cum acidis ferveat. Sed etiam animalium venenatorum morsus subitam putredinem , & humorum eliquationem , excitant *k* , & carnes , perinde ut ab igneo illo vento , ab eo veneno flaccescunt.

Nihil autem potentius humores nostros corrumpit , quam ipsa putrilago *k*\* , utcunque in corpus recepta , cibus putridus , animalium lue peremtorum esus.

Vapores cadaverum fætidii & caerneteriorum ,

*c*\* Mesny l. c.

*d* Continuo putrescunt , quos ventus Samiel percussit , ut membra tracta manum sequantur Chardin voy. en Perse T. IV. p. 22. Thevenot voyag. T. III. L. I. c. 10. T. II. L. I. c. 12.

*e* Grainger de ptyalismo p. 21. 22 &c.

*f* Ammoniaco odore in calida

Carolina Chalmers I. p. 112.

*g* Idem.

*h* Pulsuum 120. 130. Idem.

*i* Baron in notis ad Lemery cours de chymie. p. 190.

*k* A serpente caudifono Feuillee Journal , a sepe Hasselquist p. 596.

*k*\* Hofman. Pocken l. Einleitung.

& acervi putrescentis brassicæ , & muscorum margaritiferorum tabescentes cumuli pestíferas fibras excitant.

Similia patrat aer prægnans exhalationibus hominum copiosioribus , qua sola ex causa aliquoties in Anglia , & non ita dudum , iudicum aliorumque adstantium frequentes mortes acciderunt. In ergastulo , in quod crudelitas principis indici numerosos anglos stipaverat , plerique intra paucas horas perierunt. Vapor carcerum ex tubo propius receptus ac haustus perniciosissimas febres civit ; & par est veneni potestas , quod vapores spirant \* aquæ in sentina corruptæ. Chirurghi , qui carbunculos bubonesque pestilentes curant ; medici , qui perspirationem morientium inspirant , frequentissimas patiuntur ex simili morbo mortes. Nili aqua , cadaveribus repleti , pestilentem morbum genuit , qui Ludovici IX exercitum destruxit. Injecta in animalis venas aqua putrida cito funesta fit. Putrida avis carne *Tungusi* & *Baratti* sagittas suas inficiunt ; iis leviter læsa animalia pereunt , & celerrime & ipsa putrescunt.

Effectus putredinis variis modis admissæ potissimum sunt summa virium & irritabilis naturæ destructio , cum simili suæ causæ in humoribus nostris putredine conjuncta.

Sola cadaverum nimia consuetudo multos incisores ante diem abstulit. Memini *Albinum*

\* *Rutty* p. 148.

\*\* *Pringle of the jail fever.*  
Ab aere nosocomiorum *Belloste*  
*Chir. de l'hosp.* p. 67. Ab aere

ventilatoris qui carcerem repurgabat *Pringle Phil. Trans.*  
n. 48.



gravissima febre erysipelacea infectum a Boerhaavio fato fuisse ereptum : Memini proprii morbi miliaris, & innumerabilium fere febrium continuarum, quas Gottingæ passus sum, cum inter cadavera sex fere in annum mensibus viverem.

Sed etiam alii, chronici magis ingenii morbi, ingentem humorum acrimoniam conjunctam habent. Scorbutus lentius equidem, sed magis quam ipsæ febres, sanguinem eliquat *k*\*, ut de gingivis, de intestinis *l*, de cute, cum intolerabili fætoe diffluat. Lympha enim scorbutica adeo acris est, ut in ventrem effusa chirurgorum digitos excoriet *m*, & lintea corrodat *n*; & tanta in ejusmodi malis in sanguinem etiam viventium ægrotorum tabi vis transiit, ut hiru- dines eum cruorem respuant *o*, ac maculæ a san- guine in linteo natæ profundius sedeant, neque possint elui *p*. Ab eodem morbo major urinosi salis portio de sanguine destillat *p*\*. Ha- litu phthisicorum muscæ interemtæ fuerunt, ut etiam cognomen memoriæ regis Abdelmelik, ex Muhavidarum gente, ab ea animæ virulentia inhæserit. Rachiticæ puellæ fætidissima anima aviculam occidit *q*.

*k*\* Medical, Transact, II.

*l* Lind of scurvy p. 167.

Boerhaave Introd. in praxim, clinicam p. 5.

*m* Memoir. de l'Acad. des scienc. 1699. p. 176.

*n* Craanen, Meno Matthiæ obs. XI. J. B. Fanton obs. 36.

*o* Lister de scorbuto I. Mem. de l'Acad. l. c. p. 173. Panarolus Pentecost. IV. obs. 7. la Met-

trie obs. de medec. prat. p. 50. Huxham c. 5. &c.

*p* Smalts apud Craanen de homine p. 311.

*p*\* Colebatch Essay concerning acid. and alcal.

*q* J. Petr. Buchner in diss. de rachitide, quam in collec- tione mea practica recusam dedi.

Similis utique etiam in reliquis humoribus corruptio nascitur. Urina retenta, calidique corporis tepore fota, adeo acris redditur, ut catheteris argentum fusco colore vitiet, & fætore suo in chirurgo leviozem peripneumoniam excitaverit *r*, cumque acidis liquoribus efferbuerit *s*. Etiam in urina scorbuticorum verum sincerumque alcali fuisse legitur *t*, etsi negabat se vidiſſe, quinto funestæ ischuriæ die *Boerhaavius v*. Ita in aqua hydropica, facta paracentesi educta, vestigia lixiviosæ indolis apparuerunt *x*, ut ab ejus percepto fætore morbus convulsivus maligni ingenii sequeretur *y*, inque hydatidum simili fero, quod oculis receptum dolorem excitavit *z*. Adeo magna etiam innocui alias de naribus mucii acrimonia fuit, ut labia continuo excoriaret *a*, tum lacrumæ, in epiphora *a\**. Acrimonia aquæ forti hætenus comparabilis in glandulis siphilitici cadaveris gustu percepta est *a\*\**. Lac in febre alcalescit *a\*\*\**, & sudor cum aceto efferbuit †.

His omnibus, quos citavi, humoribus, violentius venenum est ichoris, qui de cancroſa

*r* Ger. v. *Swieten Comment*, T. I. p. 131. *Hofman pocken I.*

*s* *Schaper de massæ sang. cor-  
pusculis* p. 31.

*t* *Borrich. hermet. ægypt. sapient.* p. 351.

*v* *Elem. Chem. T. II.* p. 306. *Prax. Med.* VI. p. 140.

*x* *Pinelli de podagra* p. 187. *Pitcarne de opera quam præstant  
acida & alcalina* p. 157.

*y* *Philos. Transact.* n. 454.

*z* *Heuermann physiolog.* T. I. p. 202. conf. *Birch l. c.* T. IV. p. 377.

*a* *Meibom. de ulcerib.* n. 33.

*a\** *El. de Villars cours de  
Chirurg.* T. II. p. 233.

*a\*\** *Masson de carie ossium. Manuel antisiphyl.* p. 705. Similia habet *Cl. Hofman pocken* p. 269.

*a\*\*\** *Raulin obs. de Medec.* p. 182.

† *Barthol. Cent. IV. hist.* 59.



mamma fudat. Ab ejus temeraria gustatione teterrimus fætor chirurgi indivisus comes adhæsit, ad mortem usque, quæ ex hoc ipso contagio secuta est *b*. Odor solus cancri mammam uxoris erodentis perinde ad mortem usque constans, *Franciscum Bellinger*, non incelebrem scriptorem, interemit *c*. Sed ea sanies de alcalino ingenio est, viridique colore sirupum violarum tingit *d*, ut non probabile sit, cum cancrorum, quos vocant, oculis efferbuisse *e*.

§. XXXV. *Aer expeditur.*

Una cum fætoze putredo se demonstrat. Nemo putredinem accuratius descripsit celebri illo olim, & una paradoxologo viro, *Joachinio Beccher f*, qui die quinto fætozem vehementer increfcere, die duodecimo stercoreum fieri, die trigesimo situm sive mucorem efflorescere, inde cutem & carnes in foramina collabi, vermesque irrepere, animosus observator refert. Ad usus nostros interim aliqua adspargemus. Putredo omnia vincula partium animalium rumpit, humores alioquin coagulabiles, cruorem, lympham, ovi albumen, amnii liquamen, in acre & nullo porro veneno coagulabile tabum resolvit, adi-

*b Harris dissert. med. Chir.*  
p. 168

*c Ibid. p. 169. A cadaveris fætoze similem funestum acutum morbum, cum perpetua fætidissimi odoris præsentia*

natum habet *Kirkpatrick de analys. inoculat. variol. p. 12.*

*d Memoir. de Chirurg. T. I.*

*e Schaaſchmid relation T. II. p. 320.*

*f Physic. subterr. p. 148.*

pem colliquat, carnes g membranasque & fibras emollit primo; inde in mucum diluit. Omnes humores animales a putredine in detestabile venenum abeunt, ut in ovo *Bellinus h*, expertus est, & de boum morbo extinctorum tabo refert *Griffith Hughes i*. Hæc eo tempore vera erant, nam post ea Cl. *Cigna*, *Navier*, *Crellius* aliique magis chemice de putredine scripserunt *i\**.

Princeps vero phænomenon putredinis, neque hactenus adultæ *k* est, expedire aerem, qui de animalibus inflammabilis prodit \*, idemque iterum resorbetur \*\*. Is aer, cum avolante phlogisto inebriatus sit, flammam concipit \*\*\*, & cum ardeat, aufert alcali volatile \*\*\*\*, quoad perfecto stadio ultimo putredinis nullum superfit. Ut enim a putredine generatur, ita ardendo minuitur, & denique, postquam ad acmen pervenit, consumptum inertem massam relinquit. Hæc causa est, cur in amplis vasis apertis alcali minus generetur, in vasis angusti colli magis, hic enim vapor fætidus lentius avolat. In hominis & animalium carnibus, fætibusque integris, sæpe vidi *l*, sub aqua mersos mansisse, donec integræ erant, cum subnato fætore verò undique de tota cute aerem effloruisse, quibus quasi vesicis sublevatæ carnes ad summam aquæ superficiem adscenderent. Sæpe mihi æstivo tempore in

g *Navier sur l'amoliss. des os p. 34. seqq. Priestley sortes d'air p. 106. 107. Wiegleb gäbrung p. 130.*  
*h Pringle p. 421.*  
*i Natural history of barbados p. 63.*  
*i\* Boissieux, egregia femina*  
 de T.  
*k Pringle p. 426.*  
 \* *Priestley ib.*  
 \*\* *Idem.*  
 \*\*\* *Priestley, Pearson.*  
 \*\*\*\* *Wiegleb. l. c. p. 128.*  
*l Memoire sur la respirat. Exp. 132.*



corde aer cum spuma intritus visus est *m*. In vivo homine, sed putrescentibus humoribus infecto, in pessimo scorbuto *n*, in gangræna, similis omnino aer generatur, qui late sub cute regnat, & emphysema refert, & in morbis putridis eam evolutionem locum habere, etiam intra ipsa vasa, nuper ostensum est *n*<sup>\*</sup>. Quare & in cadavere prius secedit, quam signa aliqua putredinis se efferant. Eum aerem & sanguis generat, & serum *o*, & adeps *p*, & ipsæ demum solidissimæ corporis animales *q* partes. Sanguinem Cl. *Favelet* *r* cominus observavit, qui de incisa vena in vitrum exceptus, octava jam hora turgere incepit, diffluere, vaporem acrem spargere, & urinosum, idemque vitrum denique displosus fregit *s*. Ex osse putrescente fætidissimam spumam cum sonitu erupisse, alius testis exstat *t*, & cerebrum intra cranium in putrilaginem abiisse.

### §. XXXVI. Adjumenta putredinis.

Porro sanguis, dum putrescit & ipse fætet detestabili odore, potissimum si per angustum tubulum

*m* Pringle p. 427.

*n* Frænk. anmerk. T. III. p.

417. Copiosissimum, ex uno sanguinis pollice ad pollices 33. *Hales vegetable statics* c. VI. exp. 49.

*n*<sup>\*</sup> *Obss. and Enquir.* T. III.

*o* *Apparat. ad hist. sang.* p. 70.

*p* Pariter multum *Idem* ib.

*q* *Hales* ibid. conf. cum hæmastat. p. 178.

*r* *De ferment. ventric.* p. III.

*s* *Boyle* p. 88. *Kruger physiol.* n. 53. Die septimo sanguis putrescit *Rutty synopsis*.

p. 304.

*t* *Mich. Bernb. Valentin*

*diff. Epist.* III. p. 151.

ex spiraverit , & alcalescit , ut omnino cum acore ferveat *t*\*.

Plerumque tamen , aeris atmosphærici liber commeatus ad putredinem requiritur , & in clauso vulnere sanguis in polypum abit , neque in universum putrescit , si aeris accessum abstuleris *v*. In ipso etiam utero fetus extinctus integer , & valde utique putrescibilis placenta , absque putredine per menses annosque circumgeruntur *x*, dum clausus uterus aerem non admiserit. Sed humor modicus putredinem adjuvat , multa & sæpe renovata aqua retardat.

Multum vero putredo adjuvatur , si sanguini , aut bili , aut cuicunque humori , putredini destinato , salem lixiviosum fixum , aut certe terram acido oppositam addideris. Cancrorum oculi *y*, & magnesia & bolus \* , & felenites , & demum ipsi sales medii , in quibus alcali minerale cum acore conjungitur , ut sal mirabile *Glauberi* \*\* & sal sodæ *z* , sanguinis & carnis putredinem promovent. Iidem bili admisti & factiorem putredinem faciunt , & velociorem *a*; eundemque effectum ipsa terra praestat *b*. Sal fixus putredinem adjuvat *b*\* & tartari , aut clavellatus cinis , sanguini

*t*\* Roederer de bile.

*v* Conf. Drelincourt apud Manget bibliothec. anatom. T. II. p. 956. Abraham Cyprian epist. ad Millington p. 55. 56.

*x* Quesnai æcon. anim. T. II. p. 121.

*y* Pringle append. p. 394. 414. Υπερ l. c.

\* Υπερ.

\*\* Id.

*z* Id.

*a* Gilbert de putredine in corp. anim. p. 18.

*b* Idem & Cl. Pringle.

*b*\* Pinelli l. c. p. 160. Mireris ergo legi , putredinem a sale tartari adjecto inhiberi Ratty l. c.



sanguini nuper de vena misso admixtus, odorem urinosum cogit ascendere *c*, & cum sudore idem praestat *d*. Hoc quidem argumento ostenditur, magnam salis sanguinis cum ammoniaci sale adfinitatem intercedere, nam & iste sal adjecto sale fixo urinosum odorem exhalat. Sed in vivente etiam homine lixivi sales, qui Stephaniano medicamento efficaciam praestant, longo usu sanguinem alcalinum, acrem, scorbuticum, hecticumque *e* reddiderunt, ut etiam vesicas de cute elaveverit *f*. Hinc a saponis usu & a lotione linteorum, proxima pestis erumpit *g*, & in vico linteiorum Constantinopoli primum amat saevire *h*.

Haec nostro aevo labefactantur, ut passim legas, & experimenta producantur, quae fidem faciant, aquam calcis putredinem tardare: sed etiam sales lixiviosos fixos eadem esse potestate, quae utique cum prioribus conciliare nescio. Volatiles alcalinos sales equidem lego putredinem potius morari *i* & impedire: Sic sales vegetabiles *i*\*, mites etiam ut saccharum, succus limonum, & magis adhuc acidi *k*, de

*c* Hummel de arthritide.  
*d* *Commerc. Lit. Noric.* 1739. hehd. 4. *Model vom persischen salze.* & in edit. oper. gall. II. p. 226.

*e* *Huxham of fevers* p. 48. 49.  
*f* *Parsons of the bladder* p. 125.

*g* *Diemerbroeck*: & similia habet H. de *Heyden synops. disc.* p. 149.

*h* *Gemelli Carreri voyag.* T. I. p. 321.

*i* *Pringle, Ritty l. c. Gilbert* p. 13. 14. Siccam idem sal albamque carnem reddit.

*i*\* *Mesny &c.*

*k* Succus limonum putredinem sanguis ad diem 23 distulit *Ritty l. c.* Lac adjectum etiam putridum sanguinem acore suo subigit *Pringle* p. 406. Etiam urinam aliquamdiu, & diutius quam alcalini sales a putredine servant *Haen* p. 79.

fossilibus *k\** parati liquores , ipsum demum vitrioli oleum. Id enim in aeternum omnem putredinem a carne & avertit, & si incepta fuerit , abigit redditque carni suam integritatem. Aer factitius , qui fere acidum subtile est , de solutis corporibus exhalans , putredinem inhibet & emendat *l*. Hoc etiam potissimum argumento ductus in noxia putredine febrium malignarum summo cum fructu acoris vitriolici vires expertus sum. Porro plantae nonnullae , aromaticae potissimum , putredini obfistunt, ut chamaelum, valerianae radix *l\** , potenter & quam cortex peruvianus fortius , & arnicae pariter *l\*\** , potens radix : & camphora : sed etiam cortex peruvianus , qui adstringens sit, est inter meliora antiseptica , tamen ut acori minerali cedat *l\*\*\** , Princeps etiam inflammabilium alcohol putredinem avertit, minus tamen quam acor vitrioli. Aqua mineralis *l\*\*\*\** Newholtenensis putredinem penitus impedivit. Debiles sales medii *l\*\*\*\*\** , muria marina , sal ammoniacalis multa aqua dissolutus , corruptionem potius augent. Majori copia impediunt, & melius nitrum.

§. XXXVII. *Animalia quibus humores lixiviosae indoli propiores sunt.*

Alia animalia humores universos acres , &

*k\** Mesny &c.

*l* Mesny.

*l\** Dresky de valer.

*l\*\** Collin de arnica.

*l\*\*\** Darconville sur la putref.

Collin.

*l\*\*\*\** Rutty l. c.

*l\*\*\*\*\** Gilbert p. 14. Ad diem 8 nitrum, ad duodecimum sal marinus Rutty.



eorum nonnulla pene manifesto lixiviosos habent, insecta maxime, deinde serpentum genus, denique carnivoræ ferociores bestię. Lac salamandræ intolerabiliter acre est *m*. Lacerta Gecko, si nudam hominis cutem perambulaverit, viæ suæ vestigia, ruborem, calorem, pustulasque relinquit *n*. Bufonis flammei de posterioribus cruribus emissus viscor catarrhum in iis excitavit, qui vivum animal dissecuerunt, inque oculis dolorem *o*. Liquor de apīs vesicula linguam acrimonia sua vehementer percellit *p*, ad pyrethri modum, inque vulnusculum dimissus, eundem, quem ictu, dolorem producit *q*. In sepia, gelatinoso animale, succus acris & igneus. Tigridis urina odore est cantharidum *r*. Omnibus fere crucis vis adurens inest, quæ vesicas excitat *r*\*. Scorpīi venenum acre est. Muscæ ichneumones suo liquore sabulum in pastam resolvunt.

Sed in aliis exemplis natura lixiviosa manifestior est. Millepedum genus urinoso salis ammoniaci odore *Listerus* designavit *s*. Jus can-

---

*m* Arnauld de Nobleville servir à l'histoire des insectes  
 histoir. natur. des animaux. T. VII. p. 352. Palteau traité  
 T. II. P. 2. p. 204. des ruches de bois.

*n* Hasselquist resa til palæ- *r* Hist. de l'Acad. Roy. des  
 stina p. 308. scienc. 1747. p. 78.

*o* J. Aug. Roesel de Rosenhof *r*\* Piso histor. natur. Ind.  
 in eximia historia ranarum L. V. p. 281.  
 indigenarum p. 100. *s* De humorib. p. 71. edit.

*p* Schrader de armatur. anim. belg. Cum nitro tamen eum  
 brutor. potius salem comparat J. F.

*q* Reaumur memoir. pour Henkel de cataracta p. 22.

crorum non cogitur, & violaceum sæpe sirupum viridi colore vitiat *t*. Bombycum celerima & fætidissima est putredo *v*, & sericum plurimum inter omnes animantium partes, aut humores, falem volatilem gignit *x*. Liquor vesicularum bombycis cum acore vivide fervet *x*\*. Sed etiam viperæ copia salis volatilis excellunt, & in ranis denique secundum vertebrae albus pollen sedet *y*, qua nervi prodeunt, qui cum acidis salibus effervescent. Cantharidum etiam in pulverem redactarum totam naturam cum aceto fervere legeram, sed expertus falsum reperi; cum spiritu nitri utique fervent *z*. De vipera equidem locus existat *Richardi Mead* a celeberrimi medici, quo dicitur, succum heliotropii ab eo veneno admisto rubro colore tinctum esse, & linguam inflammasse. Verum aliquis in eo experimento ab impuro vase aliove casu error obrepisse videtur, cum & chemica analysis repugnet, & vipera de carnivororum animalium genere sit, & denique hujus succi natura venenata multo subtilior est, cum in lingua insipidus videatur; ut omnino non acrimonia sua nocere videatur, sed vi stupefaciente, quæ irritabilem vim partium corporis humani destruit *a*\*. Cantharides succo plantarum vivunt, earumque

*t* Comment. Acad. Bonon. T. II. P. I. p. 96. seqq.

*v* Boerhaave prax. med. T. I. p. 175. & nuper a Pimbiolo.

*x* Neumann Chem. T. III. p. 768.

*x*\* Comment. Acad. Bonon. T. V. P. I. p. 44.

*y* Apud Jacobæum de ranis p. 47.

*z* Grew l. c. p. 249.

*a* De venen p. 8. V. adde Planque biblioth. de medec.

T. III. p. 204.

*a*\* Fontana de viper.



acrimoniam pariter ad acidam classem vir insignis *b* reduxit, vesparumque *c*. Sed experimentum effervescentis acidi liquoris nimis simplex est, eorumque animalium liquor acerrimus, & empyreumaticus, non ideo tamen acidus est, etsi sale volatili hoc quidem animal minus abundant *d*. Fæces columbinæ odore suo oculos humectat, & sale albo penetrabilis odoris *d*\* teguntur.

§. XXXVIII. *An nullus in animalibus acor supersit.*

Hæc per experimenta, exque iis, quæ ignis de humoribus animalium elicit elementis, factum est, ut omnino solos in animalibus urinosos sales dominari, neque acidi quidquam reperiri, contra priorum medicorum opinionem passim scriptum sit *e*. Addiderunt aliqui, ne eos quidem homines acidum in sanguine elementum habere, qui solis acidis, pane, limonum succo & olivarum oleo in Liguriæ montanis victitant *f*.

Non tamen finit experimentorum fides hæc pro veris recipi, aut acorem penitus de natura animali eliminari. Insecta quidem bene multa

*b* Cartheuser *mater. med.* p. 429. *Hofmann de sal. mor-*  
433. *Adde Hombergium l. c.* *bosor. generat.* p. 19. *Jones de*  
p. 272. *febris intermitten.* p. 42.

*c* *Neumann l. c.* p. 55. Sed *Colebatch doctrin. of acids fur-*  
obiter omnino. *ther asserted.* p. 448. *Pinelli de*

*d* *Hill. mater. med.* p. 823. *podagra* p. 77. *seqq.* *H. Boer-*

*d*\* *Massac engrais* p. 14. *haave Elem. Chem. T. II.* p. 310.

*e* *Fridericus Slare* apud *f* *Pinelli l. c.* p. 73.  
*Birch* loco sæpius citato T. IV.

plurimum de natura acida conservant , quæ de vegetabili utique cibo aluntur. Sapor acidus penetrans , vis chartam cæruleam & cichorium tingens , & acor denique lac coagulaturus , reperitur in liquore , quem de vesica prope oesophagum posita eruca saligna cauda bifurca projicit *g*. Formicarum saliva , aut succus certe , quem cum morfu effundunt , ex veteri experimento *h* cichorei cæruleos flores rubro colore vitiat. Eædem destillatæ copiosissimum acidum liquorem suppeditant , ad undecim omnino ex sesquilibra uncias *i*. Sed eum quidem acorem ad male superatam naturam acidam vegetabilem refero ; nam formicarum quidem nymphæ , quæ nondum plantarum succos gustarunt , acidum non præstant *k* , formicæ exclusæ utique & copiosum , & manifestum *l* solæ inter animalia *l*\* chemicum super ignem fundunt : acetosus est , neque ad mineralem acorem pertinet *m*. Aqua cum muscis vulgaribus digesta manifesto acida est. Eo etiam retulerim , si firma sunt , quæ de apum , & vesparum , & cantharidum

*g* In egregiæ collegæ nostri Caroli Bonnet *memoir. des savans Etrangers* T. II.

*h* *Tragus* auctor experimenti est : deinde *Rai philos. trans.* n. 68. *Hornberg* T. III. p. 45. *Hahn de salibus med.* 1712. p. 272. *Neumann oper. chemicor.* Ed. nov. *Svænka wetensk acad. handlingar* 1741. p. 39.

*i* *Neumann* l. c. p. 45. 55.

57. 58. Habet eum spiritum *Hiarne Tentamen* II. p. 44. & *Gleditsch Mem. de l'Acad. de Berlin* 1749. & *Raius* l. c.

*k* *Neumann* *ibid.* p. 55.

*l* *Idem* *ibid.* p. 54.

*l*\* *Idem* *ibid.*

*m* *Gleditsch* l. c. *Ray* l. c. rubro colore flores borraginis tingit. Cum alcali fixo in crystallos abit *Gleditsch* l. c.



acida indole passim legimus *n*. Sed in cantharidibus accuratior Chemia lixiviosa omnia, præter terram mortuam, & eorum cum acidis fervorem confirmat *n*\*. Nullum in progressu putredinis acorem generari *Georgius Pearson n\*\**.

Utcunque ista sint, in humoribus nonnullis, juniorum potissimum animalium, manifestus acor reperitur, in adipe etiam evidentior. Jus & gelu de carne vituli, sibi relicta acent *o*. A butyro rancido æs eroditur *p* & virescit, ut ab acidis liquoribus solet. Succus folliculi dentium, & succus viscidis ex nervis boum, chartam cæruleam rubro colore tingit *p*\*. Caro vitulina cum pane & saliva contrita incipit vinosum spargere odorem, neque putrefit nisi quarto die *p\*\**. Lac cum putrido animalium sanguine mistum, tamen acidum liquorem generat, neque acor a putredine vincitur *q*. In pure acida indoles residet *r*, sed id fere ex adipe fit *s*. Ovillabilis fermentationem potius auget *t*. Puerorum exhalatio sæpe acet, & crustæ lactæ acidæ sunt indolis *v*. Denique non semper, sæpe tamen inque omnibus *Cl. Collini* experimentis

*n* p. 64. not. 2. *Cartheuser mat. med.* p. 433.

*n*\* *Phil. Transf.* n. 252.

*n\*\** De putredine *Edin.* 1774.

*o* *Memoir. de l'Acad. de Chirurg.* T. I. P. II. p. 70. ed.

12. *Senac Essais de physique*

p. 552. edit. 1735. *traité du*

*cœur* T. II. p. 98. *Lorry des*

*alimens* T. I. p. 353.

*p* *Quesnai æcon. anim.* T. II.

p. 134.

*p*\* *Jourdain* p. 112.

*p\*\** *Mesny* apud *Targioni*

p. 115.

*q* *Pringle* append. p. 401.

*r* *Quesnai* edit. I. p. 169.

195. 247.

*s* *Hist. de l'Acad.* 1759.

*t* *Pringle* append. p. 413.

*v* *Pechlin observ.* p. 332.

in principiis putredinis aliqua, non duratura, signa acidæ degenerationis se offerunt, ut præcedat acor, aliquandiu cum putredine partitas vices teneat, & ab ea denique superetur x. Memini Leidæ, cum paucis cadaveribus avare uteremur, musculos viscorem concepisse cum acido manifesto odore. Solet autem acor, qui putredinem præcedit, ingratus esse, & id habere a vero acore diversum, qui grato est odore & sapore; videtur enim in animali putrescente rancor corrupti olei se cum evoluto acido conjungere. Caro cruda, cum pane & aqua in pulvem tusa, leni calore digesta, post biduum fermenti modo æstuat, acidumque saporem manifestum edit, etiam post initia putredinis y. Putrida triduana saliva z, cum pane, & pisce a fermentat, & acor putredinem superat.

Denique fortissimi acoris exemplum Cl. *Cadet* habet, cum liquor putrescentis in plumbeo sarcophago cadaveris plumbum eroserit, & cum eo in saturni sacharum abierit b. Ea observatio posset forte efficere, ut *Cezanio* crederem c, qui venereum tabum acidum facit, ut violaceos succos rubefaciat.

Acidum oluit ejus feminæ sudor, quam ossa emollita celebrem reddiderunt d, & vapor abdominalis e in alio exemplo, cum ossa emollita

x *Collins arnica.*

y *Pringle* ibid. p. 396. 397.  
398. conf. quæ de lacte diximus.

z *Pringle* append. p. 401.

a *Idem* ibid. p. 402.

b In N. E. N. C. vol. IV.

c *Manuel antisypbil.* p. 205.

d *Navier sur l'amolissement des os*, p. 62.

e *Zeller de stricturn. glandul. præt. nat.*



essent. Cerebro panem fermentari alius auctor est *f*. Cor humanum diutius conservatum acidum spirat, & illustris ejus eventus testis exstat *g*. Etiam putrida caro bubula spiritum subacidum dedit *h*, ut alias analyses omittamus, in quibus chemia acidum liquorem ex sanguine obtinuit.

Non ideo penitus inter elementa sanguinis perpetua acidum reciperem, ut quidem clari viri receperunt *i*: id tamen hactenus credo ostensum esse, in animalium humoribus latere acorem, qui perinde ut putredo, in cadavere manifestius se exferit, etsi utique neque perinde constans est, ut alcalina degeneratio, & demum, ipsa diuturniori evolutione sua, in putredinem totus evanescat *k*. Sed neque negaverim, aliquando acidam intemperiem in corpore humano nasci posse *l*. Acorem autem adulta putredo destruit; sanguis putridus ossa non solvit *l*\*.

### §. XXXIX. Odores animales.

*Theophrastus* negaverat, ullum boni odoris animal dari, & certum est, odores omnium partium, quæ ex animalibus prodeunt, nobis plerumque ingratos videri, quoad multa aeris

*f* *Traité des ferments admirables.*

*g* *Senac traité du cœur* T. II. p. III.

*h* *Navier* l. c. p. 34. seqq.

*i* *Raymundus Vieussens traité des liqueurs* P. II. c. 2. & in *Journal de Trevoux* 1709. M, Novemb. *Franciscus Ques-*

*nai*, qui in eo acido naturam melancholiæ ponit æcon. anim.

T. III. p. 53.

*k* *Mem. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 128.

*l* *Kruger patholog.* p. 210. *Ludwig* l. c.

*l*\* *Pringle Ess. phys. and litter.* III. p. 253.

difflatio partem eorum elementorum dissipaverit, quæ odorem excitant. Ipse moschus *m*, & zibethum, & marsupialis *n* animalis odoratus succus, dum recens est, integrisque viribus, fætet, neque ferri potest: vetustior idem, fracta olfactilium particularum violentia, grate nos adficit. Eodem modo & putrefacta bilis *o*, & stercus etiam humanum, & animale oleum *p*, diminuta vehementia, odorem acceptum adquirent, & fætidum didelphidis unguentum. Vulgo etiam bubulum stercus in agros lætaminis loco sparsum sub brumam, mense decembri, sereno sub cœlo, gratum moschi odorem spargit. Urina siccata cum odore grato vehemente igne salem dat ammoniacum, & paulo post phosphorum *p*\*. Huc etiam upupæ moschatum odorem refero, quæ ex stercore humano infecta quæritat, & cujus caro inedulis est ob moschi fortem odorem. *q* Inter quadrupeda calidi sanguinis, avesque *r* & pisces rarum est speciem reperire *s*, quæ suo non plerumque pecu-

*m* Chardin Itin. T. IV. p. 46.

*n* Tyson anatomy of the Opussum p. 16.

*o* Aston of quiklime p. 35.

*p* In disp. me præside Gottingæ a. 1747. proposita. Ex miscela gummi sagapeni, galbani opopanacis aliisque digestis, odor moschi natus est. Mem. de l'Acad. 1706. p. 6.

*p*\* Machy Inst. Chym. T. I.

*q* Salerne ad Rai ornitholog. p. 121.

*r* Gallinæ tamen species moschi & odore Oviedo summar. c. 11. Insecto theolog. II. p. 110. Cardan. variet. p. 169.

*s* Et si de pardali Ælianus habet L. V. c. 40. de leonis proprio succo, qui in aliis quadrupedibus fæteat Tyson ap. Lewthers abridgm. II. p. 283. Simia molchum olens Carli relat. d'un voyage. Fuerit simia Mandril Buffon vol. XIV.



liari odore displiceat. Frigida animalia aliqua moschi sunt odore *t* sic crecodilus , qui suo moschi odore late aquas imprægnat *t*\*. Insecta etiam aliqua grato sunt odore ut capricornus *v* : alia scarabæi species *x* meloe violae odore *y* : formicae aliquae *z*, insectum in hyoscyamo habitans *z*\*. Sed haec in olfactus historia ornatiùs persequemur. Liceat interim de nonnullis peculiaribus & efficacibus odoribus aliqua praelibare, qui de animalibus spirant , deque homine. Bufones serpentesque, quando irascuntur, alliacum alii , alii ambrosiacum odorem spargunt ; neque forte alia vis est, quae vipera caudifona bestiolas incantat , quae propius ad eam accesserunt.

Deinde etiam in homine moschatus odor nonnunquam percipitur : non raro in me ipso, cum mediocri & grato sudore leviter maderem, eum percepi, tum in febribus ad crisin compositis.

§. XL. *Sanguinis analysis , quæ igne fit.*

Sequitur , ut eas mutationes exponamus , quae fiunt , quando ignis violentia ad sanguinem humanum accessit , quam chemicam vocant analyfin , & ut ea elementa describamus , in

---

*t* Rochefort antill. p. 242. p. 72. & Koelreuter p. 9.  
 Charlevoix S. Domingue I. p. 27. Castell.  
*t*\* Rochefort ib. *y* Koelreuter insect. coleopter.  
*v* Car. de Geer. V. p. 64. hu- p. 42.  
 jus odor digitis adhæret. *z* Lister.  
*x* Fabricius in entomolog. *z*\* Aromatico odore Birch  
 II, p. 483.

quae sanguis in ea ignis tortura discedit. Non ideo tantum tribuimus huic nimis rapidae, nimis violentae ignis operationi, ut ab ea vera *a* elementa fani sanguinis sincera speremus renasci: aut eos sales, ea olea, eos spiritus, in hominis viventis faniq̃ue cruore esse persuadeamur *b*, quos ignis ex sanguine obtinet. Tunc enim demum ea elementa adparent, quando calor ad 276 *Fahrenheitii* gradus adscendit, quo certe in aestu nullum animal vitale superest *c*. Nimis tenerae sunt animalis regni & vegetabilis particulae, neque possunt absque ingenti commutatione tantam ignis vim pati *d*. Blandissimum oleum ab ea vi acerrimum fit; ovum, quo nihil mitius est, penetrabilem vehementiam acquirit; acidissimae herbae *e* alcalinos liquores fundunt, & quae alia ejusmodi minus nunc est necesse monere, quam olim necesse fuit. Deinde cer-

*a* Vera elementa rerum per analysin chemicam se ostendere Cl. viri persuasi fuerunt, *Dodartus* olim in *Projet pour servir à l'histoire des plantes* p. 169. deinde *Raymundus Vieussens* *epist. de sanguine* II. p. 153. & l. p. 4. *præf. traité des liqueurs* p. 30. & in opere *des malad. internes* T. I.

*b* Dudum monuit, ne ab ejusmodi analysi vera principia rerum speremus, primus *Robertus Boyle* in *Chymista sceptico*, deinde *Leonardus a Capoa dell' incertezza degli medicamenti* p. 33. inde *Fridericus Stare of sugar* p. 30. *Henkel pyritolog.* p. 389. *Hermannus Boerhaave Elem. Chem.* T. II. p. 288, *Caspar Neumann Chem.*

*oper.* T. I. P. 2. p. 64. *Theod. Baron* ad *Lemery cours de Chymie* p. 3. De plantarum viribus *Mariotte de la veget. des plant.* p. 159. Seorsim de sanguinis analysi utiliter docuerunt, non vera ejus humoris elementa per igni obtineri *Rob. Boyle app. ad hist. sang.* p. 48. *J. M. Lancisius diss. med.* IV. *Georgius Cheyne diseases of body and mind* p. 112. *Herm. Boerhaave Elem. Chem.* T. II. p. 349. 357. *Præl. ad n.* 223. *I. R. M. Thomas Schwenke l. c.* p. 152.

*c* *Boerhaave l. c.* p. 357.

*d* *Henkel l. c.*

*e* *Mem. des savans étrangers* T. II. p. 330.



tum est , sales adeo acres , olea adeo tenacia , spiritus adeo fervidos , terram tam gravem immeabilemque , his artibus obtineri , quales quidem aut liquores , aut terras , cum vitæ integritate consistere posse , ne suspicio quidem locum habere debeat. Multo minus speramus , eam esse in sanguinis libra mutuam horum elementorum inter se ipsa rationem , quæ inter liquores est , qui ignis vehementia ex ea sanguinis libra eliciuntur , ut tantumdem in vivi hominis sanguinis libra aquae , spiritus , olei , salis sit , quantum quidem ex ea libra aquae , spiritus , olei , salisve super ignem destillat. Nimia hæc spes est *f* , & a facillimis experimentis refutatur. Commisti enim inter se liquores , quos ignis ex sanguine separavit , non blandum illum temperatumque cruorem , sed rancidum , & acre , & diversissimum magma reddunt , in quo ne unicus quidem sanguinis globulus suæ naturæ restituitur.

Deinde etiam in ea spe non oportet nimis esse laetos , ex analysi sanguinis temperamenta hominum diversamque indolem nos detecturos. Inter ducentos rusticos , quorum sanguinem *Helmontius* *g* igne exploravit , analysis nullum memorabile discrimen invenit : Et notissimum est , etiam inter plantas venenatas , belladonnam , atque brassicam , nullum fere elementa in analysi repraesentatorum discrimen fuisse.

---

*f* A *Vioussenio* concepta , tum, Medici Romani in epistola  
*Journal des sçavans* 1698. n. 5. ad *Raymundum Vioussens*.  
*Epitre* II. p. 147. *traité des* *g* Citatus a D. *Lorry* , *traité*  
*liqueurs* p. 34. &c. Contra eam *des alimens* T. II. p. 50. neque  
*Lancisius* dixit in *diff.* IV. enim nunc ad manus est.

Non ideo analyses sanguinis utilitate sua destituuntur, dum sapienter noverimus spes nostras recidere, neque plura docere, quam a natura discimus. Ostendit ignis, non quidem sales, non pura in sanguine olea, sed pingues tamen in sanguine particulas esse, aliasque ita fabrefactas, ut addita certa ignis vi in urinosos sales transeant. Sed etiam ferri terram ignis deoperit: certiore istam, cum de fossilium rerum genere sit, quarum multae absque magna degeneratione ignis violentiam ferunt.

Deinde ad morborum curationem aliquid tamen praesidi, in analysi est chemica. Ea nos docet febrem aliquam partem ejus effectus producere, quem ignis efficacia generat, salium certe urinosorum evidentia vestigia *b*, olea ambusta & faetida *i*, aquae diminutam portionem. Inde per comparatas prudenter sanguinis de sano homine, & cruoris de febriente aegro sumti analyses constat, febrem ita sanguinem mutare, ut eadem vis ignis, plus salium, plus oleorum de data sanguinis copia educat, quam solebat de sani hominis sanguine educere. Nunc, si & humores febrientium absque igne considerati, & eorum per ignem resolutorum elementa consentiunt, humanos humores in febre ad alcalinam indolem degenerare, minime improbabilis conjectura nascitur, hanc degenerationem ea remedia sibi poscere, quae alioquin salium alca-

---

*b* Acres sales vocat & sulfur. *i* Conf. n. 32. deinde seqq. Cl. *Huxham fore throat.* p. 58. n. 44.



lium evolutionem tardant, aquam, quietem, sales acidos. Ita adgnoskitur quidem ex minori globulorum ad reliquam sanguinis partem ratione, ex tenuitate adeo & decolore pallore, ferri portionem ad reliquum sanguinem, in debilibus aegris, & in chloroticis minui. Nihil hic simplicius videtur, quam ferro isto propinato sanguinis temperiem restituere. Neque clinicorum experientia dissentit.

§, XLI. *Aqua sanguinis.*

Si in analysi aliquas est utilitas, adtendendum ergo est ad phaenomena, quae viri in arte periti nasci viderunt, quando ignis vim ad sanguinis naturam explorandam adhibuerunt. Cavendum vero est, ne putridi sanguinis analysin proponamus, cujus multum diversa a sano sanguine elementa sunt *k*. Primum ergo elementum, quod 110 *Fahrenheitiano* caloris gradu in vase clauso de sanguine adscendit, porroque ad gradum usque 212 pergit *l* adscendere, id *aquam sanguinis* vocamus, phlegma alii. Haec aqua omnino idem est, quem de sanguine fugientem descripsimus *m*, halitus; collecta vero eadem latex est pallidus, fontana & vulgari aqua vix gravior *n*, blandus, odore & sapore

---

*k* Id vitium in experimento T. II. p. 355. T. Schwenne  
*Philippi Verheyen* est, & J. p. 120. 139.  
*Baptistæ Verduc traité de l'usage des parties* p. 367. *m* p. 467.  
*l* *Boerhaave Elem. Chem.* p. 26. Unica millesima gravior  
est *Jurin diss. VIII. p. 106.* *n* *Vieussens tr. des liqueurs*

levissimo tinctus o, in quo minimum terrae p momentum est, parvissimo sale imbutae, & nonnihil etiam ejus elementi, quod ab igne urinosam indolem accipit q. Idem ab admisto vitrioli oleo paulum cogitur r.

Hujus aquae ad sanguinem rubrum portio varia a variis scriptoribus definitur. Noster olim praeceptor tantam fecit, ut septem partes octavas totius sanguinis sola efficeret s, aut drachmas 112 in 128, neque recessit *Thomæ Schwenke* experimentum, cui ex quindecim unciiis sanguinis tredecim intra 24 horas exhalarent a. In 24 semunciis aquae semunces 21 *Heuermann*. Potius major ratio *Homborgii* fuit, qui in 16 libris, sive 256 unciiis, omnino quatuordecim libras, uncias quindecim, aut uncias in universum 239, sive 119½ drachmas in 128 reperit v. Major iterum *Johannis Hill*, qui 120 drachmas sive tot uncias aquae facit, quot sunt sanguinis librae x. In libra 128 drachmarum, drachmas feri 117 noster olim Cl. auditor appendit y. Fere eandem portionem habet *Georgius Erhardus Hamberger*, nempe 74 aquae partes in partibus sanguinis 90, sive

o *Verheyen* L. II. p. 34. *Hofman* *Observ. Chem.* p. 21. *Car. a. Bergen* *aimatoskop* p. 15. 16. *Jurin* l. c.

p *Vieussens* l. c. p. 20. Ad grana nempe duo in phlegmatis libra, ex feri aqua, quam parum crediderim differre.

q *Vieussens* in praef. ad duas Epist. ad 5/4 falis volatilis gra-

na in duodecim aquae unciis.

r *Jurin* l. c.

s l. c.

t l. c. p. 139.

v *Memoir. de l'Acad. des sciences* 1712. p. 13.

x *Mat. Med.* p. 875.

y *Rhades de ferro sang.* p. 7. ex robusto juvene.



sive drachmas  $116\frac{1}{5}$  in 128 drachmis z. Infra hanc rationem est, quam *Browne Langrish*, & quam *Philippus Verheyen*, atque *J. Baptista Verduc* proponunt. Eas enim positis calculis ad drachmas si redegeris, habebit *Cl. Langrish* in 128 drachmis sanguinis drachmas aquae 105 cum semisse a; *Verheyenius b* autem & *Verduc c* quam proxime drachmas 105. *Raymundus Vieussens* ex sex libris sanguinis aquae libram d elicit. In alio experimento de libris undecim & tribus unciiis, aquae habuit libras quinque uncias undecim, quae ratio iterum fere eadem est, non penitus nempe duarum aquae partium ad ficcioris grumi partem unam e. *Robertus Boyle* sex septimas feri reperit, sive in libra drachmas  $102\frac{1}{2}$  f. Qui sequuntur, minorem aquae portionem habent. *Cl. Flutton* vix supra 93 drachmas admittit g: Antiqui academici galli drachmas 88 h: *Job. Colebatch* drachmas 83 i, & *Jacobus Jurin* drachmas 80 k, quæ omnium minima ratio mihi innotuit. Ingens discrimen est, cum ad 118 sanguinis drachmas alii 117 drachmas aquæ, alii non supra 80 habeant. *Gualtherus Needham* ex grumi sanguinis humani

z *Physiolog. med.* p. 7.

a *Modern. practice* p. 80.

b p. 36.

c p. 371. Sed tædet *Verducii* verba repetere, qui sua pondera a *Verheyenio* mutasse videatur.

d *Traité des liqueurs* p. 26.

e *Ibid.* p. 17.

f *Chymist. scept.* P. II.

g Ex centum partibus sanguinis partes aquæ 73. de sang. & *circulat.* p. 7.

h *Memoires de l'Acad. avant* 1699. T. I. p. 406.

i Drachmas 22 ex sanguinis drachmis 34, quæ ratio est 83. 128. *doctrine of acids asserted.*

k l. c. p. 106. Uncias habet 46 cum  $\frac{3}{4}$  in unciiis 78.

unciis decem phlegmatis habuit uncias quatuor, unde portio ad sanguinem totum alia exfurgit, uti grumi in sanguine alia portio fuerit. *l.* Et tamen potuerunt omnes ad vera experimenta scripsisse. Nempe *Homborgius*, *Schwenkiius* & *Boerhaavius* multum aquæ habuisse possunt, quod de sanguine quidem aquam omnem abigerent, donec ficcus grumus superesset, eamque aquam omnem in rationes suas referrent. Qui parvam aquæ portionem proponunt, ii ab inodoro & blando phlegmate id solum separaverunt, quod saporem haberet odoremve, atque adeo aquæ portionem diminuerunt. Quare illi quidem fere omnem in sanguine latentem aquam metiti sunt, hi id solum fatuum phlegma, quod magis proprie aqua sanguinis vocatur.

Non inutile putavi fore, si alia experimenta in hominum varii temperamenti, variisque morbis adfectorum sanguine instituta repeterem, in quibus aquæ ad reliquum sanguinem alia & alia portio fuit. Initium faciemus a morbis, in quibus feri portio increvit. Ergo in phthifico homine ratio feri ad sanguinem fuit proxime 90 ad 128 *m.* In hecticæ feminæ sanguine, phlegmatis valde urinofi fuerunt supra 107 partes in 120 *n.* Hoc in exemplo sanguinis resoluti testimonium habemus, qualis a phthisi expectari potest; in priori hactenus etiam

*l* *Birch* T. III. p. 235. *n* *Idem* p. 419. nempe 52  
*m* *Colebatch* l. c. p. 416. drachmæ feri in sanguine  
 nempe drachmæ aquæ 14 ex 20 drachmis 62.  
 drachmis sanguinis.



feri portio major fuit, cum *Idem* auctor fani sanguinis serum valde parcum recipiat *o*. In phlegmatico homine de unciiis 13 sanguinis sicci cruoris manserunt drachmæ 20, unde ratio nata est  $103\frac{1}{2}$  aquæ in 128 partibus sanguinis, quam rationem citavimus *p*.

Contra idem auctor in cholericò homine rationem feri reperit  $104\frac{8}{13}$  in melancholico  $105\frac{2}{5}$ , in femina melancholica  $101\frac{7}{17}$  *a*.

In scorbutici hominis sanguine, aquæ minima portio fuit, ad 11 drachmas grana 10 in drachmis 26, inque libra ad drachmas 55 *b*. Sed & iste scriptor spiritum ad aquam sanguinis noluit connumerare.

In podagrìci ægroti sanguine aquæ meræ tres quartas sive 96 partes 128<sup>mas</sup>. posuit *c*.

Cl. *Browne Langrish*, qui in libra sanguinis de sano homine sumti  $105\frac{1}{2}$  aquæ drachmas repererat, idem in homine quinquagenario, & plethorico, reperit drachmas 104 grana 50, nempe aliquanto minus. In febre ardente die secundo feri drachmæ  $104\frac{1}{2}$  in 128 drachmis sanguinis fuerunt *d*: & die fere quarto 103 drachmæ *e*, ut mireris, non majus feri decrementum fuisse in morbo, qui urinam adeo flammeam, adeo fero pauperem, fere comitem habeat.

*o* In sano homine drachmas in libra 83, in phthifico drachmas 90. admittit.

*p* *Rhades* 1, c, p. 8.

*a* p. 90.

*b* p. 420.

*c* l. c. p. 50.

*d* p. 82.

*e* *Ibid*.

Hæc experimenta , nimis equidem pauca , videntur tamen ostendere , minui aquæ copiam in plethora , podagra , febre valente , & scorbuto *f* , augeri contra in phthisi , inque temperamento phlegmatico.

Sanguis bubulus humano multo spissior est. In libris enim quatuor sanguinis crassamenti fuerunt libræ omnino duæ *g*. Contra in viperæ sanguine ex 80 granis , humoris fuerunt 62½ sive super tres partes quartas aquæ *g*\*.

### §. XLII. Spiritus sanguinis.

Rarissimum est , extra putrem statum ante phlegma spiritum adscendisse *h* , etsi exemplum invenio ; in omnibus aliis periculis , quamdiu calor aquæ ebullientis gradum non superat , similis fere aqua , tantum sub finem paulo acrior adscendit , & in fundo vasis siccus *i* aliquantum empyreumaticus grumus superest , qui cum vitrioli oleo , & paulo validius cum nitri spiritu effervesceat *k*. Huic nunc sanguinis sapæ vehementior ignis subjicitur , cum arenâ æstun eo longe majorem concepiat , quo aqua ebullit. Ita prodit liquor utcunque pinguis , oleosus , amarus , subrufus , naturæ jam manifestius

*f* In quo aliqui augeri crediderant Sutton p. 104.

*g* Needham l. c. p. 234.

*g*\* Memoir. de l'Academ. des sciences. 1732. p. 26.

*h* Colebatch l. c. p. 407.

*i* Boerhaave l. c. p. 356.

Hombert l. c. p. 13. Vieussens p. 26. Alkali animale non dissolvitur , nisi ad aquæ ebullientis calorem Baron ad Lemery Cours de Chymie p. 805.

*k* Grew l. c.



*Seç. II. SPIRITUS SANGUINIS. 181*

urinofæ, quem *Robertus Boyle*, multis celebratum experimentis, *spiritum sanguinis* vocavit. Is constat fale volatili sicco in aliqua superstitis phlegmatis portione dissoluto *l*. Similis enim spiritus paratur, si falem volatilem sanguinis in aqua solveris, & una stillare coëgeris. Aqua vero & fal in spiritu ea ratione miscentur, ex *Raymundi Vieussens* experimento, ut in drachma phlegmatis, grana falis volatilis viginti & septem *m* colliquescant. Urinosam naturam, quam alcalinam volatilem vocant, odor facile prodit, & cum spiritu falis aliisve acidis liquoribus familiaris fervor *n*. A spiritu tamen urinæ & cornu cervi aliquo discrimine differt *o*.

Præter eum falem, oleum in sanguinis spiritu continetur: cum aqua enim lactescit *p*, cumque nitri spiritu, post solitum fervorem, crusta oleosa pavoninis coloribus varia nascitur *q*. Sed neque acidæ naturæ vestigia obscura sunt. Idem enim rubescens spiritus succum heliotropii rubro colore tingit *r*, maxime si moræ aliquantum concesseris, ut volatilis urinofus fal avolet *s*; neque hic a rufo pariter de plantis stillante spiritu distat *t*. Sed etiam ex urina putrida *v*,

*l Boyle apparat. p. 91. 93. append. p. 16.*

*m Vieussens preface aux deux dissertations.*

*n Boyle apparat. p. 97. Homberg l. c. p. 12. Grew l. c. p. 251.*

*o Boyle apparat. p. 97.*

*p Verheyen l. c. p. 33.*

*q Boyle append. hist. sang. p. 39.*

*r Homberg l. c. Hamberger p. 10.*

*s Macquer Chymie pratique T. II. p. 467.*

*t Homberg Mem. de l'Acad. 1709. p. 354.*

*v Idem ibid. 1712. p. 274.*

& ex carne  $x$ , quæ contabuit, rufus latex obtinetur, in quo notæ acoris supersunt. Idem liquor, a volatili sale separatus, quod rectificare vocant, manifesto austero & acido sapore est  $y$ . Scaturigo quidem hujus acoris nihil valde obscuri habet; a sale marino non oritur, cum ex sanguine viperarum, piscium in dulcibus aquis habitantium  $z$ , & aquatiliū avium omnino similis, & perinde acidus spiritus eliciatur. A male superata vegetabili indole potius nasci videtur  $z^*$ , quæ sponte sua ad acorem vergit; omnia vero animalia aut ipsis plantis aluntur, aut certe aliis animalibus, quorum victus ex herbis est. Deinde, cum pinguedo animalis insigniter aceat  $a$ , nihil mirum fuerit, si in pingui spiritu acoris vestigia fuerint. Cæterum acrior utique, & totus igneus, de sanguine spiritus adscendit, quando de admista calce stillat, quæ acorem superstitem destruxit  $b$ .

*Jurinus* duplicem sanguinis spiritum fecit, debiliorem plurimum, qui pondere tamen aquam superat, adque eam se habet uti 1007 ad 1000  $c$ , inde meraciorem, qui sit uti 1080 ad 1.  $d$ .

Rationem, quam spiritus ad sanguineum grumum siccum habet, ex quo prodit, adeoque ad totum sanguinem, iterum variam reperimus,

$x$  *Navier* l. c. Cum fætore casei putridi.

$y$  *Homberg Mem. de l'Acad.* 1712. p. 12. *Pott Miscell. Berlin.* T. VI. p. 21.

$z$  *Homberg* l. c. p. 15. *Lucium* piscem nominat.

$z^*$  *Neumann edit. Zimmerm.* p. 1220.

$a$  L. I. p. 64. seqq.

$b$  *Boyle hist. sanguin. append.* p. 30. 31. *apparatus.* p. 155.

$c$  *Jurin* p. 106.

$d$  *Ibid.*



*Raymundus Vieussens* ex unciis 179 sanguinis in priori experimento, & ex crassamenti sicci libris tribus, spiritus eduxit drachmas 28 grana 30 *e*: in alio vero experimento ex sanguinis integri libris sex unciis quatuor, sicci vero cruoris unciis viginti, omnino spiritus uncias decem, drachmasque septem, sive plus dimidia parte spiritus elicuit *f*, quæ quidem copia priorem multum superat. *Gualtherus Needham* ex sapæ sanguinis humani unciis sex spiritus uncias tres obtinuit. Proxima *Ermelii* est ratio, qui dimidiæ parti sanguinis suum spiritum æqualem fecit *f*\*, dimidiam ergo partem totius sapæ *g*: grumi vero  $\frac{3}{10}$ . *Jacobus Jurin h*, vel *Johannes Browne*, quo artifice is Cl. vir ad experimenta usus est, de unciis sanguinis 78 habuit, cruoris sicci uncias 41 drachmas duas, deque his 41 unciis spiritus debilioris uncias septem, meracioris uncias septem & drachmas sex, adeoque fere  $\frac{15}{41}$ , plus nempe tertia sanguinis sicci, sanguinis vero totius partibus  $\frac{18}{78}$ . *Casparus Neumann i* ex sanguinis sicci drachmis 28, integri vero sanguinis libra una, obtinuit spiritus unciam, sive partem sanguinis decimam sextam, grumi non penitus tertiam. Proximum est *Verheyenii* experimentum, in quo spiritus fere  $\frac{5}{19}$  fuerunt *k*. In experimento alio a J. B. *Verduc* relato, alia spiritus portio est fere  $\frac{1}{19}$ , nempe drachmæ quatuor cum dimidia

---

*e* *Traité des liqueurs* p. 18.

*f* Ibid.

*f*\* *Anat.* p. 72.

*g* l. c. p. 235.

*h* l. c. p. 106.

*i* l. c. p. 763.

*k* Ap. *Verduc* p. 371. drachmarum trium ex septem unciis.

ex 78.dr. *l. Hombergius* ex libris sanguinis sedecim spiritus, sed una cum sale, habuit uncias duodecim, partem nempe totius sanguinis duodecimam *m*, si de libris 12 unciarum sermo est. *Robertus Boyle n* ex sicci sanguinis unciis viginti quatuor, spiritus appendit uncias 6 cum dimidia, partem adeo fere tertiam. In his periculis ratio spiritus ad grumum sanguinis siccatum est a dimidia ad tertiam fere partem, in priori enim experimento *Vieussenius* sanguinem nimis sicasse videtur. Inde si grumus ruber sexta pars est sanguinis totius, spiritus pars erit aut duodecima, aut decima octava sanguinis. Facile vero aliqua diversitas vel ex solo nomine oriri potuit, uti laticem de sanguine adscendentem quisque diutius phlegmatis nomine, aut præcocius spiritus titulo, appellare maluerit.

In experimentis *Johannis Colebatch* morbi diversitatem in spiritus copia fecerunt. Ex hominis sani sanguine spiritus portio fuit fere septima *o*, aut partes 19 ex 128. in phthisico  $\frac{22}{128}$  *p*, in tussiculosa femina 24 & fere 25 *q* earundem partium, in duobus ægris scrophulosis fere 32 *r*, perinde in hysterica *s*, in rheumaticæ feminæ sanguine 39 *t*, in scorbutico partes  $40\frac{8}{13}$  *v*, in podagrica calculosa muliere 43 *x*, in hypochondriaco  $51\frac{2}{13}$  *y*,

*l* Verduc p. 367.

*m* Memoir. 1712. p. 13.

*n* Apparat. ad hist. sang.  
p. 50.

*o* Nempe drachmæ quinque  
ex sanguinis drachmis 34. doctrine  
of acids asserted p. 418.

*p* p. 416.

*q* p. 419.

*r* p. 417. 421.

*s* p. 415.

*t* p. 414.

*v* p. 420.

*x* p. 417. Addit ante phlegma ascendisse.

*y* p. 421.



in chlorotica femina 55, quæ rationes fere enormes videntur z: sed memores nos esse oportet, hunc auctorem falem volatilem cum spiritu numerare. Cæterum ex ejus experimentis adpareret, in podagra z\*, morbo hypochondriaco, & hysterico, portionem urinofam sanguinis maximam esse. Ex *Needhamo* denique repeto, taurini sanguinis spiritus ex crassamenti libris duabus fuisse ad uncias novem supra libram a, majori adeo in ratione, quam in ullo humani sanguinis experimento. Cl. *Spielmannus* ab aqua non separatum reperit duplicem spiritum, debiliorem & fortiorem, effecisse in sanguine venæ portarum fere  $\frac{1}{128}$  in sanguine venæ cavæ  $\frac{1}{94}$ .

Tantam subtilitatem hujus spiritus fuisse, ut de clauso vase totus evanuerit, *Vioussenus* in opere posthumo. Quod Cl. *Roberti* experimento paulum fidei addit, qui eandem adipi humano ad evaporandum facilitatem fecit.

§. XLIII. *Sal volatilis.*

Cum eo spiritu, & post eum, & ante oleum sanguinis b, & cum eo oleo, adscendit de grumo cruoris sal volatilis solidus, albus, vehementis odoris, & indolis summe penetrabilis. Adhæret idem ori excipuli, & collo ampullæ retortæ, ex qua adscendit. Plerumque aliquam

z p. 420.

z\* *Colebatch* l. c. in ratione

6 & 5  $\frac{1}{2}$  ad 4. In scorbuto

perinde *Essay concern. acid.*

and *alkali.*

a l. c. p. 234.

b *Boerhaave* l. c. p. 356.

*Hill, mat. med.* p. 874.

olei portionem adhærentem *c* habet ; quando vero seorsim obtinetur , adscendit ramosa arbuticularum specie *d* ; singula vero ejus salis granula parallelepipeda , cubica , octaëdra , & regularium polygoniorum *e* corporum similia sunt. Si calcem sanguini adjeceris , nullus sal siccus obtinetur , ejusque locum spiritus , solito & copiosior , & valentior occupat *f* : si vero salem tartari *g* pro calce addideris , spiritus quidem debilior , plurimum vero salis volatilis adscendet.

Vehementer cum acidis liquoribus fervet *h* : spiritu vero rectore amisso , minima parte sui ponderis levior , omnino inodorus superest *i*.

Quam in universo sanguine portionem obtineat , difficulter certe dicitur. *Caspar Neumann* ex libra sanguinis , cruorisque sicci drachmis 28 obtinuit drachmam salis sicci dimidiam , quæ ratio totius sanguinis est *k*  $\frac{1}{182}$ . *Gualtherus Needham* de sanguinis sicci unciiis sex , quas possis habere pro sapa de 20 unciiis sanguinis extracta , salis volatilis drachmas duas paravit , sive partem  $\frac{1}{80}$  *l*. *Jacobus Jurin* ex siccis 78 unciiis sanguinis drachmas salis volatilis septem , sive partem fere  $\frac{1}{89}$  *m* elicuit. *Robertus Boyle* in priori *n* experimento sicci sanguinis uncias

*c* *Vieussens* præf. cit.

*d* *Boyle apparatus*. p. 34.

*e* *Idem* ibid. p. 35. & *append.* p. 18. Rhomboideæ particulæ in sanguinis spiritu *Grew Cosmol.* p. 15. 16. & in sale volatili humani sanguinis *Boyle Chem. Scept.* T. IV.

*f* *Idem apparatus*. p. 155.

*g* *Append. hist. sang.* p. 34.

*h* *Grew l. c.* p. 251. 252.

*i* *Boyle apparatus*. p. 31.

*k* *l. c.* p. 763.

*l* *l. c.* p. 235.

*m* p. 106.

*n* *Apparat.* p. 50.



exploravit 24, obtinuit falis volatilis drachmas decem cum semisse, quæ portio totius sanguinis est fere  $\frac{1}{73}$ . siccum enim sanguinem quartæ parti totius massæ comparat o. In alio p experimento ex sicci etiam sanguinis uncis 12, obtinuit falis volatilis uncias duas & drachmas duas, triplum certe prioris exp. quæ enormis ratio efficit ad  $\frac{1}{32}$  totius massæ, & nimis a priori aberrat. *Spielmannus* falis volatilis ammoniacalis in sanguine venæ cavæ reperit fere  $\frac{1}{430}$  in sanguine venæ portarum omnino  $\frac{2}{135}$  sed hæc ab alia portione falis fluidi fere compensantur. *Vieussenius* in experimento priori q ex uncis 100 sanguinis, uncis vero viginti sicci cruoris, falis obtinuit drachmas decem, sive  $\frac{1}{80}$ . In alio r exemplo de 179 uncis drachmas sex, grana 18, sive portionem non majorem, quam  $\frac{1}{225}$ , quæ ratio vehementer aberrat. *J. Conradus Barchusen* s ex sanguinis absque sero uncis quatuor, falis grana habuit 55, sive partem  $\frac{1}{64}$ , aut ultra. *J. B. Verduc* in alio experimento de drachmis 78 elicit sesqui drachmam, sive  $\frac{1}{52}$  t. *Philippus Verheyen* v de sanguinis sicci 56 drachmis drachmas duas falis obtinuit, sive  $\frac{1}{28}$ . totius vero cruoris fere  $\frac{1}{112}$ .

In febre portio falis volatilis augetur. In octo uncis sani sanguinis de juvene missi repererat *Browne Langrish* grana 38 sive partem fere  $\frac{1}{101}$  x.

o Ibid. p. 46.  
p Append. p. 5.  
q p. 28.  
r p. 18.

s Post acroamata exp. XI.  
t p. 368.  
v L. II. p. 35.  
x l. c. p. 80.

Sed idem in viro quinquagenario in eodem  $y$  pondere sanguinis grana reperit 46 sive  $\frac{1}{80}$  : in febre ardente die secundo grana 65 sive  $\frac{1}{65}$   $z$ , die quarto omnino grana 94 sive fere  $\frac{1}{41}$  obtinuit  $a$ . In podagra ex libra sanguinis salis prodierunt grana 68 sive  $\frac{1}{71}$  si de medica libra fermo fuerit  $b$ . Quare ex principibus febris effectibus videtur, salis volatilis urinosi portionem augere.

In taurini sanguinis  $c$  libris quatuor fuerunt drachmæ duæ, scrupulus unus grana sex, sive fere  $\frac{1}{105}$  si libræ civiles sunt, aut  $\frac{1}{70}$  si medicæ duodecim unciarum.

#### §. XLIV. *Oleum sanguinis.*

Una cum sale volatili, aliquanto tamen serius adscendit flavum oleum  $d$  sanguinis, hætenus, fluidius, & altero, quod continuo sequitur, levius, ut de eo sponte secedat, si commiscueris.

Nempe si ignem urferis, succedet albus fumus  $e$ , & rufum, & tenax inde, piceumque oleum, non absque periculo, si collum retortæ phialæ minus amplum fuerit, & sanguinis vehementer igne subito pellatur.

Utrumque oleum cum acidis fervet  $f$ , ut

$y$  Ibid. p. 81.

$z$  p. 82.

$a$  p. 83.

$b$  Pinelli p. 50.

$c$  Needham l. c. p. 235.

$d$  Succineum dictum Roberto

Boyle apparat. ad hist. sang. p. 40. & ex eo Dominico Sandris p. 92.

$e$  Boerhaave l. c.

$f$  Boyle l. c.



tamen non in isto solum oleo, sed etiam in animali illo *Dippeliano*, g vestigium acidæ naturæ supersit, chartaque cærulea rubro h inde colore vitietur. Destillatum idem rufum, fætidumque spiritum reddit, qualis ex sanguine prodit i.

Hoc oleum partim ex vera per sanguinem mista pinguedine nascitur, quæ nonnunquam, in obesioribus animalibus, etiam oculis conspicuam se offert k, & in recenti etiam sanguine demonstratur, quando in aquam destillando cadit, rubram enim & oleosam, & aquæ innatantem cuticulam efficit. Alia pars ex rubris globulis prodit. In iis enim inflammabilis natura manifesta est, ut mirer potuisse negari k\*; cum ferum inter & globulos repulsio locum habeat k\*\*. Si globuli ægre cum oleo miscentur k\*\*\*, figura eorum constantior ab oleo destrui noluerit, neque globuli se in tenacem liquorem perinde facile se diffuderint, ut in aquam. Sanguis certe ab omni fero & aqua omni separatus, merace ruber, solisque nunc adeo factus globulis, durus fit, fragilis, & ignem capit alitque l.

g *Mangold vermischte vortheile* n. 43.

h *Idem* *ibid.*

i *Vieussens pref. aux deux dissertations.*

k *Adeps in suis sanguine Ruysch thesaur. anat. I. assert. I. p. 3. Habet etiam Malpighius de omento p. 235.*

k\* Non magis quam lympham inflammabilem esse partem colorantem *Butt p. 51.*

k\*\* *Id.* p. 50.

k\*\*\* *Ib.*

l *Boyle append. p. 24. Beccher physic. subterr. L. I. S. 5. c. 1. p. 308. Stubbes on phlebot. p. 46. 106. 107. Hofman observ. Chem. p. 210. medic. system. T. I. p. 95. Vinc. Menghinus in Comment. Bonon l. sæpe cit. Westphal de vulnere intestin. ilei p. 6. Eller l. c. p. 8.*

Et ruber pulvis percolatione & elotione de sanguine paratus, aut crusta, quæ de sanguine post exhalationem omnis aquæ superest, vasisque stanneis adhæret, in igne micat, crepitat, inflammatur. Alio etiam modo Ill. *Gaubius* cum aqua ebulliente cruorem solvit, ut in floccos abeat; ita in pulvem spissescit, quæ per colum trajecta, & leni calore siccata friabilis est, flammamque concipit, & ardet *m*. Ejusmodi etiam ruber pulvis in arteria vivi animalis ex arefacto sanguine nascitur.

Ex ea sanguinis pinguedine cum alumine pyrophorus *n* conficitur, neque ab eo oleo differt, quod aut ex cornubus, aut ex cranio demum humano paratur, & spem æterni luminis fecit *o*, cum lentissime deflagret, & exiguum ejus olei pondus aliquot mensium flammulæ sufficiat. Pyrophorum olim *Cardanus* dixit, fæcem de sanguine humano digesto & destillato natam, in finum sepultam, & ignis avidam *p*.

Oleum hujus simile, quod descripsimus, ex omnibus animalibus, & animalium partibus omnibus paratur: solæ formicæ, quantum innotuit, præter animale oleum etiam aliud oleum illi simile dederunt, quod de pinguibus

*m* p. 159. 160.  
*n* *Lemery Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1714. p. 404.  
*o* Ill. Principis de S. Severo experimento, quod in proprio libello descripsit *Lettres concernant une découverte &c.*

Naples 1753. 4. conf. *Hamburg. Magazin* T. XI. XII. n. 6. quo loco ea spes aliquantum minuitur.  
*p* *Cardanus de subtilitate* p. 516.



plantarum feminibus *expressum* *q*, vulgo notum est, exque iis demum animalculis oleum æthereum verum parari potest *q*\* Animale oleum a vegetabili empyreumatico aliquantum differt *q*\*\*.

In portione olei ad sanguinem universum, aut ad siccum sanguinem, iterum maxime dissentitur. Ex integri sanguinis octo unciiis, in sano juvene, *Browne Langrish* obtinuit olei grana 52 *r* & ex quinquagenarii viri sanguine grana 72 *s*. Prior ratio est  $\frac{1}{78}$ , altera  $\frac{1}{53}$ . Proximum est experimentum *Jacobi Jurin*, qui ex unciiis sanguinis 78 unam unciam olei elicuit *t*, si septuplam grumi rubri sanguinis copiam feceris. *Robertus Boyle*  $\frac{1}{68}$  habuit olei *v*, quando de libra una drachmas duodecim destillatione facta appendit; solet autem minorem grumi ad sanguinem portionem facere. *Caspar Neumann* ex unciiis tribus cum semisse sanguinis sicci, drachmam olei elicuit dimidiam, quæ ratio ad sanguinem est  $\frac{1}{52}$  si sextuplum grumi feceris *y*. *Hombergius* ex totius sanguinis unciiis 256 olei utriusque uncias quinque coegit adscendere sive  $\frac{1}{51}$  *z*. *Raymundus Vieussens a* in priori experimento de unciiis 179 sanguinis habuit olei uncias quatuor & drachmas tres, quæ ratio est  $\frac{1}{40}$ . In

*q* *Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc. de Berlin* 1749. p. 40. 41.

*q*\* *Neumann* ex edit. *Zimmerm.* p. 1268.

*q*\*\* *Idem* ex edit. *Kessel.* T. I. P. II. p. 350.  
*r* l. c. p. 80.

*s* l. c. p. 82.

*t* p. 106. Addit, aliquid olei capiti mortuo adhæsisse.

*v* *Append.* p. 7. 8. Ill. viro hæc copia magna visa est.

*y* l. c. p. 763.

*z* l. c. p. 13.

*a* p. 18.

altero de 100 unciis sanguinis , uncia olei prodierunt duæ , drachmæ quinque , grana 40 , quæ ratio est  $\frac{1}{37}$  *b* , si recte pondera interpretor , in quibus utique facile erratur. Ex ficci sanguinis unciis tribus Cl. *Visschero* *c* visæ sunt adscendisse drachmæ olei quatuor & aliquanto plus , quæ ratio , sextuplo sumto grumi sanguinis , est fere  $\frac{1}{36}$ . In alio experimento *Roberti Boyle* de sanguinis drachmis 81 & granis 13 olei factæ sunt drachmæ duæ grana 48 *d* , sive fere  $\frac{1}{29}$ . *Philippus Verheyen* de suo , putrido quidem cruore ex drachmis 56 olei crassi ( nam subtile oleum hujus viri aliis auctoribus spiritus est ) obtinuit scrupulos octo , sive supra partem  $\frac{1}{21}$  *e*. *Gualterus Needham* ex unciis decem grumi de humano sanguine separati , obtinuit olei unciam , partem adeo vigesimam totius sanguinis , si grumi duplum feceris *f*. Denique ex drachmis 34 sanguinis , olei drachmas tres elicuit , vir ex suo vitæ genere hætenus chemiæ peritus *Johannes Colebatch*. Hæc enormis olei copia est fere  $\frac{1}{11}$  totius sanguinis.

Adparet , adeo diversos eventus in Cl. virorum periculis fuisse , ut alii fere  $\frac{1}{80}$  , alii pene  $\frac{1}{11}$  olei de sanguine extraherent. Potuit in nonnullis experimentis aliqua spiritus portio in carbone sanguinis

---

*b* p. 28.

*c* Diff. de cholepoiesi p. 7.

*d* Apparat. ad hist. sang. p. 40.

*e* l. c. p. 37.

*f* l. c. p. 325.



guinis hæſiſſe. Aliquod etiam diſcrimen ex ætate , & temperamento , & ſano , ægrove ſtatu eorum hominum interpretamur , quorum ſanguis ad experimenta adhibitus fuit. Videmus, ex Cl. *Browne Langriſh* , in adultioris hominis ſanguine olei majorem portionem fuiſſe g. Idem vir Clar. in febre ardente , die ſecundo olei habuit tantum , ut  $\frac{1}{4}$  ſanguinis ſicci efficeret *h*. *Johannes Colebatch i* , cujus pondera alioquin a reliquorum ſcriptorum ponderibus vehementer diſſentiunt , habet olei in ſcorbutico portionem æqualem decimæ tertiæ parti ſanguinis ; in rheumatica fere  $\frac{1}{12}$  , in chlorotica pariter  $\frac{1}{16}$  , in hypochondriaca homine  $\frac{1}{20}$  , in tuſſiculofa femina fere  $\frac{1}{21}$  , in ſcorbutica ſcrophuloſa ægra perinde , in hyſterica  $\frac{1}{28}$  , in ſcrophuloſo homine  $\frac{1}{35}$  , in phthiſico  $\frac{1}{37}$  , ut omnino portio olei maxima eſſet in ſanguine hominis ſcorbutici , minima in phthiſico. In podagrico viro *Pinellus* partis oleoſæ reperiit inter  $\frac{1}{20}$  &  $\frac{1}{21}$ . In bubuli ſanguinis libris quatuor , & craſſamenti libris duabus , fuerunt olei drachmæ tres , ſive  $\frac{1}{170}$  aut certe  $\frac{1}{108}$  pars , valde certe exigua , ſi reputaveris , ſpiritus 25 uncias fuiſſe l.

Hoc ex oleo , & ex pilis , lana , ungulis , lumbricis , ſerico , ſtercore humano parari poteſt , & ex viliori oleo ſanguinis cervini omnino parari ſolet , celebre illud *m animale oleum*

g p. 80. ſeqq.

h Ibid.

i p. 416. & ſeqq.

l l. c. p. 50.

*Tom. III.*

*m Breslauer ſamlungen 1718.*

M. Januar. S. Carl. Commenc.

Lit. Noric. 1733. n. 31. Kra-

mer ibid. 1734. n. 4.

N

*Dippelii*. Sive id oleum de sanguine in aquoso balneo, cum multa aqua stilllet, ex b. foceri mei H. *Friderici Teichmeyer* n consilio : sive repetito rectificetur o, sive alio, magis composito, modo cum spiritu salis & tartari destillato oleo iterato cohobetur o\*, sive demum, ut nunc simplicius fit, bonum habeatur, cavendo unice, ut primum, quod adscendit limpidum, seorsim fervetur, id certe oleum deposito faetore, gratum nunc odorem spirat, gratumque saporem p praestat. Vires medicas alii aliter aestimant. Paradoxus inventor pro summo remedio vendidit, quo convulsio omnisque nimius in nervorum universitate motus compesci possit. Anodynā potestatem admittit *Burchardus David Mauchart* q, & alii laudant r; ad vulnera vero commendat Cl. *Cartheuser*. Alii multo minores spes de eo oleo concipiunt. r\*. Felix & gratiofus medicus *Balthasar Ludovicus Tralles* s spiritum cornu cervi, aliaque id genus animalia olea, iisdem pollere viribus monet: anonymus autem, qui *Dippelii* medicum opusculum germanice reddidit, & commentarios suos adjecit, omnino totum rejecit t: neque mihi in vivi hominis

n Etiam *Mauchartus* de oleo animali credit satis esse, si bis destilletur.

o *Cartheuser* pharmacolog. p. 230. 243. *Neumann* edit. *Zimmerm.* p. 1243.

o\* *Rohde Chymie* p. 223.

p In disp. me praefide defensa *Gotting.* 1747.

q l. c. Monet tamen sponte sua corrumpi.

r *Kramer* l. c. *Mangold*.

r\* Ad epilepsiam & cataractam crystallinam, ad solvendos illitu scirrhus *Act. Acad. Mogunt.* T. I. p. 297. sq. & 539. ad epilepsiam *Kramer* l. c.

s *Exam. medicam. terreor.* p. 155.

t *Vit. anim. morb. & medic.* p. 198.



## Sect. II. OLEUM ET CARBO SANGUINIS. 195

corpus & sanguinem olea animalia unquam placuit recipi. Olim *Olaus Borrichius* adnotavit, oleum cranii humani faetore exutum, una vires deponere, ignavumque fieri v.

### §. XLV. *Carbo sanguinis.*

Atque nunc imprimis oportet recte temperare ignem, ne massa reliqua cruoris quasi fermentet, intumescat, & adsurgat x; ita manet in fundo vasis retorti faex nigerrima, splendida, spongiosa, porosa, levis, friabilis, falsa, amara, empyreumatica, urinoso odore y, inflammabilis z, quam olim *J. Baptista* ad *Helmont* a, inde *Hermannus Boerhaave* carbonem dixit b sanguinis, multi alii caput mortuum non recte dixerunt, cum varios sales contineat. Ejus ad sanguinem relati portio iterum varie appensa est. *Robertus Boyle* c ex libris duodecim sanguinis uncias quatuor drachmas duas carbonis obtinuit, quae portio est sanguinis  $\frac{1}{45}$  vel, si de libra medica sermo est, fere  $\frac{1}{34}$ . *Homborgius* ex quatuor libris sanguinis reliquas habuit dr. 30 carbonis, sive  $\frac{1}{17}$  d. *Raymundus Vieussens* ex centum e uncis sanguinis siccae faecis vidit superesse uncias quatuor drachmas sex, quae ratio est fere  $\frac{1}{21}$ : in alio vero experimento, valde diversi eventus f,

v *Hermetic. Ægypt. sapient.*  
p. 332.

x *Boerhaave* l. c. *Boyle* ap-  
parat. ad *hist. sang.* p. 148.

y *Navier* l. c. p. 33.

z *Boyle* append. p. 6.

a *Oper.* p. 91. n. 5.

b l. c. p. 354.

c *Append.* p. 5.

d Ex sicci cruoris uncis vi-  
ginti p. 28.

e p. 18.

f l. c. p. 235.

ex 179 unciis, uncias omnino 22 & drachmas septem sive fere  $\frac{1}{8}$ . *Gualtherus Needham* de grumi rubri unciis decem, quæ potuerunt cruoris totius copiam dare unciarum viginti, habuit drachmas decem, sive  $\frac{1}{16}$  g. *Caspar Neumann* ex libra unciam sive pariter  $\frac{1}{16}$  h. *Jacobus Jurin* ex 179 unciis uncias octo cum semisse i sive  $\frac{1}{9}$ . *Browne Langrish k* ex octo unciis, unciam unam grana 52 sive  $\frac{1}{7}$  & ultra. *Antonius de Heyde* ad quintam partem totius sanguinis æstimat l. *Philippus Verheyen* ex 78 drachmis habuit drachmas 16 sive  $\frac{1}{5}$  m. Ex sanguine venæ cavæ carbonis habuit  $\frac{1}{14}$  idem, & ex sanguine venæ portarum  $\frac{20}{135}$  sive plus  $\frac{1}{7}$ . Iterum enormis est in experimentis diversitas, quæ potest ab olei portione pendere, quod alii de carbone patienter abegerunt, alii reliquerunt admistum.

In morboſis hominibus, ſi fides eſt *Johanni Colebatch n*, alia & alia carbonis portio eſt. Sano homini, totius molis ſanguinis effecit  $\frac{1}{17}$ , in tuſſiculofæ pene phthiſicæ feminæ ſanguine  $\frac{1}{10}$  †  $\frac{6}{80}$ , in ſcorbutico homine  $\frac{1}{13}$ , in rheumatismo  $\frac{1}{14}$  †  $\frac{4}{98}$ , in calculoſa podagrica  $\frac{1}{15}$  †  $\frac{7}{135}$ , in phthiſica  $\frac{1}{19}$  †  $\frac{4}{104}$  fere, in chlorotica  $\frac{1}{20}$ , in alia ſcrophuloſa  $\frac{1}{20}$  †  $\frac{4}{140}$ , in hyſterica  $\frac{1}{21}$  †  $\frac{6}{168}$ , in ſcrophuloſa  $\frac{1}{27}$  †  $\frac{1}{69}$ , in hypo-chondriaco  $\frac{1}{24}$ .

g l. c.

h l. c.

i l. c.

k p. 80. 82.

l Obſ. 87.

m l. c. p. 35.

n l. c.



Bubulus sanguis in libris sex habuit carbonis uncias 10 sive pene  $\frac{1}{10}$  o.

§. XLVI. *Sal sanguinis in igne fixus.*

In hoc carbone multa latent, terra, sal fixus, sal marinus, sal acidus vehementer fixus, ferrum, oleum denique ponderosissimum. Id oleum demonstratur ex deflagratione, quam is ipse carbo patitur. Exustus ergo, per aliquot horas, relinquit cinerem subrufum, ex terra cum sale mistum. In lixivium redacto cinere, terra de sale secedit, qui in igne fixus superfuit. Cineris *Boyleus* sex drachmas & semisse, ex duodecim sanguinis ficci uncis abstulit; quæ portio, ex *Boylei* calculis, est  $\frac{1}{14}$ . *Caspar Neumann* ex ficci pariter cruoris uncis tribus & semis, exve libra sanguinis integri, retulit calcis drachmas septem, sive pene  $\frac{1}{14}$ , si de libra medica sermo est.

Qui ex hoc cinere sal obtinetur, ambiguæ naturæ est *p*. In igne quidem persistit, cæterum alia signa habet marini salis, alia lixiviosi, ut omnino ex utroque genere commistus sit *q*. Lixiviosum esse, vulgo admittitur *r*,

o *Needham* l. c. p. 234. loquitur. Inde habet *Poterius*  
*p* *Helmont. blas human.* n. 39. de febrib. L. I. c. 23. *Pott*  
*Tachen hyppocrat. chym.* c. 21. *miscell. Berol.* T. VI. p. 27.  
 Multum esse, addit *Helmontius.* *Vieussens pref. aux deux diff.*  
*r* In *deux dissertat. Epist.*  
*q* *Borrich act. hafniens.* vol. ad *Lipsienses Philos. Transact.*  
 2. De sale carniū animalium, n. 241. *Pinelli* l. c. p. 50. *Dei-*  
 bilis, urinæ, ossium perinde *dier princip.* p. 10. &c.

cum acidis enim liquoribus fervet *s*, & in aere deliquescit *t*, neque crepitat *v*, & reperitur in animalibus nullo utique marino fale *x* utentibus. Fixum etiam in igne falem lixiviosum nuper ex ossibus recoxit Cl. *Macquer* *y*, exque sanguine *J. Henricus Pott* *z*. Eum, ne *testæ docimastricæ* colliquescant, artifices eluunt. Cl. *Rouelle* natrum facit sive minerale alcali, quod cum acido vitriolico falem mirabilem *Glauberi* constituit *z*<sup>\*</sup>.

Sed si lixiviosi falis signa habet, non defunt marini falis evidentia vestigia, non in hominis verum folius sanguine, sed etiam in animalium succis, quæ nunquam fale marino utuntur. Syrupum violarum viridi colore minime tingit *a*: sapore marinum æmulatur *b*, argentum in aqua forti dissolutum albi pulveris specie præcipitat *c*, aquam fortem in regiam commutat *d*, denique in crystallos abit *e*, tessellatas *f*, & tetragonias. Ejusmodi etiam fal ex spiritu sanguinis *g* obtinetur, aut ex sicco sanguine *h*, ejusve carbona *i*

*s*. *Borrighius* l. c. *Browne Langrish* p. 81.

*t* *Vienssens traité des liqueurs* p. 44. deux diff. p. 6.

*v* *Ibid.* deux diff. p. 6.

*x* *Idem* *ibid.* p. 43.

*y* l. c. p. 478.

*z* *Miscellan. Berolin.* T. VI. p. 27.

*z*<sup>\*</sup> *Journ. Med.* 1773. Juil.

*a* *Boyle apparat. ad hist. sang.* p. 45. *Boerhaave* l. c. p. 356. Confirmat tamen, utique tingere *Vienssens pref. aux deux dissert.*

*b* *Borrigh.* l. c.

*c* *Boyle* l. c. *Browne Langrish* l. c. p. 82.

*d* *Boyle* p. 46.

*e* *Beddevole Essays d'Anat. disc. 2.* *Sandris* p. 10.

*f* Vide locc. seqq. conf. *Rhades* p. 7.

*g* *Grew Cosmolog. sacr.* p. 15. 16. *Boyle* app. p. 36.

*h* *Lancisius* ad *Mercati metallothecam* p. 37. & in *diff. IV.*

*i* *Schwenke* p. 150. *Macquer chym. prat.* p. 458. Habet eundem *Poterius de febr.* L. I. c. 23.



educitur : tum ex carnis vitulinæ , bubulæve lixivio *k* , ex urina *l* , cervorum cornubus *m* , hominis & animalium ossibus *n* , carne animalium carnivorum *o* , & ex universis rapacium bestiarum carnibus *p* , lacte *q* , ipsoque demum urinoso phosphoro *r*. Sed etiam in plantis ejusdem salis indicia sunt *r*\*. Idem copia salem fixum superat *s*.

Hujus misti salis diversa ad sanguinem portio est , quam diversi scriptores referunt , ut enormis hic varietas sit. *Stor-  
mius*  $\frac{1}{60}$  reperit. *J. Conradus Barchusen* ex unciis octo sanguinis ovilli , de fero suo separati , atque adeo fere ex unciis sedecim sanguinis totius , duo grana habet , sive  $\frac{1}{3840}$  sanguinis *t*. *Gualtherus Needham* ex carbonis sanguinis sive extracti unciis sex , & sanguinis rubri unciis decem , atque adeo ex 20 fere unciis sanguinis totius , habuit grana 8, sive  $\frac{1}{1200}$  *v*. *Vieussenius* in altero experimento *x* de sanguinis

*k* *Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1730. p. 224.

*l* *Henkel flor. Saturniz.* p. 243. *Vieussens respons. ad med. Rom. Neumann edit. Zimmerm.* p. 1221. *Wallerius ad Hiärne* T. II. p. 70. *Pott l. c. Rutty synopsis.* T. I. p. 457.

*m* *Geofroi-Mem. de l'Acad. des scienc.* 1732. p. 19.

*n* *Havers de ossib. Macquer* p. 478. *Geofroi l. c.* p. 17. 18.

*o* *Henkel l. c.* In aselli carne, *Barchusen post acroamat. exp.* 10, ad gr. 5. ex unciis quatuor.

*p* *Borrich. sapient. ægypt.*

*hermet. p.* 401. sales nempe cubicæ figuræ.

*q* *Macquer* p. 455.

*r* *Albinus de phosphoro, Boerhaave* T. II. *proc.* 95. Ex capite mortuo phosphori *Homburg* *Memoir. de l'Acad.* 1712. p. 274.

*r*\* *Crytalli salium plantarum pleræque cubicæ sunt* *Grew Cosmolog. sacr.* p. 15. 16.

*s* *Pott l. c.*

*t* *Post acroamata exper.* XI.

*v* *l. c.* p. 235.

*x* *Traité des liqueurs* p. 28.

ficci unciiis viginti, aut totius sanguinis unciiis centum, drachmas duas, grana sex, cum dimidio habet, sive  $\frac{1}{763}$ . In altero experimento ex 179 unciiis sanguinis integri elicuit unciam semis, grana novem, sive  $\frac{1}{344}$  y. In tertio de libris quinquaginta unciam unam elicuit sive  $\frac{1}{800}$  z. Idem ex olei uncia grana salis octo a extraxit. *Caspar Neumann* de libra scrupulum dimidium, sive  $\frac{1}{576}$  b. *Thomas Pinellus* ex podagrigo, cui sal sanguinis abundat, de libra una drachmam dimidiam sive  $\frac{1}{192}$  c, si libra medica est, vigesies majorem copiam quam quidem *Barchusen*. *Robertus Boyle* ex ficci cruoris unciiis duodecim sex scrupulos elicuit, sive  $\frac{1}{48}$  d, quæ, si quadruplum sumseris pro sanguine toto, portio iterum est  $\frac{1}{192}$  totius sanguinis.

Sed etiam iste sal in variis corporis humani temperamentis morbisve alia est copia aliaque. In sano juvene *Browne Langrish*, in unciiis sanguinis octo repererat grana quinque, sive  $\frac{1}{768}$  e. In quinquagenario grana fuerunt octo, sive  $\frac{1}{480}$  f. Secundo die febris ardentis nonnisi grana quatuor g & semisse, & quarto die grana sex, sive  $\frac{1}{640}$  ejusdem salis invenit, sed in febre manifestius lixiviosi h. In sanguine bubulo salis fixi de libris sex fuerunt scrupuli 5, grana 4, sive  $\frac{1}{443}$  i.

y p. 18.

z *Epist. tr. des liqueurs* p. 71.a *Deux dissertations*.b *Oper. chem.* T. III. p. 763.

c l. c. p. 50.

d *Append.* p. 6.

e p. 80.

f p. 82.

g p. 82.

h p. 83.

i *Needham* l. c. p. 235.



§. XLVII. *Acor sanguinis.*

In eo sale sanguinis, qui ignis violentiam tolerat, primus *i*<sup>\*</sup>, ni fallor, *Raymundus Vienssens* five ex proprio experimento, five ab aliis monitus *k*, acidum liquorem invenit. Majorem nempe, quam hactenus tentatum fuerat, sanguinis copiam in calcem reduxit, inde lixivio facto, sale fixum novo & vehemente igne torfit *l*. Ita paucum omnino acorem, & de quinquaginta sanguinis libris omnino drachmas quatuor grana octodecim *m*, inque alio experimento, ex uncia salis fixi sanguinis drachmas tres vere acidi, meraci liquoris obtinuit *n*. Prior portio est totius sanguinis  $\frac{1}{1488}$ , altera  $\frac{1}{2133}$ . Eum nunc acorem, sub principia hujus seculi, medicorum principes non valde lubenter recipiebant, qui nuper acidam illam *Tachenianam* & *Helmontianam* morborum theoriam refutassent, neque facile persuaderentur, in animalium sanguine verum acorem reperiri. Quare, quod invenerant acidi liquoris Romani Medici *o*, & princeps *Lancisus p*, tum *H. Boerhaave q*

---

*i*<sup>\*</sup> Habet tamen *Poterius* ex *Epist. ad quasdam medicin. face sanguinis*, de qua spiritus *facult. in traité des liqueurs* destillavit, sale copiosum, *p 70. &c.*  
*subacida dulcedine, nitri & m Traité des liqueurs l. c.*  
*ammoniaci salis adfinem l. c. n Ibid. p. 73.*  
*k Habuisse a Cl. Sidobre, o Philos. Transact. n. 264.*  
*Petrus Chirac in réflexions p Ad Mercati metalloth. p. 37.*  
*préliminaires aux trois lettres. diff. IV.*  
*l In deux dissertations : in q l. c. process. 101, 126.*

aliique *r*, id omne ad sale[m] marinum retulerunt, qui pertinax in liquoribus humanis resideat, nuper in sudore a *Theodoro Tronchin s*, celeberrimo medico detectus. Bolum alii *t* accusarunt, quam destillationi suæ *Vieussenius* addiderat, in quo certe terrarum genere verus acor vitriolici generis latet. Alii utrumque fontem conjunxerunt *v*, aerem accusarunt alii *x*; nuperi denique Itali medici breviter nodum gordium fecarunt, ut hunc acidum laticem omnino reperiri negarent *y*.

Contra hos omnes *Vieussenius* decus suum inventumque acorem acriter tuebatur: & quidem non ex bolo *z* esse facile ostendit, cum perinde absque bolo, adhibita arena *a*, bolove *b*, de qua omnis acor follicite eductus fuisset, aut denique sanguinis solis fæcibus *c* adjectis, perinde de sanguine acidus liquor stillet. Sed neque a sale marino esse, cum idem ex bovis *d* vitulive *e* sanguine acor obtineatur: quam quidem *Vieussenii* apologiam *Hombergii f* industria confirmavit. Is enim vir ex omnibus animalibus ejusdem

*r* *Hahn de sale fals.* p. XXI.  
*s* In l. de *Colic. pict.* In vitriorum indusiis congelatum sale[m] vidi, num marinus esset, non memini me inquisivisse.

*t* Conf. *Vieussens deux diss.* p. II.

*v* *Pitcarne de opera quam præstat acidum & alcali* p. 159.

*x* Cui sanguis diutius expositus fuisset *Pinelli* p. 228. 229.

*y* In præf. ad *Ghisi's Lettere*, in qua citantur experimenta Florentiæ facta a. 1747.

*z* Et si in bolo acidum sedet *Vieussens diss.* p. 18.

*a* *Traité des liqueurs* p. 66.

*b* *Deux diss.* p. 16.

*c* *Traité des liqueurs* p. 113.

*d* *Deux diss.* p. 36.

*e* *Traité des liqueurs* p. 61.

*f* *Memoir. de l'Acad.* 1712.  
 l. c.



indolis acidum spiritum paravit. Cl. *Navier* spiritum etiam putrescentium partium animalis acida natura imbutum reperit.

Alium etiam a marino sale in humanis humoribus acorem latere, phosphori argumento ostenditur, in quo non salis marini unice acor, sed etiam alius, vitriolici aut proprii ingenii, per experimenta eruitur *g*, & majori copia quidem, quam ille de muria acidus latex *h*.

Nobis adeo facillimum videtur, acidi spiritus, qui de sale fixo sanguinis adscendit, partem a marino sale esse *i*, partem ab acida vegetabili natura, quam nulla vis vitæ animalis penitus destruit. Inde intelligitur, quare ii liquores evidentissimum acorem & plurimum contineant, qui parum a natura vegetabili dissentiant, & celerrime generantur *k*: cur parcius ex ordine acoris copia in iis corporis animalis partibus sit, quæ longo vitæ labore generantur *l*, nullus ergo ex solidis *m* animalium partibus obtineatur, uti convincitur ex collata analysi ossium *n*, cartilaginum *o*, ungularum *p*, cornuum *q*, carniū *r*, tendinum *s*,

- g* Boerhaave l. c. prop. 101. p. 1248. 1249. 1250. *Macquer*  
*Hombert* l. c. p. 274. 275. l. c. p. 478.  
*Pentzki* de phosphoro urinæ. *o* *Barchusen* l. c. exp. 14.  
*h* *Pentzki* ibid. *p* *Barchusen* exp. 20. *Neumann* p. 1251.  
*i* *Henkel* rediiviv. p. 177. *q* *Barchusen* exp. 1. *Frank*  
*k* *Lac*, butyrum, adeps *de unguib. monstris*.  
*L. I.* p. 63. *r* *Neumann* l. c. p. 1206.  
*l* Ut in bile. *Barchusen* exp. 12. *B. Langrish*  
*m* *Gerike* Chym. p. 276. p. 54.  
*n* *Gorter* Chirurg. p. 24. *s* *Idem* ibid. p. 51. *Barchusen*  
*Neumann* ex edit. *Zimmerm.* exp. 13.

pilorum *t*, serici *v*, cerebri *x*, nervorum *y*, unionum *z*, calculi *a* humani. Facile enim intelligitur, vegetabilem cibum mutari plurimum, donec in solidas animalis partes mutetur. Male adeo *Dippelius b*, glandulas animalium acidum laticem stillare docuit, & si unquam ex car-nibus acidus liquor prodiit, eum adipi non separato non iniqui tribuimus *c*.

Cæterum in eo a *Vieussenio* recedere oportet, qui acidum in sanguine *fluctuare* scripsit, ut moneamus, non ideo sincerum in sanguine acorem esse, quia ex eo ab igne expellitur, uti in farina acor non est, etsi cum aqua pasta acefcit.

Non dissimulari debet, Ill. *Spielmannum* nullam acoris mentionem facere, quem in sanguine viderit.

### §. XLVIII. Terra sanguinis.

Sale privata terra simplicissima superest *d*,

*t* *Neumann* l. c. p. 1306.

*v* *Neumann* *ibid.*

*x* *Neumann* T. III. p. 656. ed. nov.

*y* *Pinelli* p. 163.

*z* *Neumann* p. 1285. ed. *Zimm.*

*a* *Boerhaave prælect.* de calc. p. 13. *Robinson of the stone* p. 47.57. *Slare phil. trans.* n. 157. *Maets* apud *Birch* T. IV. p. 252. De calculis stercoreis *Mem. de Chir.* T. III. p. 15. ex bile, puto, natis.

*b* *Vit, anim. mors & medic.*

p. 53.129. Negat ipse commen-tator p. 129.

*c* *Navier* l. c. p. 34. seqq.

*d* *Junker* edit. gall. T. I. p. 508. Hinc ossium animalium eluti cineres igni resistunt, & ad exploratorias *testas* seli-guntur. In phosphoro vitres-cibilis reperta est apud *Pentzki* p. 22. & in ossibus pariter hu-manis apud *Henkel in flor. saturnizante* p. 372. etiam terra vitrescibilis latet, si major vis ignis accesserit.



*Sect. II. ACOR. TERRA SANGUINIS. 205*

quæ ad calcem accedit, & cum acidis effervesceat & cum spiritu nitri fumante. Ejus iterum ad sanguinem ratio varie sumpta est. Cl. noster *Rhades*, cujus experimenta pleraque vidi *f*, & plurimi facio, æstimat ad  $\frac{1}{480}$  totius sanguinis. *Raymundus Vieussens* ex unciiis centum sanguinis grana obtinuit 165 *g*, quæ pars est  $\frac{1}{245}$ , ut aliquantum tamen terræ in *h* oleo empyreumatico lateret. Ex duodecim unciiis sicci sanguinis *Robertus Boyle* *i* terræ scrupulos habuit quatuordecim, sive  $\frac{1}{82}$ , si sicci cruoris portionem ad totum sanguinem subquadruplam feceris. In alio experimento ex unciiis 24 grana produxit 129 *k* sive  $\frac{1}{89}$ . *Clar. Flutton* æstimat ad 35 millesimas sive  $\frac{1}{28}$  *l*. *Verheyenius* ad duas drachmas ex unciiis septem sanguinis *m* sive  $\frac{1}{28}$ .

In hircino sanguine solam absque sale terram reperit *Johannes Hill n*.

Eadem terra multis modis etiam absque chemia demonstratur, in urinæ sedimentis, concretionibus fabulosis, offeis. In sanguine scorbutici & arthritici hominis sebaceum quid crassumque natabat, quod in gypseam & fere lapideam naturam abiit *o*; & arenularum etiam meminerunt Cl. viri, quæ in sanguine fuerint *o\**.

*e Boyle de origine qualit. & form. p. 239.*

*f De ferro sanguinis p. 10.*

*g Traité des liqueurs p. 28.*

*h Idem.*

*i Append. p. 6.*

*k Apparat. p. 46.*

*l l. c.*

*m p. 37.*

*n Mater. med. p. 874.*

*o Act. medic. Budissin. p. 73.*

*o\* C. Aug. a Bergen diss. cit. p. 26. lapillorumque Eph. Nat. Cur. Dec. I, ann. I. obs. 65.*

Eadem terra , de offibus aceti ope extracta ,  
in cryſtallos *p* vertitur.

§. XLIX. *Ferrum ſanguinis.*

Sed neque hæc terra ſimplex eſt aut ſincera.  
Dudum innotuit , terras paſſim *q* , & aquas  
minerales aliasve , ferrum continere , aut certe  
calcem , quam magnes trahit. In calculo  
humano particulas dudum *Liſterus* reperit ,  
quæ magnetem ſequebantur *r*. Inde repertum  
eſt , in ceſpitem cineribus , in fæce a deſtillato  
oleo lini & terebinthinæ ſ reliqua , inque plantarum  
plurimarum exuſtis *t* cineribus particulas conti-  
neri , de quibus magnes micas aliquas trahit.  
Aliquamdiu receptum fuit , hoc ferrum unice  
in plantis reperiri , & ab animalium partibus  
abeſſe : paulatim vero etiam in animalibus  
repertum eſt *v* , in lumbricis *x* , in bombycum  
acri liquore , & in variorum animalium offibus *y* ,

*p* Navier l. c. p. 9. & in meo  
memoire ſur la format. des os  
Exp. 81. 93.

*q* Conf. Galeacius l. c. p. 38.  
Comment. Bonon. T. II. P. II.  
& celebre experimentum ferri,  
quod *Stablius* ex argilla cum  
oleo paravit.

*r* De aquis medic. diff. II.  
p. 143.

*s* *Muſſchenbroeck* *Effais de*  
*phyſique* p. 289.

*t* *Memoir. de l'Acad. des*  
*ſcienc.* 1704. 1705. 1706. 1707.  
& 1708. *Neumann* p. 1552.  
edit. *Zimmerm.* & in lect. public.

anno 1732. editis p. 373. *Galea-*  
*cius* p. 29. qui equidem plus  
ferri in iis ſtirpibus reperiri  
addit , quæ circa ferrarias offi-  
cinas naſcuntur p. 31. 32.

*v* *Neumann* l. c. Addit  
*Menghinus*, circa ferrarias Ilvæ  
officinas hoc ferrum Ilvenſi  
ſimile eſſe *Comment. Bonon.*  
T. II. P. II. p. 262.

*x* In his abundat *Galeacius*  
p. 29.

*y* *Menghinus* p. 251. in cane  
perpaucum , in homine ex  
libris duabus quintam grani  
partem.



parca equidem copia, inque carne *z*, & in urinæ terra *a*. Primi in ipso hominum sanguine Itali reppererunt, *Josephus Badia b*, *Dominicus Gusmann Galeacius c* & *Vincentius Menghinus d*. Inde in Germania experimenta repetita sunt, tum a clarissimo juvene *Rhades*, me auctore & teste *e*, tum ab erudito anonymo, cujus experimenta in *hamburgensi diario* exstant *f*, aque Cl. *Widmer g*. In carbone calcinati sanguinis ferri aliquantum *Spielmannus* vidit. Ergo, si de sanguine in crucibulum recepto vivo igne celeriter aquam & oleum cum odore *h*, & flamma *i* dispuleris, abibit totus vitalis liquor in calcem rubram, croci martis hætenus similem. Huic obiter tritæ calci, si magnes propius adhibeatur, aut ferrum, magnetica vi armatum, ita subito ad eum magnetem, vis satis magna micarum de calce sanguinis partim advolabit *k*, & partim sponte adhærebit admoto *l*, aut certe adglutinabitur, si calor accesserit *m*. Sed etiam in sanguine, ad lenem ignem siccato, particulæ sunt, quas magnes adtrahit *n*, ægrius

*z* *Menghinus* ibid. *Galeacius* p. 29. Plus tamen quam ossa habent.

*a* *Schlosser de sale urinæ.* p. 15.

*b* *Opuscul. scientif. filolog.* T. 18. p. 242. in sanguine virginis epilepticæ.

*c* *Comment. Bonon.* l. e. p. 20. seqq.

*d* Ibid. p. 241. seqq.

*e* In *diff. de ferro sanguinis* Gorting, 1753.

*f* *Hamburgisches Magazin* T. XIII. n. 1.

*g* *Vom marggräflichen bade* p. 188.

*h* *Rhades* p. 6.

*i* *Idem* ibid.

*k* *Rhades* p. 7. Vocat particulas primi generis III. *Menghinus* p. 245. 247.

*l* *Menghinus* l. c.

*m* *Menghinus* p. 248.

*n* *Menghinus* p. 259.

equidem , quam in ea calce , quæ violenti ignis vim toleravit o.

Veram esse terram ferri constat , quod adjecto phlogisto quocunque corpore *p* , & etiam absque ea additione , si ignis *q* vehementior fuerit , micæ de sanguine extractæ in verum ferrum fusæ confluunt. Ex eadem materie cum ammoniaco sale , flores flavi parantur *r* , & siccus cruor cum sale lixivioso fusus solutusque ab adjecto spiritu vitrioli cæruleum Borussicum pulverem præcipitem deponit *s* , nullo aut ferro aut vitriolo adjecto. Cum gallarum solutione calx sanguinis *t* atramentum efficit , uti cum vitrioli oleo atramentum dare dudum *Malpighius* v viderat , & sedimentum a destillatione sanguinis superstes , cum acido vitriolico vitriolum subviride , atque martiali simile restituit *x*. De vitriolo cupreo dissoluto sanguis cuprum præcipitat , quod non potuit nisi ab admisto ferro fieri. Denique vitrum metallicum fusco colore tingit , ut ferrum solet.

Num vero hæc ferri terra in plantis *y* , inque sanguine jam sua adsit , num per calcinationem demum nascatur *z* oleo ad terram remisso ,  
quæri

o p. 260.

p *Hamburg. Mag.* 1. c.

q *Menghinus* p. 261.

r *Rhades* p. 11.

s *Idem ibid.* Hoc pigmentum Societati Regiæ scientiarum obtulimus.

t *Rhades* p. 12. *Hamburg. Magaz.* 1. c.

v *Posthum.* p. 3.

x *Rhades* l. c.

y Verum in plantis ferrum esse defendebat *Lemery* l. c. ann. 1706. 1708. Negabat plenum metallum esse , & per ignem demum nasci adseverabat *Cl. Geoffroi* ann. 1707.

z Ita in *Hamburg. magaz.* T. XV. p. 44.



quæri hactenus potest, ut tamen memores simus, absque ea violentia, tamen de sanguine & fero ferrum nasci.

Reperitur autem in hominis & animalium sanguine, ut in canis, equi, bovis, avium, anguillæ, ranæque cruore. Homo omnium plurimum habet *a*, inde quadrupeda *b* calida, parcius ranis est *c*, avibus *d* iterum minor copia, parcissima in piscibus *e*, in ovi vitello nulla (uti neque fixum alcali) *d*\*. Paratur potissimum ex ipso cruore, exque rubris globulis *f*. In fero *g* inque crusta pleuritica *h* & albumine *i* reperitur utique, sed minori longe copia, & omnium parcissimum in adipe *k*. Ex uncis sanguinis undecim Cl. *Rhades* grana calcis habuit 23 *l*, quæ eluta redierunt ad terræ ferreæ grana decem cum semisse, sive partem pene  $\frac{1}{503}$ . Alias ex uncis duodecim calcis cruoris grana prodierunt 24. terræ ferreæ tredecim grana cum dimidio, sive partes  $\frac{1}{427}$ , & alias paulum diversa ratio fuit. Anonymus *m* croci ferrei copiam ex duabus sanguinis libris aestimavit ad drachmas tres,

*a* Menghinus p. 251.

*b* Ibid. Crocus ferreus in homine habet se ad eundem in bove crocum uti 390. ad 306.

*c* Tertia fere pars calcis ferri est Menghinus p. 250.

*d* Menghinus ibid. & p. 257. 258. Dimidio minor portio est. quam quadrupedum.

*d*\* De Machy Instit. T. I.

*e* Menghinus p. 250. 257.

*f* Idem p. 255. 256. 257. 258.

*g* p. 254.

*h* Widmer p. 189.

*i* Idem ibid.

*k* Menghinus p. 252.

*l* p. 7.

*m* l. c.

grana 15, quae quidem copia multo major est, quam in prioribus experimentis. *Vincentius Menghinus* n ex globulorum humani sanguinis uncis duabus elicuit frcupulum calcis, quam magnes trahebat, eratque in ejus viri experimentis ferri portio ad sanguinem, ut 1. ad 1200.

Non obscurum caeterum est, unde ferrum in sanguinem adveniat. Nam & aquae bene multae ferrum a volatili acido dissolutum vehunt, & terrae pleraeque in toto terrarum orbe aliquam ejus metalli portionem continent, & plantae denique, quibus alimur, eodem abundant. Quare vero homo plus ferri in sanguine suo, quam animalia habeat, quadrupeda vero aves piscesque superent, non facile dixerò, nisi forte portio globulorum in eadem ratione sit, quod vix probabile videtur.

#### §. L. *Aer sanguinis.*

Et si alio loco de hoc elemento dicere praestat, non omnino tamen in chemicae analyseos historia omittendum videtur, cum non a putredine sola, sed imprimis etiam a vehementiori igne aer de sanguine liberetur, cujus omnino non exiguam portionem efficit. Cum enim Cl. *Hales* sanguinem suillum ex retorto vase vitreo igne ad plenam siccitatem usque urgeret, utique triginta & tres aeris pollices de sanguinis cubico



pollice in excipulum transferunt *p* totidemque unciis aquam repulerunt, quæ in eo excipulo continebatur. Quare, cum aer fere millies sanguine levior sit *q*, utique fere trigesima tertia pars totius sanguinis verus est aer, ita in reliquo humore dissolutus, ut nulla ejus bulla adpareat *r*. Cl. *Flutton* *s* aeris portionem ad 147 millesimas aestimavit; sed ii quidem calculi nimii sunt. Plus in cruore, quam in fero, aeris esse videtur. In aliis etiam humoribus reperitur. Valde spumat in spatio inani urina & succus amnii; in albumine multus est; ex sanguine difficulter prodit *Musschenbroeckio* teste *t*.

§. LI. *Alia experimenta.*

Nuper postquam chemia nostro aevo in Gallia propius ad perfectionem accessit, Cl. *Rouelle* *v* junior aliqua de vario sanguine docuit. Distinxit in carbone sanguinis natrum sive alcali minerale, salem marinum, salem febrifugo *Sylvii* similem, terram animale, terram ferri, carbonem, alcali fixum, ea ratione, ut partes ejus alcali essent 28. 29. ad salis neutrius 16 & 17.

Ex lixivio obtinetur sal marinus, sal febrifugus, natrum quod basis est salis marini. Post has lotiones in cineribus terra animalis est,

*p* *Vegetable statiks* exp. 49.  
*q* Ad aquam aeris pondus se habet uti 1 ad 860. fere, sed sanguis aqua gravior est, fere uti 1053. ad 1000. p. 40.  
*r* *Leemmenhoeck Philos. trans.*

n. 145. *Second memoire sur le mouv. du sang* p. 188. n. 3.  
*s* l. c. p. 7.  
*t* *Introd.* p. 88.  
*v* *Journ. Med.* 1776. *Juil.*

carbo & multum puri ferri a reliquis elementis & a terra animale separatum a magnete adtrahitur, aut si renueret, adtrahitur addito phlogisto.

Sanguis bubulus dat natrum, falem marinum, perpaucum febrifugum, terram animale, paulum carbonis, & ferrum. Portio alcali fixi aequalis est portioni falis neutrius.

Sanguis equinus similia dat, verum falem febrifugum: alcali vero fixum, quam neutri sales copiosius, æque cum marino copia, ut & 19. 20. ad 11. 12. fixi falis ad neutrum.

Sanguis vitulinus idem, sed sal febrifugus paucior: alcali fixi partes 14. 15. neutrius falis 11. 12.

Deinde peculiariter in ovillo sanguine sales reperit eosdem, paucissimum febrifugum, neutros sales aequales alcali fixo.

In sanguine porcino plus febrifugi falis quam marini, & neutri sales aequales alcali fixo. Sanguis porcinus & asininus plurimum falem dant.

Sanguis caprillus carbonem habet difficulter calcinabilem.

Adparet animalia nullo utentia sale marino, tamen eum in sanguine alere, cum nullum falem vegetabilem idem sanguis suppeditet. Necessè est ergo, ut vita animalis naturam vegetabilem totam mutet.

Adparet etiam, satis insigniter sanguinem diversorum animalium differre, quorum tamen idem fere alimentum est.

Ex lacte equino, verum inflammabilem spiritum elici lego. Sed de eo, caeterum parum probabili, humorum animalium elementò, rectius dicetur, quando de lacte sermo erit.



## S E C T I O III.

## S E R U M S A N G U I N I S.

§. I. *In universum.*

**H**OC nomine flavescentem , & aquosam sanguinis partem intelligimus , quae de cruore decedit , & ex continuato sudore aucta , subflavum efficit laticem , qui rubram insulam circumfluit. Ejus quidem laticis non simplex natura est , quamdiu tamen varia ejus elementa confusa unicum in liquorem miscentur , sapor feri falsus  $\alpha$  est , ut tamen ab igne falsedo augeatur. Lixiviosae naturae , aut acidae  $\gamma$  , signum nullum edit , dum sincerum est. Ponderus hujus laticis aliquantum , quam rubrae parti sanguinis minus est  $\zeta$  , uti suo loco exposuimus , caeterum quam aquae majus. Rationes aliquantum diversae reperiuntur. *Jacobus Jurin* ad aquam reperit esse , uti 1030 ad 1000  $a$  , & paululum aliter *Georgius Martine* uti 1032 ad 1000  $b$  , quando friget , calidum enim rarefcit , & ad aquam nunc est , uti 1021  $\frac{2}{3}$

$\alpha$  *Opuscul. scientif. fiolog. univers.* p. 479. *Rhades* p. 18.  
*T. XVIII.* p. 230. *Aqua hydropica falsa est* *Duverney* *Commerc. Lit. Noric* 1745.  
*Mem. de l'Acad. des scienc.* hebdom. 52.  
 1701. p. 152.  
 $\gamma$  *Boerhaave* *Elem. Chem.*  
*T. II.* n. 114. *Bohn de menstr.*

$\zeta$  p. 72. seqq.  
 $a$  *Diff. VIII.* p. 103.  
 $b$  *Edimb. Essays* *T. II.* p. 101.

ad 1000 c. *Johannes Tabor* fere eandem rationem facit, nempe 1032  $\frac{368}{551}$  d. *Georgius Erhard Hamberger* uti 1036 ad 1000 e & *Petrus v. Musschenbroeck* uti 1027 ad 1000 f. *Johannes Silberling* uti 1037 g (ad summum) ad 1000, & quando minimum, uti 1027 ad 1000. *Adolphus Fridericus Hofman* pondus feri ad aquæ pondus ponit se habere, pene uti 1034 ad 1000 h.

Idem pondus augetur in febre, ut serum hominis febrientis, sit ad serum sani hominis, uti 10363, 10381, 10399, & 10409 ad 10300 i, vel uti 571, 572, 574 ad 551 k. In Hibernia, humida insula, id pondus per febrem minus augeri auctor est *Cl. Ratty*, ut serum in febre sit partium in hibernia 10369 in Anglia 10408. Cum ætate hominis hoc idem pondus decrescere auctor est *Bryan Robinson* l, ut serum anno ætatis octavo pendeat 10277, anno 72 non supra 10266 improbabili certe experimento, cum æquum sit creditu, in universis corporis humani humoribus terræ portionem perinde cum senio crescere. Nisi

c Ibid.

d p. 64. uti 569. ad 551.

e *Physiol. med.* p. 5. nempe uti  $502\frac{1}{3}$  ad 845. Vaccini vero feri rationem ad aquam facit, uti  $505\frac{2}{20}$  ad eundem numerum, canini ut 500, agnini ut  $494\frac{3}{4}$ .

f *Instit. Phys.* p. 364.

g Nempe uti 299. 298. & 296 ad 288. de pondere specif. humor. corp. hum. p. 14.

h *Nov. hypoth. physiolog.* p. 6. nempe uti 1938. 1875.

i *Bryan Robinson Anim. Econ.* T. II. p. 430.

k *Tabor* p. 64.

l l. c. p. 425.



forte in senibus aqua, in juvenibus gelatinosa pars in fero dominatur. Sed agnini tamen sanguinis serum levissimum reperit *Hamburgerus*, ut sit ad humanum uti  $494\frac{3}{4}$  ad  $502\frac{1}{3}$  *l\**. Aliquanto albumine serum levius est, uti quidem expectari poterat, cum in albumine membranæ sint, partes vero solidæ fluidas pondere superare soleant. Ovi pondus est 1090 cuticulæ vero albæ ex fero natæ pondus 1082 *m*, habetque se serum ad albumen, uti 569 ad 575 *n*.

Lympha lac paulum pondere superat o.

## §. II. *Seri pars quæ cogitur five gelatinosa.*

In sanguine cruorem, lympham coagulabilem & aquam non coagulabilem distinguimus o\*.

In fero, aquam perpetuo fluidam reperimus, tum mucum, qui hætenus consistit, ut a fluida natura paulum distet, denique gelatinam, quæ variis ex causis tremulum in gelu cogitur. Quando totum serum commistum est, totum etiam addensatur, ut omnino in eo natura gelatinosa dominetur, neque aquæ copia, quæ in fero maxima est, vim potest impedire, quæ gelatinosæ moleculæ se trahunt. Aquæ vero portio tanta est, ut in decem libris partis albuminosæ feri libra *p* una uncia decem cum

*l\** *l. c.*

*m* *Davis philos. transact.*

*n.* 488.

*n* *Tabor p. 65.*

o Serum est ad lac uti 569 ad

567 vel 568. *Tabor p. 64.*

o\* *Butt p. 22.*

*p* *Vieussens traité des liqueurs*  
*p. 20.*

semisse repertæ sint, etsi facile credo *Johanni Bohn* *p*<sup>\*</sup>, qui incertam concrescibilis gelatinæ portionem esse monuit *q*. In fero sanguinis taurini tamen plus dimidia pars aqua est *r*, in humano fero longe major, ad  $\frac{21}{23}$  in *Cl. Rhades* experimento *s*. Fluiditas modico cum calore major quam grumo est, ut omnino cruor sponte coeat, serum vero de sano sanguine sudans non perinde sponte sua addensetur, inque sani pariter hominis cadavere fluidum semper reperiatur, nisi in animalibus calidioribus, quibus in pericardio in gelatinæ naturam sponte coit *t*. Sed in ejusmodi animalibus ipsa etiam urina *v* viscida est, & coagulo proxima. Multis tamen modis serum sanguinis cogitur. Extractum ignis ope de animalium carnibus serum, in frigore sponte sua stat, inque gelu abit: in eadem frigida pars certe lymphæ, de qua paulo plura dicere oportebit, in tenerimi gelu speciem colligitur. Deinde calor  $\alpha$  paulo major, quo aqua nondum ebulliat, graduum tamen 148 &  $\gamma$  150, & 160  $\gamma$ <sup>\*</sup> thermo-

*p*<sup>\*</sup> *Materies albumini analogæ* *Butt* p. 96.

*q* *De menstruo univers.* p. 464.

*r* *Birch* l. c. T. III, p. 235.

*s* p. 21.

*t* L. IV. p. 51.

*v* Urina cervi refrigerata ad sebi modum concrevit *Eph. Nat. Cur.* Dec. I, ann. 8. obs. 30. & semen arietis *Buffon* T. V. p. 21.

$\alpha$  *Boyle apparatus.* p. 133. *Petit epist.* II. p. 25.

$\gamma$  *Schwenke* p. 139. *Boerhaave*

*Elem. Chem.* T. II. exp. 116.

117. *Shebbeare* T. II. p. 32.

*Verduc* T. I. p. 355. In lymphæ eadem natura est *Verheyen*

L. II. p. 103. & in fero hydro-

pico non putrido *Blair miscell.* p. 128. *Heister de hydrocele*

p. 15. *Mem. de l'Academie des Sciences* 1701. p. 503. *Gmelin*

*Commerc. Lit. Noric.* 1745.

hebd. 50.

$\gamma$ <sup>\*</sup> Ita *Houlston*, qui negat prius cogi aut gradu 150 in-

flamm. p. 12. In fervida *Lassus*

lymph. p. 8.



metri *Fahrenheitiani*, utique ferofam fanguinis partem cogit, hoc cum discrimine, ut cruor ruber nulla fui jactura facta confiftat, ferum vero magnam fui ponderis partem prius amittat, quam in gelu coeat, quam partem ad duas tertias *Johannes Tabor* z, ad tres omnino quartas partes *Antonius de Heyde* a æftimat. Curioſius olim auditor noſter Cl. *Rhades* b ferum fanguinis in caloris 148 gradu *Fahrenheitiano* opacum reddi, ad 150 vaporem emittere, ad 151 in gelatinam cogi, ad 152 albuminoſum coagulum imitari adnotavit. In Cl. *Franciſci Boiſſier* experimento, reductis gradubus, lymphâ gradu fere 141 incipit albefcere, gradu vero 158 vel 160 cogitur in corium c. Accuratius Cl. *Butt* cogi filis exortis, & una plurimum exhalare.

Angli nuperi duas in fero partes diſtinguunt, quæ alio & alio calore cogantur, lympham quæ 114<sup>mo</sup>, 120, & 140 c\* gradu fahr. coeat, & ferum quod 150 aut demum 160 c\*\*. Cum vero nullum aliud ſignum diſcriminis addant, videtur alia pars feri fanguinis plenior fuiſſe aqua, & difficilius coagulabilis c\*\*\*, alia vero gelatina magis abundaſſe, ut minori calore coiverit c\*\*\*\*.

Jam Cl. *Butt* in eo fero partem aquoſam ſalinam & acrem diſtinxerat, a coagulo diverſam, quod inſipidum ſit c\*\*\*\*\*, ferum in fila

z p. 64.

a Obſ. 87.

b l. c. p. 17. 30.

c *De l'inflamm.* p. 240.

d *Houſton inflamm.* p. 12.

c\*\* *Idem* ibid.

c\*\*\* l. c. p. 53.

c\*\*\*\* Ib. p. 87.

c\*\*\*\*\* p. 26.

concrefcere non ita lympham c\*\*\*\*\*, laxiori  
effe compage c†, & plurimum exhalare, a  
drachmis 25 ad duas cum femiffe c††.

Quæ omnia videntur eo redire, ut ferum  
pro lymphâ habeat, aut potius feri partem c†††,  
a qua fibræ funt, cum parte lymphæ coagulabilis  
miftæ. Ita Cl. *Hewfon*. Serum fuum idem  
cum lymphâ facit Cl. *Butt* c††††.

Coagulabilis ifta indoles feri fanguinis pri-  
mum *Guilielmo Harveio* d innotuiſſe videtur,  
qui ferum coctum in mucilaginem abire vidit,  
quod inde experimentum a *Bartholino* e, *Pec-  
queto* f, aliisque repetitum eſt. Poſt eum Cl.  
*Golzadius*, *Hieronymo Barbato* g Patavii eam-  
dem feri naturam demonſtravit, & prior forte,  
& ante a. 1650 Hibernus medicus aliter per-  
ſuaſo *Frizimelica* eam denſabilem indolem  
oſtendit h.

Sed etiam abſque tanta ignis violentia ferum  
fanguinis, aut ſponte per quietem in vivo ani-  
male cogitur, aut a morbis. A quiete quidem  
coire sæpe vidi, in animalibus minime aut  
calidis, aut grandibus, neque enim alia alba  
illa gelatina eſt, quæ circa vulnera arteriarum i

c\*\*\*\*\* Ib.

c† p. 30.

c†† Ib.

c††† Ib.

c†††† p. 33.

d De gener. anim. p. 161.

e Lact. thoracic. p. 46. hiſt.

49. Cent. III. anat. renov.  
p. 134.

f Diff. anatom. p. 42.

g De ſero ſanguinis p. 153.

h Apud Binninger Centur. 1.

obſ. 13, qui idem teſtis ocu-  
latus fuit.

i Second memoir, Exp. 38.



& venarum plurima circumfunditur , & quæ eadem in ipsis vasis sanguinem vehentibus non raro adeo firme consistit , ut per solida vasa ruber cruor sibi vias aperiat *k*. Eadem , procul dubio , etiam in homine partem ejus operculi constituit , quod magnorum vulnerum arteriorum ostia claudit *l*. In ligato ductu thoracico lymphæ vivo in animale in gelu constitit.

Deinde ad serum sanguinis pars magna polyporum pertinet , quam pallor *m* ipse prodit , & quæ fecit , ut vetusti scriptores polypos cum adipe *n* , cum sebo *o* , cum medulla *p* , cum pituita *p*<sup>\*</sup> , cum gelatina *p*<sup>\*\*</sup> , cum muco *q* , cum tendine denique *r* compararent. Ex filamentis albuminosis polypos olim Samuel Col-

153. 154. 155. 157. 163. 167.  
171. 176. 183. 189. *Rennus*  
*p*. 65.

*k* Exp. 180. 183.

*l* v. g. *Petit Mem. de l'Acad. des scienc.* Pelliculam vocant *Phil. Transact.* 1755. n. 10. quæ super vulnus nascatur , & septum pellucidum *la Fosse obs.* p. 73.

*m* *Chiflet obs.* 16. Polypi albi & subalbi *Melpegh. posthum.* p. 45. *Barrere obs. anat.* p. 100. ed. nov. p. 104. seqq. *Vandermonde T. II.* p. 97. 98. *Pissinius de Diabete* p. 131. ex *Helidæo Paduano*.

*n* *Welsch episagm. obs.* 16. *Hofman de pingued.* n. 23. Pingues adeo credit *Ill. Boehmer* , ut etiam inflammabiles faciat *de præcav. polyp. gener.*

*o* *Hipp. Boscus in facult. anat.*

*p* *Smetius miscell. T. X.* p. 523. *Blancard chirurg.* p. 431.

*p*<sup>\*</sup> *Tulp. L. I. obs.* 27. *Pissinius l. c.* An 20 uncias in dextro ventriculo *Blas L. I. obs.* 19.

*p*<sup>\*\*</sup> *Severin de occult. abscess.* p. 277. in utroque cordis sinu , venis & auriculis cordis *Bayle apoplex.* p. 52. 53. Coagula lymphatica *Sauvages de inflammat.* p. 240.

*q* Mucus in membrana contentus polypum efficiebat *Boehmer l. c.* Cum pituita comparabat *Blas L. I. obs.* 19. & in *Hornungi cista* similia reperiuntur p. 456.

*r* *Pechlin de nigred. æthiop.* p. 16.

*lins* s. deduxit, & *Tyson* s\*, & polyporum fundamentum lympham esse Ill. *Senac* t auctor est.

Iterum vix potest dubitari, quin idem t\* sanguinis serum materiem *crustæ* illi satis celebri præbeat, quæ in sanguine natat, quoties cum inflammatione, pulsuque duro, febris acuta conjungitur v, & quam vulgo *pleuriticam* vocant: etsi etiam in febre intermittente v\*, & in angina, in catarrho v\*\*, in hæmoptoe v\*\*\*, in spasmo maxillæ, in colico dolore x, in rheumatismo y, in podagra z, in malignæ febris a, & variolosæ primis diebus, in ipsa etiam a\* febre flava, in phthisi, non alias pertinacior, ut etiam in quinquagesima venæ sectione crusta sanguine innataverit, demum in hydrophobia b, in hominibus ab hydrargyri usu salivationem patientibus b\*, in ipso scorbuto b\*\* passim reperitur, & a femi-

s *System. of anat.* p. 770.  
 s\* *Anat. of a pygmy* p. 10.  
 t T. II. p. 460. tum *Bartholinus* L. I. hist. 52. C. *Bauhin theatr. anat. ex Vesalio* p. 218. *Albam crustam describit Malpighius*, ejus interstitia sanguis ruber occupet de *polyp.* p. 126.  
 t\* *Lind fever infect.* p. 283.  
 v *Schelhammer de febr.* p. 55.  
 In febribus intermittentibus sanguis spissus & pituitæ similior *Cartheuser de febr. intermit.*  
 v\* *Quesnai de la saignée* p. 408. nov. ed.  
 v\*\* *Quesnai ibid.* p. 400.  
 v\*\*\* *De Haen* II. p. 24. 43.

T. III. p. 132. *Weber auszüge von disp.* I.

x v. *Swieten* T. III. p. 169.  
 y *Veratti* p. 57. *Arcissemski curat. pod.* p. 96. 97. *Quesnai de la saignée* nov. ed. p. 400.

*De Haen* II. p. 24. *Stuhbe phlebotom.* p. 123.

z *Coste sur la goutte* p. 21.  
*De Haen rat. med.* II. p. 24.

a *Barker diff. on the present. fev.* p. 10. *Frank alleluja* p. 329.

A de *Haen rat. med.* p. 166.  
 b *Journ. Encyclop.* T. I. p. 83.

b\* *Letsom dispens.* p. 215.  
*Weber disp. ausz.* I.

b\*\* *Medical Transact.* Vol. II.



narum gravidarum sanguine raro tota abest *c*, & demum in sano homine *c*\* non raro adparet. Multa quidem in hac crusta paradoxa sunt, quorum causas nondum recte tenemus *d*. Magis manifestam oriri, quando sanguis arcto vase excipitur, minus si amplo, magis iterum si sanguis insigniori saltu eruperit, vidit Cl. vir *Thomas Schwenke e*; & addit Cl. de *Haen*, sanguinem, quo magis guttatim fluxerit, & quo rapidius, eo densiorem innatantem habere crustam *f*.

Sanguinem subito in locum valde frigidum missum crustam negat habere idem Cl. de *Haen*. Sic etiam Cl. *Haguenot* in eadem venæ sectione sanguinem primum fluidum, alterum tertiumque corio tectum vidit, inde denuo fluidum; & longe trajectum per aerem fluidum fieri. *Weberus* nullam nasci crustam, si parvum venæ vulnus fuerit *f*\* aut sanguis lente moveatur *f*\*\*, aut sanguis bacillo agitetur *f*\*\*\*. Deinde, de eodem homine, eodem tempore, missus sanguis in aliis vasculis crustam impositam habet, in aliis nequaquam *g*. Denique sanguis sub ea crusta non ideo densior est, & niger fere, sæpeque potius magis dissolutus subest *h*.

*c* De *Haen* rat. med. p. 109. & P. II. p. 25. *Quesnai* l. c. p. 400.

*c*\* *Butt.* p. 35.

*d* Theoriam lege, si placet, apud Cl. *Shebheare* T. II, p. 21. Quid sit ea pellis, profitetur se nescire G. v. *Swieten* T. I, p. 652.

*e* l. c. p. 160. De *Haen* T. III, p. 130.

*f* p. 103.

*f*\* *Auszüg von disp.* I. *Carrere inflamm.* p. 61.

*f*\*\* *Carrere* ib.

*f*\*\*\* p. 62.

*g* Conf. *Cleghorne* p. 246.

*h* *Idem* p. 104, 108.

Utrumque hæc obscura sunt , primum tamen facile ostenditur , de fero crustam nasci *i* , cum de cruore separetur *k* , & grumus ruber *l* suis manifestis dotibus diversus subsit , neque idem in eam naturam ullo modo mutetur , aut crustæ partem efficiat *m* ; neque huic sententiæ obest , quod præter crustam serum fluidum nonnunquam adest. Recte adeo hanc crustam cum polypis *Andreas Pasta n* comparavit , cumque albumine *Franciscus Quesnai o* ; recte cum reticulata lymphatica placenta , in qua globuli stagnant *Cl. Hewson*.

Deinde valde probabile est , a vehemente fere semper cordis actione fieri *p* , ut sanguis in principio pleuritidis nondum coactus , secundo tertio quatorve die crusta pleuritica obducatur *q*. Una fere pulsus durus & magnus conjungitur *r* , etiam quando febris abest *s*. Porro eo durior & densior nascitur , quo major febris , duriorque pulsus est *t* , tantum ne febris de genere si

*i* Sauvages l. c. *Quesnai de la saignée* ed. nov. p. 414.

*k* Idem ibid.

*l* Schwenke p. 155. *Veratti* l. c.

*m* *Quesnai de la saignée* ed. nov. p. 400. 408.

*n* *De motu sanguinis* p. 70. 76.

*o* l. c. p. 414.

*p* *Quesnai* l. c. p. 400. 408. *Schwenke* p. 163. *de Haen &c.*

*q* *Borrhaave prax. med.* T. I. p. 265. *G. v. Swieten* T. III.

p. 169. T. I. p. 77. *Pisoni spicileg. curat.* p. 122. *de Haen*

p. 102. *In variolis B. Langrish plain direct. on the smallpox* p. 5.

*r* *Damianus Sinopeus parerg. med.* p. 331.

*s* Idem.

*t* *Schwenke* p. 156. *Quesnai* p. 408. *Sinopeus* p. 387.



putrido maligno , a qua *v* crusta absit , & sanguis dissolvatur *v*\*. Hinc in febribus catarrhalibus crusta mollis est , dura in pleuritide *x*. Frigore etiam per aerem dominante frequentiores crustæ reperiuntur *y*.

Non ideo a calore febrili nascitur *z* , qui nunquam eo adfurgit *a* , ut gradum 148 attingat *b* , serumque cogere possit. Sed neque a dissoluto sanguine provenit *c* , cum eadem causæ & sanguinem dissolvant & serum , neque me dubia Cl. v. *Swieten* ab opinione dimovent *d*. Cum enim calor 148 graduum lympham , omnesque humores lymphæ similes cogat , in crustam pleuriticæ similem , etiam ea crusta ad densationis potius , quam ad dissolutionis genus pertinet. Totus in pleuriticis sanguis perinde cogitur , cum color faciei eodem cum crusta sanguinis pallore sit *d*\*.

Manifesto demum mihi videtur , crustam pleuriticam serum esse , cujus vis adtractilis ita aucta sit , ut serum ad serum vehementius adhæreat , a cruore minus trahatur *d*\*\* , quoad

*v* Kirby febr. malign. ibid. 1774. 4.

*v*\* p. 82. 83.

*x* *Memoir. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 185.

*y* *Burggrav. de aere aq. & locis Francof.* p. 80.

*z* Conjectura fuit Cl. *Quesnai*, qui propriam opinionem candidus antiquavit *traité des fièvres* T. I. p. 119.

*a* Calor in pleuritide 102. 104. graduum *Cleghorne* p. 245. 246.

*b* p. 58.

*c* *Quesnai de la saignée* p. 406. febr. contin. T. II. p. 36. 37. 39.

*d* p. 652.

*d*\* *Schwenke* p. 164. Vide de lymphæ in calidis morbis coagulatione *Senac* T. II. p. 94.

*d*\*\* *Lind fever infect.* p. 283.

solum serum secedendo grumum deferat, & ex natura sua coagulabili in crustam consistat.

Iterum, etiam in vivo homine serum nonnunquam in laminas concrevit *e*, & vulgo lymphæ pulmonem intus infarcit *f*, densumque & solidum efficit; eademque per superficiem visceris exsudans, notissima crusta hoc viscus obducit *g*, inque aquis hydropicorum, sponte sua in membranas abit. Eadem in aneurysmaticis faccis videtur spuriam membranam arteriæ addere, quæ ejusmodi receptacula obduci solent *h*.

Verum paucis ab annis alia omnino sententia Anglorum Cl. *Davies*, *Hewsoni* & aliorum e diametro contraria priori. Crustam nempe pleuriticam fieri a dissolutione sanguinis, quæ ipsa sit inflammationis effectus. Adtenuatam lympham globulos nunc male sustinere, ut secedant, fundumque petant. In homine debili cum ipsa debilitate corium pleuriticum augeri. Eo mollius esse sanguinis coagulum, quo plus corii secessit, quod eo referas, duriora lymphæ quam sanguinis coagula esse *h*\*.

Hæc

*e* Binninger Cent. V. obs. 4.

*f* De phthificis consentit Ill.

Senac T. II. p. 467. De peripneumoniacis vide opuscul. patholog. obs. 14.

*g* Senac T. II. p. 97. 424.

425. Valcarenghi medic. ration.

p. 100. 101. Klauwig observ.

12. Galer. di Minerv. T. VII.

p. 19. De Haen rat. med. P. II.

p. 17. 18. 43. &c.

*h* Opuscul. patholog. obs. 19.

Petit Memoire de l'Acad. des

sciences 1736. T. 10. f. 6. Riva

Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I.

obs. 18.

*h*\*ip. 71.



Ita cruor , qui sponte sua molliter cogitur *b\*\** , nunc etiam mollior adparet , dum co-  
rium lymphaticum purum in tenacius coagulum  
abit.

Eadem procul dubio materies est , quam  
serum ad polypos suppeditat *i*.

Ex sero etiam , neque ex cruore , sed ex  
albuminoso liquore exhalante , & membranæ  
aquarum hydropicarum , & ligamenta vitiosa  
formantur , & *Merreti* membrana oritur. Pri-  
mus enim vir Cl. partem sanguinis innatan-  
tem , serumque adeo , frigore in glaciem coac-  
tam , & post regelationem iterum frigori expo-  
sitam , in membranam abiisse vidit *i\** : frigore  
enim serum sanguinis , & citius quam aqua ,  
tardius quam cruor , in glaciem vertitur *k*. Idem  
serum parum a gelu rarefit , paulo tamen quam  
cruor magis.

Liquor de cute exhalans , atque sub epider-  
mide per vim emplastrorum vesicas cientium  
eductus , in crustam sæpe etiam coit , pleuriticæ  
similem *k\**.

Si paulo lentius cruore serum coit , infirmiora  
tamen idem abit coagula , sive a vitæ viribus ,  
sive a morbo , sive a calore vehementi , sive  
a spiritu acido , aut a vini parte spirituosâ

*b\*\** p. 77.

*i* De Haen P. II. p. 17. &c.  
quem vide erudite ostenden-  
tem , ab eâ materie etiam pus  
nasci : etiam mihi quidem &  
sedes , & natura puris inflam-

mabilis , hætenus repugnare  
videntur.

*i\** Birch. T. I. p. 354. anno 1663.  
*k* Diebold de aere in liquid  
human.

*k\** Hensson inquir. T. II.

gatur. Ita recentiores inprimis galli monuerunt *l*, & ipse *Petitus*.

Major etiam vis ignis serum in speciem gummi fragilem & friabilem *m*, neque porro solubilem convertit, ut summam denique duritatem acquirat *n*. Sed etiam pleuritica crusta ficcata in elasticam tenacem membranam *n*<sup>\*</sup>, & cum stillatio vini liquore in durissimum corium abit *o*: & serum, leni exhalatione, sensim in gluten tenacissimum transit, collæ scriniariorum non dissimile *p*. Denique albumen ficcatum in gummi insipidum, & friabile addensatur *q*. Eadem crusta, ne res conjunctas separemus, in aqua, & in aqua nitrata, vix dissolvitur, utique vero in spiritu alcalino volatili & in sale lixivioso fixo. Sponte etiam sua deliquescit in fætidum oleosum liquamen, quod tamen naturam ab igne, & ab acore meraco, coagulabilem retinet. *q*<sup>\*</sup>

Puris a sero originem ita nuper deduxerunt Cl. viri, ut ex eo per putredinem generaretur, & sedimentum a sero puris simile subsideat. Contra ea Cl. *Hendy* a pure lympham suis notis distinxit; & mihi natura inflammabilis in pure nimis manifesta est, quæ a sero & a crusta pleuritica absit.

*l* *Helvetius éclaircissens* p. 16. *Petit Memoir. de l'Acad.* 1732. p. 392. 393. *Quesnai de la saignée* p. 13. ed. vet. *Senac tr. du cœur* T. II. p. 92.

*m* *Eller Mem. de Berlin* T. XI. p. 25. T. VII. p. 7.

*n* Offi comparat *Lancisius* l. c. p. 10.

*n*<sup>\*</sup> *Lind fever. infect.* p. 283.

*o* *Schwenke* p. 166.

*p* *Rhades* p. 17. A. de *Heyde* obs. 67.

*q* Sæpe vidi, tum *Neumann* ex edit. *Zimmermanni* p. 1297. De ovo *Sturm phys. gener.* p. 533. & *Eph. Nat. Dec. II. ann.* III. obs. 58.

*q*<sup>\*</sup> *Gaber misc. Taur. II.* p. 92.



§. III. *Eadem dotes in lymphâ reperiuntur.*

Idem sanguinis serum, aliquando modico rubore *r* tinctum, alias omnino pellucidum, *Lymphæ* nomine in peculiari vasorum genere movetur, quod descripsimus. Fuerunt utique, qui negarent, lympham per vasa aquosa mean-tem sero sanguinis similem esse: fuerunt qui eam lympham exhalare *r*<sup>\*</sup> scriberent; fuerunt contra, qui lymphâ magis aquosum serum *s* facerent, magisque falsum. Verum certum est, lympham recentem, perinde de gelatinosa *t* natura esse, perinde, post aliquam exhalantis portionis jacturam, ut serum sanguinis cogi *v*; in ligato ductu thoracico collectam sponte in gelu coivisse; susceptam de vaseulo lymphatico adservatamque etiam sponte coagulari *x*, & cum vitriolo *y*. Sed etiam falsum saporem *z*

*q*<sup>\*\*</sup> Similia ejus esse, quæ feri sanguinis, phænomena *Lassus* p. 25.

*r* *Pechlin observ.* p. 147. *Peyer obs.* 13. *F. Sylvius diss.* VIII. n. 7. *Verheyen L. II.* p. 106. *Flavum Deusing de funct. microc.* diss. VII.

*r*<sup>\*</sup> *Pechlin ibid.* *Verheyen ibid.* *Lister de humor.* c. 40. p. 390. ed. bat. *Malpigh. posth.* p. 162.

*s* *Elemens de physiol.* p. 46. *t* *Drelincourt, Nicolaus Ste-nonis f.* apud *Bartholinum Centur. IV. epist.* 79.

*v* *Bartholin vas. lymph.* p. 79.

*lymphat. homin.* p. 44. 46. *Diermerbroeck anat.* c. 13. *L. I.* *Wepfer dub. anat.* p. 99. *Brunner de pancreate* p. 61. *de gland. duoden.* c. 4. *Bellin de motu cord.* p. 44. *Verheyen L. II. Tr.* I. p. 22. *Deusing diss.* 7. *de function. microcosm. & accurate in Donaldi Monro diss. de hy-drope* p. 17. 18.

*x* *Kohlhans apud Barthol. de-fens. contra Riolan.* p. 78. *In gummi coit in hepate Pechlin obs.* p. 147.

*y* *Malpigh. posthum.* p. 162.

*z* *Rudbek insid.* p. 80. *Bohn pregymn.* 13.

cum fero utique communem habet, & reliquas dotes *a*.

Idem, aut paucissimis dotibus diversum ferum, iterum reperimus in albumine *b*, in vapore exhalante pericardii, pleuræ, peritonæi, etiam ventriculorum cerebri *b\**, in halitu, quo minimæ cellulæ corporis animalis replentur, in hydatidibus, in hydropicis aquis, quæ ex vapore congesto nascuntur, in denso infarctu minimarum cavearum pulmonis totiusve corporis. Omnino enim his liquoribus natura coagulabilis, & sapor salus, & natura ab acore densabilis & cum vini spiritu *b\*\**, & reliqua phænomena communia sunt.

Albumen ovi plurima etiam similia habet, minus tamen falsum est, minus, dum cogitur, de suo pondere amittit; cum acidis eadem patitur *b\*\*\**, neque a lymphâ coagulabili differt, nisi membranâ admistis & mitiori natura. Siccatum in friabilem succini speciem mutatur *b\*\*\*\**, & crustæ pleuriticæ simillimum est *b\*\*\*\*\**.

Hydropicum ferum *c*, dum recens est & a putredine purum, perinde subfalsum est *c\**, & sponte in

*a* Bartholin *vas. lymphat.* p. 79.

*b* Ut densius est, ita aliquanto facilius in fervida coit, de Haen p. 97. Poerner p. 32.

*b\** Laffus p. 21.

*b\*\** *Id.* ib.

*b\*\*\** Butt p. 37.

*b\*\*\*\** Bresl. *saml.* 1724. p. 27.

*b\*\*\*\*\** Butt l. c. p. 29.

*c* Themel obererzgebürg-jour-

nal T. II. p. 121. Rhades p. 30. Serius aliquanto Gmelin *Com. Lit. Nor.* 1745. hebdom. 52. Vieussens *obs. d'anat. & de prat.* p. 198. Sedimentum gelatinosum & mucosum relinquere, quando exhalavit Senac T. II. p. 421.

*c\** Duverney *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1701. p. 152. Blaudum albuminosum Gmelin.



membranas præter naturam coalescentes abit, & a calore cogitur, & ab alcohole, acidisque liquoribus *c\*\**. Idem, perinde ut sanguinis serum, coagulabilem naturam deponit *d*, quando adservatum corrumpitur, ut vel totum renuat cogi, vel certe ejus pars aliqua ad ignem exhalet. Eadem liquoris hydatidum natura est. Quin & ipse mucus cogitur, & adservatus per putredinem naturam coagulabilem totam exsui, aut minorem retinet. Plasticam tamen *d\** indolem non continuo deponit, tunc etiam quando fætet.

Video Cl. virum, quem plurimi facio, & merito, contraria omnino docere, ut pericardii humor in cane, & pectoralis vapor & abdominis, ut recentissimus fuerit, totus exhalet *d\*\**, idem demum cum tempore coagulabilis fiat, & per quamdam degenerationem *d\*\*\**. Verum nimis certum & ab omnibus receptum est, lympham, serum, sanguinem, adipem, humores omnes animales, nullo excepto, per putredinem naturam coagulabilem exsui, inque fluidam aquæ indolem transire: nimis manifesta est analogia liquorum exhalantium cum lymphâ; nimis certo ipse acore & vini spiritu ejusmodi liquores & ipsum ovi colliquamentum in quo fetus natat, in caseum coivisse vidi. Sed etiam in cellulis aut cuti subjectis, aut musculorum carnibus interpositis, eam gelatinam sæpissime vidi, non

*c\*\* Lassus p. 21.*

*d n. 4. p. 133.*

*d\* De Haen.*

*d\*\* Cotunn ischias nerv. p. 23.*

*24. 25.*

*d\*\*\* p. 23.*

sine rubore. In tumore femoris succus in calida coagulabilis stetit *e*, & in mammæ parte cancrofa *f*, densaque. Sed in scrophulis, venereo-que malo infectis corporibus lymphæ adeo spissa *g* visa est, ut sanguinis de amputato membro fluxum sisteret. In iisdem, venereo malo tactis, & venæ materie alba pituitosa plenæ reperiuntur *h* & lacerti pituita obducti, & eadem in coarticulationes ossium, & circa periosteæ congesta hæret *i*. In morbis pulmonum diuturnis lymphaticum infarctum jam tetigi *k*.

Non omnino eadem est porro lymphæ, quæ de carnibus animalium ab aqua calida educitur, juriqûe naturam alibilem impertit *k*\*. In jure vitulino  $\frac{25}{56}$  *l* ejusmodi glutinosæ materiæ fuerunt, quæ in gelu consisteret. A calore quidem cum aqua mista, superveniente frigore, & nonnunquam modico acidi liquoris *m* momento, in tremulum tenerumque gelu consistit, ut in culinis notissimum est. Hanc gelatinam ex carnibus & ossibus extractam Cl. *Lassus* experimentis subjecit. In frigore flexilis fit & tremula, inodora, insipida, elastica, quæ exhalante aqua in durum corium abit. In fervida soluta a solo spiritu vini cogitur; ab

*e* Mem. de l'Acad. de Chir. & crusta coriacea de Haen II. T. I. P. I. p. 151. P. II. p. 66. p. 24.  
ed. 12.

*f* Becket de cancro p. 165.  
conf. Senac T. II. p. 98.

*g* Petit Mem. de l'Acad. des  
scienc. 1732. p. 394.

*h* Astruc de morb. vener.  
p. 652. Polypus frequens in  
venereis Malpigh. polyp. p. 128.

*i* Nic. Massa de morbo nea-  
pol. p. 109. 110.

*k* Opusc. pathol. obs. 14. Se-  
nac T. II. p. 467.

*k*\* Conf. Butt p. 54.

*l* Comment. Bonon. T. II. P. I.  
*m* Viridet du bon chyle

p. 153.



acido minerali solvitur, non ita ab oleo tartari. Multis adeo dotibus à lymphâ differt, admisto, ut puto, in ossibus oleo *m*<sup>\*</sup>. Et a sanguine gelatinam abesse, & a solidis, mireris Cl. *Butt* *m*<sup>\*\*</sup> excidisse, cum ex solidis quidem partibus manifesto educatur, manifesto pariter lymphâ & sanguinis, & magnorum cavorum, in gelatinam sola ignis ei consistat.

Junioribus animalibus aliquanto plus ejusmodi gelatinosi laticis inest *n*. Video Ill. Virum o ex vetustis gallis, & ex corde, plus gelatinæ expectare; sed negat Cl. *Freke* omnino ex vetulis animalibus gelatinam obtineri, & certe vulgo junioribus potius animalibus, vitulique, non bovis carne ad parandam gelatinam coqui utuntur, & consentiunt experimenta Cl. virorum *Beccarii* & *Montii* *p*, quibus constat, ex bubula carne omnino gelatinam non potuisse parari.

Alia animalia aliis magis concrelescibiles humores habent, herbivoraque magis quam carnivora. In cochlea humor ipse vitalis in gelu *q* modum consistit, & ex cancrorum *r* lapidibus gelatinæ, neque exigua portio obtinetur, sed duodecim omnino grana ex lapidum duabus drachmis.

Neque deest piscium carni sua gelatina, minime Italis ignota *s*, exque nonnullis aquatiliū speciebus lentissima *t*. In universum tamen

*m*<sup>\*</sup> *p*. 17.

*m*<sup>\*\*</sup> *p*. 51.

*n* *Willis de cerebro* *p*. 134.  
ed. Lond. 1664. 8.

*o* *Senac* T. II. *p*. 99.

*p* *p*. 242, 243. *Willis* l. c.

*q* *Lister de cochleis* *p*. 30.

*r* *Cartheuser mater. med.* P. I.  
n. 4.

*s* *Valisner oper. omn.* T. III.  
*p*. 167.

*t* *Cheyne de sanit. infirm.*  
*p*. 38.

gelu de piscium, ranarum, cancrorumque carnibus minus copiosum obtinetur *v*, neque perinde facile consistit *x*, ut ex viperæ carne tertiam ejus copię partem suppeditentur, quam vitulina caro solet *y*. Denique in jure cancrorum, aliorumque aquaticorum animalium aliqua urinosæ indolis fere signa adparent *z*.

§. IV. *Serum in continuo tepore dissolvitur.*

Eadem quæ cruori, etiam sero natura est, ut leni calore, etiam quinquaginta graduum thermometri *Fahrenheitiani*, intra paucos dies deliquefcat *a*, tenuius fiat, putrescat *b*, fæteat *b*<sup>\*</sup>, ad urinosam indolem accedat *c*, cum acore ferveat, cæruleos plantarum succos in virides mutet, aerem generet, volatile demum avolet: serius equidem, quam ruber cruor *d*. Idem quando computruit, naturam coagulabilem non

*v* *Comment. Bonon.* I. c. p. 100. seqq.

*x* *Ibid.* Cancrorum jus non concrevit, ranarum jus debiliter.

*y* *Ibid.* p. 102.

*z* p. 91, 92.

*a* *Boerhaave Elem. Chem.* T. II. n. 115.

*b* *Pringle* p. 416, *Butt* p. 33. *Collin de arnic. exp.* 4. *Mesny* apud III. *Targioni*. Citius putrescere quod rubore tinctum sit *Hendy*.

*b*<sup>\*</sup> *Intra* 2, 3. diem *Butt* p. 26.

*c* *Rhades* p. 28, 29. *Boerhaave Elem. Chem.* T. II. p. 350.

*Poerner de album. ovor. & seri sang. convenient.* p. 32.

*d* *Philos. Trans.* n. 442. *Schwenke* p. 134. Lympha in asciticis & pectoris hydrope vix putrescit, nisi adsit visceri corruptio *Bohn. lethal. vuln.* p. 149. Equidem *Cl. Lorry* de sanguine partem rubram ultimam putrescere des *alimens* T. I. p. 417. & sanguinem sero privatum vix contabescere scribit p. 100. Verum hæc de liccato & ab omni humore nunc libero sanguine interpretor. Nimis enim ex anatome novi, quam facile partes rubræ & sanguine plenæ computrescant.



continuo , etiam quando fætet *e* : sed tamen tandem totam exsui , ut porro neque ab igne , neque a vehemente acore , neque a stillatio vini liquore cogatur *f*. Per febres alcalinæ naturæ propius accedit , deinde fætet , & cum acore fervet , demum in corium abit insolubile. Cum sirupis cæruleis eo in statu virorem facit , & cum spiritu vitrioli fervet , equidem inter acidos liquores solo *f*\*. Eadem & albumini *f*\*\* , & amnii aquæ *g* , & ichthyocollæ *h* , & aquæ hydropicæ *i* , hydatidumve *k* accidunt , ut adservatæ & putrescentes porro eam naturam deponant , quæ ad gelatinam tendit , & nunc ad ignem totæ exhalent.

Sed etiam crusta inflammatoria in aqua colliquescit *l* , modico cum calore , & vehementer putrescit *m*. Quare uti cruor *n* , ita serum a febre ita mutatur , ut porro post aliquot venæ sectiones , superata morbi vi , nullum nunc corium pleuriticum in emissio sanguine reperiatur *o*. Ab eadem febre serum supra modum falsum fit *p* inque febre flava profunde flavum *p*\*.

*e* Nondum die 2. 3. Butt igne , ab alumine , aut a vitriolo cogi posse.

*f* Boerhaave Prælect. T. III.

p. 674. Schwenke p. 134.

*f*\* Laffus p. 12.

*f*\*\* Malpigh. de form. fet. p. 12.

*g* Malpighi ibid.

*h* Lister de aquis medic. angl. diff. II. p. 90.

*i* Schacher tum. ocar. pilos. Floyer præternatur. state of hum. p. 99. negat nempe ab

*k* Pohl hydrop. saccat.

*l* Haen l. c. p. 86.

*m* Pringle p. 417. Hendy.

*n* p. 45. 46.

*o* D. Sinopeus l. c. p. 271.

331. &c. Sauvages de l'inflammat. p. 244.

*p* Tabor p. 79. In febribus intermittentibus serum minus acre est , quam in continuis B. Langrish practice p. 232.

*p*\* Lind fever infect. p. 198.

Serum in peripneumonia ita mutatur, ut ab acore vix cogi se patiat, neque 150<sup>mo</sup> sed 189 demum ignis gradu cogatur *q*, & altero die jam viridi colore sirupum violarum tingat *r*.

Minora tamen in universum naturæ urinosa signa ostendit *s*, quam cruor, etiam quando computruit, & aliquando a recente cruore serum jam fracidum parum habuit discriminis *t*. Dudum *Robertus Boyle* *v* monuit, debilem ex fero spiritum prodire, etiam quando computruisset. Causa procul dubio hujus a cruore diversitatis in aquæ abundantia est, quæ feri magnam partem efficit, inque olei, fassarumque particularum parciore *x* portione.

Difficilius aliquanto id serum colliquescit, quod in igne coivit, albuminisque coacti speciem induxit *y*. Serius adeo, & octavo demum die *z*, sensim solvitur, & fluidam naturam recuperat. Id autem serum, quod cum alcohole induruit, id utique per annos manet insolubile *a*.

#### §. V. *Mucilago feri sanguinis.*

Magna pars sanguinis in universum mucus est, qui & cum lymphâ misceatur, & grumi

*q Rhades* p. 29.

*r Ibid.*

*s Philos. Transact.* n. 495.

*t Poerner* l. c. p. 31.

*v Apparat. ad hist. sang.*  
p. 64. 72.

*x Sect. III, n. 8.*

*y Senac* T. II. n. 408.

*z Schwenke* p. 167. Penitus solvi negaverat III. *Petit Epist.* II. p. 25.

*a Boerhaave* l. c. p. 353. adde de *Haen* l. c. p. 86.



portionem majorem efficiat *b*, in sero dilutius mucus, modo sub tenerrimæ & pellucidæ telæ specie in sanguine apparet *c*, multum diversus a natura coagulabili, quam *lymphaticam* sanguinis partem Galli dixerunt *c\**. Sanguine bacillis agitato absque aqua & frigore, fibræ parietibus vasis adhæserunt *c\*\**. Quare si lymphæ coagulabili fibræ tribuantur *c\*\*\**, de muco ejus lymphæ parte intelligi debet. In ipsa etiam lymphæ aliqua ad fibrarum formationem ad juvandam sed minor est aptitudo, si agitaveris; & vicissim ex sero virgulis agitato materies lymphæ similis separatur *c†*.

Hanc feri sanguinei partem suspicor ab Anglis a magis coagulabili lymphæ separari.

Eadem mucilago, accuratius nuper descripta *d*, in aqua adparet, quæ centesimo gradu calida sanguinem de vena missum accepit, & nunc refriguit, pellucida, glutinosa, tactum fugiens *e*, post aliquot horas fusca, solidior *f*, cujus minima quasi furfurea portio in vini spiritu superest *g*, in membranam nunquam transitura *h*; in aqua post aliquot dies sponte evanescit *i*, & a calore funditur *i†*. Rete fibro-

*b* Moscati nuov. esper.

*c* Senac T. II. p. 100. Quesnai æcon. anim. T. II. p. 358. 359. Olim eum, de venis pedis eductum, debilioribus corporibus imprimis tribuit Godofredus Moebius p. 259. & Sinibaldus in Apoll. bifronte p. 112. Habet etiam Cl. Schwenke p. 172. 173.

*c\** Senac T. II. p. 97. Quesnai nov. p. 413.  
*l. c.*

*c\*\** Moscati Butt p. 4.

*c\*\*\** Butt p. 30.

*c†* Butt p. 23.

*d* De Haen p. 97. seqq.

*e* p. 97. 98.

*f* p. 98.

*g* Ibid.

*h* p. 98. 99.

*i* p. 99. 100.

*i†* Quesnai de la saignée ed.

sum, ramosum, cum multis particulis quadratis muriaticis sola exhalatione nasci vidit Cl. *Leder-muller* *it*. Tardius putrescit quam serum integrum *i\**; ex cupro colorem cæruleum extrahit; ab alcali fixo contrahit odorem salis volatilis *i\*\** & ab acore vitriolico admisto muriaticum odorem spargit secundum Cl. *Butt* de suo sero *i\*\*\** dicentem, quæ puto ad mucum pertinent. Verum de muco alias fusius dicetur.

Adeps lymphæ passim miscetur, inque aqua hydropica *k*, & hydatidum *l* latice visus est, & in membrana de porci sanguine *m* parata. Casu vero aliquo potius crediderim admisceri.

Sabulum in lymphæ *n*, per morbos adparuit, & in siccato sero teneræ moleculæ adparent *o*, quales in tophos podagricos ex muco densantur *p*. Sed hæc elementa a sani hominis lymphæ absunt.

Aerem utique generat, aliquanto minori copia, quam cruor, quando ad 80 gradum calefit, aut sub vitrea campana, aeris exterioris pressione liberatur, bullas enim eo in statu generat, inque spumam vertitur *q*.

#### §. VI. Quid sero ab admistis variis salibus accidat.

Quæ ab admistis diversi generis salibus, aut

*it* *Micr. Ergöz.* 11. p. 78.

*i\** *Butt* p. 57.

*i\*\** *Ib.*

*i\*\*\** p. 55.

*k* *Schacher* l. c.

*l* *Bartholin histor.* 84. Cent.

IV. Unctuosarum in hydatidibus particularum meminit

*Birch* T. IV. p. 377.

*m* *Ruyssch thes.* l. aff. 1, n. 3.

*n* *Act. Budissin.* p. 73.

*o* *Eller mem. de Berlin.* T.

XI. p. 25.

*p* *Idem ibid.*

*q* *Diebold de aere in humor. corp. human.* p. 4.



æthereis oleis in fero adparent , eæ mutationes ipsi fere cum sanguinis parte rubra communes sunt. Cum neutro quidem salium genere effervesceat , ne ea quidem lymphæ , quæ in majorem aliquam caveam effusa stagnavit *r*. Cum acerri-  
mo tamen nitri spiritu paulum fervet, cumque oleo vitrioli *s*. Adest exemplum, ubi cum liquore heliotropii potius ruber color natus est *st*. Sales mediæ perinde , ut rubrum sanguinem , ita serum diluunt , redduntque liquidius *t* , & efficiunt , ut etiam ab igne difficilius cogatur *v*. Etiam a liquore terræ foliatæ tartari serum resolvitur *x* , & cum calcis aqua *x†* , & cum alcali volatili *x††* , & ab alcali caustico *x†††*. In aqua nitrata crustæ pleuriticæ deliquescent *y*.

Cum acidis liquoribus ex vegetabili regno paratis , potius diluitur *z* , tum serum , tum gelatina in corpore humano ex vasis suis effusa *a*. Miror ab aceto cogi visum Cl. viro *b* , quale quid nunquam mihi contigit videre.

*r* Gmelin *Commerc. Lit. Nor.*  
1745. hebdom. 52.

*s* Grew l. c. Cum acidis liquor hydatidum sedimentum dejicit Birch T. IV. p. 317.

*st* Duverney l. c.

*t* Eichel l. c. p. 13. 14. Schwenke p. 195. Lassus p. 89. Rhades n. 35. p. 24. 26. Cum nitro mistum demum 156 gradu cogitur. Coagulum fieri sponte se dissoluturum Ratty p. 52.

*v* Rhades p. 26. Serum purum 151 gradu thermom. Fahrenheit. a calore cogitur , serum nitro mistum demum 156mo.

*x* Phil. Transf. n. 472.

*x†* Lassus p. 9.

*x††* Id. ib.

*x†††* Butt p. 27.

*y* De Haen p. 101.

*z* Eichel p. 14. Rhades p. 24. Poerner p. 28. Ratty p. 210. Non cogi Ant. de Haen p. 96. Tamen non impedit acetum , quin 140 gradu caloris cogatur Rhades p. 28.

*a* *Memoir. de Chirurg. T. 1.*  
P. II. p. 86.

*b* Petit *Epist.* II. p. 36. Leviter cogi cum acido vegetabili. Lassus.

Cum acore meraco & minerali *b†* coagulatur, potissimum si austeram naturam conjunctam habuerit, cum solutione aluminis *c* adeo, & vitrioli *d*, & omphacio *e*, quod de plantarum baccis elicitur. Aut totum *f* etiam a meracissimo vitrioli acido cogitur, aut pars major *g*, ut reliqua aquea supersit, & rubrum colorem ab ejus contactu induit *h*. Reliqui acidi & de salibus stillatitii liquores *i*, partem feri maximam in album gelu cogunt, ut aliqua tamen portio fluida *k* maneat, nisi major acoris copia admista fuerit *l*. Etiam hydropicæ aquæ ab iis acidis spiritibus coguntur *m*.

A salibus lixiviosis fixis serum potius adden-

*b†* *Lassus* p. 8.

*c* *Rhades* n. 32. p. 22. *Schwenke* p. 196. 197. *Rutty* p. 217. *Butt* p. 26. & a vitriolo. Etiam albumen *Floyer* l. c. p. 62. & aqua hydropica *Duvernoy* l. c. *Phil. Transf.* p. 472. *Rutty* p. 217. Tab. AA. & vehementer.

*d* *Schwenke* p. 197. *Malpighius posthum.* p. 162. *Verduc* de vitriolo cæruleo de l'usage des parties p. 359. Serum non valde, sed albumen magis cogit idem *Rutty* p. 239. Aquæ vitriolicæ *Shadwell* & *Cronebaum* serum sanguinis & albumen cogunt *Rutty* p. 210. 268. 291. Lympha ductus thoracici a vitriolo cogitur *Malpigh.* posthum. p. 162.

*e* *Eichel* p. 16. Cum adstringentibus *Schwenke* p. 196. 197.

*f* *Pitcarne elem. med. math.* p. 42. *Petit Epist.* II. p. 31. 36. *Rhades*, p. 22. *Poerner* p. 28.

De lympha ductus thoracici *Monro*.

*g* *Freind* p. 178. Solvi partem majorem ab acore vitriolico *Butt* p. 26. ab acore salis non cogi. *Id.* 27.

*h* *Petit* l. c. p. 36.

*i* *Petit Lettre* II. p. 31. 36. *Pitcarne* p. 42. Cogi a spiritu nitri & aluminis *Verduc* l. c. a solutione sublimati hydrargyri *Boyle apparat.* p. 60. a saturni saccharo *Verduc*.

*k* *Freind* p. 178. *Senac T. II.* p. 197. *Schwenke* p. 197. *Rhades* p. 22. 23. Idem negat cogi a spiritu nitri, forte nimis debili *Ant. de Heyde obs.* 87. & a spiritu salis *Verduc* l. c. Lympha in lacteum coagulum cum spiritu nitri coit *Verduc* p. 383.

*l* *Eichel* p. 16.

*m* *Malpigh. post.* p. 162. *Duvernoy memoir. de l'Acad. des Sciences* 1701. p. 155. 156.



fatur *n* , ut in mollius gelu consistat , & pars coacta præcipitetur *o* : & ipse , non quidem ab oleo tartari cogi , sed tamen flocculos in sero , & opacitatem nasci vidi. Cantharidum extractum lympham cogit *o*†. Qui diluere dixerunt *p* , forte ab aquæ copia sibi passi sunt imponi. Non mutari alii maluerunt *q*. Aqua calcis ichthyocollam dissolvit *r* , & corium pleuriticum.

Albumen , caseum ab oleo tartari resolvi *Levretus* , hinc impedire ne albumen coctum dure scat ; chalazas vero indurare , quod improbabile. Albumen cum acore vitriolico fervere & cogi ; etiam cum succo citri nasci filamenta ; in alcali volatili difficulter solvi *Lassus* *r*†. Aliquoribus urinosi volatilibus turbatur serum *s* , & pelluciditatem amittit , non tamen coagulatur *t*. Idem admisti intercedunt , ne serum ab acidis spiritibus addensetur *v*. Serum hydropicum *x* , & polypum *y* , dicti sunt solvere. Cantharides perinde eam indolem a sero auferre dicuntur , qua coagulationi aptum fit *z*. Sed hæc prioribus repugnant.

---

*n* *Ant. de Heyde* l. c. *Petit* l. II. p. 102.  
*c.* p. 31. 35. *Rhades* p. 23. *r*† p. 14.  
*Poerner* l. c. *Rutty* p. 406. De *s* *Rhades* p. 23.  
sero hydropico *Duverney*. *Ta-* *t* *Haen* p. 96. Non mutari  
rin. *Pitcarne* l. c.  
*o* *Schwenke* p. 197. De *v* *Boyle appar. ad hist. sang.*  
lymphæ ductus thoracici *Mon-* p. 74. *Petit* l. c. p. 36.  
roo l. c. *x* *Senac* T. II. p. 479.  
*o*† *Rutty* p. 217. *y* *Malpigh. posth* p. 162.  
*p* *Eichel* p. 14. *z* *Bagliivi exper.* IV. Fortius  
*q* *Pitcarne Elem.* p. 42. quam alia *Butt* p. 28. & duref-  
*r* *Whytt on lime water* T. cit.

Sincerus liquor, qui de vino stillat, in feri parte superiori filamentosam *a* lanuginem excitat, & serum eo magis coagulat *b*, quo recentius est, & integrius, liquor vero vini & meracior fuerit, & calidior. Quod enim aliquot jam dies adservatum *c* fuit serum, ejus fluida natura a vinosi spiritus efficacia vix quidquam patitur, & ea forte ratio fuerit illius discriminis, quod inter Cl. virorum experimenta intercedit *c†*. Etiam albumen adultioris pulli male cogitur *c††*. Eadem lymphæ cum spiritu vini *d*, & ab igne *e* sæpe rubescit.

Lymphæ de vasis suis secreta ab acore meraco pariter cogitur.

Aquæ abdominalis similes omnino sunt dotes, plus tamen creditur habere partium gelatinosarum & in corium transeuntium.

Hæc cæterum experimenta cum toto sero facta, tamen potissimum ad ejus partem gelatinosam pertinent.

## §. VII.

*a* Eichel p. 18. Lassus p. 9. Poerner l. c. In aquis hydro-picis Gmelin Comm. Lit. l. c. Lactescere de Haen p. 96.

*b* Boerhaave Elem. Chem. T. II. p. 353. Schwwenke p. 198. Monro de lymphæ ductus thoracici. Etiam ab oleo terebinthinæ cogitur Idem.

*c* p. 232.

*c†* Si misceatur aqua reginæ hungariæ, vel sulfuris tinc-

tura, vel spiritus volatilis alcalinus, crusta coriacea nulla nascitur Leigh diff. p. 81. Id ad aquæ ubertatem retulerim.

*c††* Malpighi form. fet. p. 12. Bellin mot. cord. p. 27. 28. Maitre-Jean form. du poulet, p. 181. 182.

*d* Comm. Acad. Petrop. T. I. p. 269.

*e* Deusing de funct. microsc. diff. 7.



§. VII. *Seri ab igne mutatio.*

Analyses, quas vocant, feri apud scriptores medicos satis raræ sunt. Antiquissima debetur *Gualthero Needham*, qui, in pinta (libra) feri de humano sanguine, uncias phlegmatis quinque cum drachma, spiritus alcalini uncias sex, salis fixi scrupulos duos, salis volatilis nihil quidquam reperit *f*, neque olei. Ex bovis vero sanguine separaturn serum ex libris quatuor dedit aquæ sive phlegmatis libras duas, & tantundem crassamenti residui. Ex eo crassamento spiritus elicuit vir Cl. libram unam uncias novem, olei drachmas tres, volatilis salis scrupulos septem grana sex, capitis mortui drachmas 26, in quo drachmæ duæ grana quinque salis fixi fuerunt *g*. Mireris utique abnormem in analysi feri humani & taurini diversitatem.

Inde *Raymundus Vieussens* duo experimenta fecit. In priori *h* librae duae unciae sex feri, dederunt, lenem ad ignem, phlegmatis *i* primo limpidi, inde subfaetidi, libras duas drachmas sex, nempe  $\frac{131}{152}$  partes totius feri. Residuum, molle & corneum, ad uncias quinque in retorti vasis fundo superfuit, idque sponte induruit. Id igne denuo admoto dedit spiritus

---

*f* Birch T. III. p. 235.

*g* p. 234. 235.

*h* *Traité des liqueurs* p. 31.

*i* Senac T. II. p. 108. Phlegma non carere efficacibus par-

ticulis adparet, cum similis de albumine stillatitius liquor myrrham solvat *Macquer Chym. prat.* T. II. p. 488.

uncias tres sive partes  $\frac{3}{38}$ , salis volatilis *k* crystallis laminatis adhaerentis drachmas duas cum semisse, parca utique ad totum ferum portione & uti 5 ad 608; olei nigri *l* crassi drachmas sex cum semisse, sive 13 partium in 608. Caput mortuum spongiosum pondere sex drachmarum fuit & granorum 22. Id lixivio facto salis fixi grana dedit octodecim *m*. In altero experimento feri decem libris usus *n*, phlegmatis libras tres, subfaetidas elicuit. In ejusmodi phlegmatis libra duo fere sunt 0 grana terrae; sed vas vitreum crepuit, quo auctor usus est, & magna pars fluidioris feri periit. Residui fuerunt unciae 26 cum semisse.

Ex eo denuo phlegmatis, nam ita vocat, uncias sex habuit, rubelli, vehementer olentis *p*. Deinde spiritus rufi sponte avolaturi drachmas decem, olei nigri, levioris spiritu, drachmas 19, salis volatilis drachmas sex. Ex residuo rarissimo carbone, cujus uncias quatuor appenderat, prodierunt salis alcali drachmae septem *q*, terrae drachmae sex. In hac analysi phlegma videtur effecisse feri  $\frac{133\frac{1}{2}}{160}$  sive fere

$\frac{1068}{1280}$ , spiritus debilior  $\frac{48}{1280}$ ; fortior  $\frac{100}{1280}$ ; oleum  $\frac{66}{1280}$ ; sal volatilis  $\frac{6}{1280}$ ; sal fixus  $\frac{7}{1280}$ ; terra  $\frac{6}{1280}$ . Inde rationes elementorum adparent.

Liquorem flavum, in quo oleum nigrum empyreumaticum, & acor: tunc alcali vola-

*k* Boyle appar. p. 65. 66.  
*l* Vieussens p. 32. Ruborem  
 habet Boyle ibid.  
*m* Vieussens p. 34.

*n* p. 19.  
*o* p. 20.  
*p* p. 21.  
*q* p. 23.



tile adfcendere; carbonem porofum fupereffe : eum ex lixivio dare falem fubfoetidum : caput mortuum cum acido non fervere *Laffus*.

Cl. *Viffcherus* *r*, ad experimenta, ni fallor, *Gaubiana*, ex feri ficci unciis tribus, habuit falis volatilis urinoſi unciam unam cum femiſſe, olei utriuſque drachmas tres, capitis mortui drachmas ſeptem cum femiſſe.

Cl. *Rouelle* abacta aqua de fero ſanguinis ſiccam fragilem maſſam vidit fupereffe; in ea natrum reperit, & cum acido vitriolico glauberianum ſalem compoſuit.

Quaenam ſint cryſtalli priſmaticae in liquore hydropis peritonaei repertae, vel concreta ſalina feri ſanguinis non dixerim *r\**. Ex fero caeterum hydropico unciae olei duae de quinque libris ſtillarunt, & liquor ſale volatili pleniffimus *r\*\**. Ex eodem fero ſal fixus alcalinus, cumque acidis liquoribus ferveſcens, factus eſt *r†*. Salem marinum exhalando natum diximus *r††*.

Cl. noſter *Rhades* ex unciis feri quadraginta *s*, elicuit aquoſi laticis uncias octodecim cum femiſſe, ſive  $\frac{37}{80}$ : deinde liquorem *t*, qui ſenſim magis & magis urinoſam naturam induit, ſpiritum nempe cum oleo miſtum, ad ſeptemdecim uncias cum femiſſe ſive  $\frac{35}{80}$ . In eo liquore

*r* In diſſ. de cholepojeſi p. 60.

*r\** Obſ. of a Society at London

n. 2.

*r\*\** Memoire de l'Acad. avant 1699. T. 1. p. 506.

*r†* *Vieuffens* de remot. & proxim. p. 71.

*r††* *Ledermuller* II. T. 78.

*microſc. ergöz.*

*s* l. c. p. 19.

*t* p. 20.

duplex oleum fuit, aliud leve, quod aquæ innataret, grave alterum, quod subsideret. Porro salis volatilis semuncem sive  $\frac{1}{80}$ , & olei empyreumatici drachmas sex elicuit sive  $\frac{1}{53}$ . Carbonis inflammabilis fere undecim drachmæ fuerunt sive  $\frac{11}{320}$ . Ex eo carbone in lixivio obtinuit vir Clar. drachmas terræ nigræ sex sive  $\frac{1}{43}$ , unde crystallorum salis communis habuit grana quinque, sive  $\frac{1}{3440}$ . Idem rationem suorum elementorum facit ejusmodi, ut in partibus 235 feri, aquosi laticis sint partes 215, salis volatilis sex, olei empyreumatici octo cum semisse, olei levioris ceracei una, terræ fixæ tres cum tribus quartis, salis marini una v. In carbone aliquantum dissentit Ill. Archiattrorum comes x, & ægrius ignem concipere, tamen & in ipso flammulam nasci, oleumque incendi, de lymphæ residuum in igne potius salis modo crepitare moneat y. Serum modo flammam aluit, modo unice crepitavit. y\*

Cl. *Poernerus* varios de sero stillantes liquores separat, quorum alii aliis magis urinosi, acres & empyreumatici sunt z.

17. Serum podagrici hominis dedit spiritum volatilem urinosum, æque acrem ut ipsa urina z\*.

Serum putrescens absque intestino motu naturam generat alcalinam, ut die trigesimo spiritum fætidum alcalinum fundat z†, totum ipsum alcalinum z††.

v p. 21.

x *Senac traité du cœur* T. I.

p. 110.

y p. 95.

y\* *Stubbe phlebotomy* p. 115.

116.

z p. 29. 30.

z\* *Pinelli* p. 180.

z† *Collin arnic.* p. 9.

z†† *Lassus* p. 12.



Quando cum sanguinis analysi feri igne torti phænomena conferuntur, adparet, quantum quidem in tanto experimentorum diffidio eruere licet *a*, aquæ in sero plus esse, falis volatilis aut perinde *b* aut plus omnino *c*, olei non minorem portionem esse, aut potius majorem *d*. Serum minus putrescere *d*<sup>\*</sup>, minus dare alcalini liquoris *d*<sup>\*\*</sup>. Sed etiam falis non minor est ratio *e*, nec terræ minus inest *f*. Ferrum a sero aut abest, aut parcissima inest copia *g*.

## SECTIO IV.

### ELEMENTORUM SANGUINIS PROPORTIO ET UTILITAS.

#### §. I. Unde temperamenta nascantur.



UÆ hæcenus numerosa collegimus experimenta, ex iis quidem demonstratur, in sanguine aquam in univèrsū dominari *h*: inesse præterea

*a* Sect. II. n. 41. 42. seqq.

*b* n. 43. collato experimento Boylei cum Rhadesiano. Triplo plus in sanguine esse, non recte Needhamus l. c. p. 235.

*c* Collato experimento Vieussenii l. c.

*d* In Rhadesiano oleum est  $\frac{1}{24}$  feri. In prioribus n. 43. vix ulla portio tanta est.

*d*<sup>\*</sup> Collin exp. 15.

*d*<sup>\*\*</sup> Id. exp. 16.

*e* Sero  $\frac{1}{235}$  falis marini in est, portiones n. 46. in sanguine propositæ fere minores sunt.

*f* Sero  $\frac{1}{60}$  qua portione pleræque n. 48. dictæ minores sunt.

*g* In albumine & febrili crusta Widmer p. 189.

*h* Sect. 2. n. 41.

phlogiston & adipem *i*, five materiam, quæ ignem concipere apta sit, & in oleum sanguinis igne admoto vertatur, & particulas, quæ ab ignis vehementia in urinosum volatilemque *k* falem mutantur, & marinum falem *k*<sup>\*</sup>, & terræ momentum *k*<sup>\*\*</sup>: cæterum horum elementorum ad se invicem rationem variis ex causis mutari. Vehementem corporis exercitationem, & febrem *l*, aquæ portionem minuere, sanguinis vim adtractilem, & densitatem augere *m*, augere etiam globulorum rubrorum copiam *n*, cumque iis pondus specificum *o*: eandem vehementiorem aut diuturniorem acrimoniam sanguinis & aptitudinem intensiorem reddere, qua aliquæ sanguinis particulae in urinosam falsedinem tendunt. Contra ignavia & victus fellularius, & debilitas *p* ex amisso sanguine nata, feri copiam augent, & aquæ atque globulorum numerum minuunt, ut liquidus, & pallens sanguis ex vena fluat *p*<sup>\*</sup>. Sed & ferri copia aut augeri potest, aut minui, iisdem pene ex causis, multaque inprimis rubri cruoris jactura.

## §. II. *A globulorum rubrorum abundantia.*

His ex causis aliisque *temperamenta* nascuntur. Nempe veteres medici mutuam quamdam ele-

*i* n. 44.

*k* n. 42. 43.

*k*<sup>\*</sup> n. 46.

*k*<sup>\*\*</sup> n. 48. 49.

*l* n. 41.

*m* n. 7.

*n* *Langrish* p. 74.

*o* *Morgan philosoph. princip.*  
p. 117.

*p* n. 8. 41.

*p*<sup>\*</sup> *Journ. de Medec.* 1771.  
*Juin.*



mentorum sanguinis proportionem dari, neque temere posuerunt, etsi nondum per experimenta constat, quibus numeris ea globulorum feri, particularumque oleosarum, aut ad falsam indolem pronarum, portio exprimatur, quæ legitima quasi, optimæ valetudini pro exemplari sit. Facile vero intelligitur, si aliquod horum elementorum pro reliquorum portione superet, etiam totius corporis temperiem fieri, quæ hætenus ab optimo habitu recedat. Valde vero discrimen augeri evidenter apparet, si in alio homine aqua abundaverit, in alio globulorum vis, aut partis, quæ ad ignem urinosa fit.

Ergo globulorum rubrorum numerus, uti in diversis animalium generibus, ita in hominibus diversis alius, & alius esse potest. Si eorum ad aquam major ratio fuerit *q*, ruberrimus sanguinis color erit, majorque densitas, pondusque specificum majus. Athleticus inde habitus *Hippocratis* nascitur, quem possimus cum sanguineo temperamento *s* veterum hætenus comparare, ut simus memores, veteres cum ea temperie molle quid, & laxum fibræ genus conjunxisse, quod a globulorum numero non sequitur. Ab eo enim aucto vires cordis totiusque corporis augentur. Neque plethora est, ea enim vox nimiam totius sanguinis, ut ex variis elementis mistus est, copiam ponit, quæ resistantiam

---

*q* *Martine Essays of a Society* B. Robinson of food and diet at Edimb. T. II. p. 83. *Quesnai* charges p. 65.  
*passim.* *s* Id temperamentum inde  
*r* In aphorism. princip. Conf. derivat *Martine* l. c.

vasorum superet, eademque distendat. Evidentissimum veræ plethoræ exemplum in iis animalibus *t* reperimus, quæ plus sanguinis ex aliarum bestiarum incisis arteriis, admiserunt, quam amiserant, aut vasis suis absque nimia distensione poterant recipere. Varia inde symptomata passa sunt *v*, & cor, venæque sanguine distentæ fuerunt *v*<sup>\*</sup>, ut nimius sanguis etiam per urinam erumperet, quæ mala eo superfluo sanguine per incisam venam emisso sublata sunt *x*. Alterum certum plethoræ exemplum est in hominibus, quibus magni artus amputati fuerunt. His enim, cum ventriculus & viscera ciborum coctioni destinata nihil passa sint, plus sanguinis generatur, quam in receptaculo sanguinis sive in vasorum universitate contineri possit. His frequens est necessitas venæ sectionis, & dissilientium vasorum periculum. Sed etiam in homine vasorum nimis sanguine plenorum, & subitarum inde mortium, exempla habemus *y*: neque a brutis animalibus id vitium abest, quando aut nimium laute *z* pasta fuerunt, aut vasorum resistantia per sanguinis missiones fracta fuit *a*. Posse vero in iisdem vasis & multum

*t* Birch T. II. p. 179. 190. 191.

*v* Idem l. c. Alterum animal vulpes erat, quæ omnino inflammatis intestinis interiit.

*v*<sup>\*</sup> Ibid. p. 136. cum duabus libris majorem sanguinis portionem accepisset.

*x* Idem T. II. p. 179.

*y* Cockburn on feasknesses p. 264.

*z* Lisle of husbandry L. II.

Requirat missionem sanguinis.

*Idem.*

*a* Lawrence system of agricult. de vitulis. In homine venæ sectiones phlethoram faciunt, & necessitatem novæ missionis sanguinis augent G. v. Swieten T. I. p. 15. Bond of the night-mare p. 76. 77. Plethoricæ feminae maximas hæmorrhagias facile tolerant Schwenke p. 23.



rubri sanguinis contineri & parum , per experimenta ostendi *b*.

§. III. *A particularum ubertate , quæ ad urinofam naturam tendunt.*

Si vero in sanguine eæ particulæ abundaverint , quæ ad ignem urinofam *c* indolem induunt , tunc utique id temperamentum producitur , quod veteres *cholericum* vocarunt. Poterit ea intemperies ab ipsis parentibus congenita dominari : poterit ex alimentis nimis carnosus nasci. Idem enim omnibus animalibus ferocibus , deque præda viventibus , temperamentum est , acerrima bilis *d* , fudor olidus *e* , fæces alvi intolerabiles *f* , urina fætidissima *g* , lac tenue & olens *h* , gravis anima , quæ omnia humorum ad urinofam indolem degenerantium evidentia signa sunt. Tanta vero volatilis naturæ vis una eminet , ut sanguis cholericorum hominum intra 24 horam totus exhalet , & lamellas ficas relinquat *i*. Coniunguntur autem hac cum cacochymia , capilli sæpe

*b* Second mem. sur le mouv. du sang Exp. 70. 77. 92. comparat. cum Exp. 71. 91. 92. 95. 183.

*c* Vieussens journal de Tre-voux 1709. m. nov.

*d* Ostendetur , medicatam bilem a rapacibus animalibus repeti.

*e* Sudor olidus athletæ , sola carne caprilla , pasti apud veteres celebris est.

*f* A colore diverso reticuli mucosi subcutanei signa temperamentorum sumit *Russel æcon. natur.* p. 156.

*g* De tigride lego.

*h* Urinofam adque mundandos pannos utile , ut urina , *Gesner hist. anim. quadruped.* p. 139.

*i* *Burggrav. de aere aq. & loc. Francf.* p. 39. 40.

rufi *k*, carnes duræ, compactæ ficcæque, macilentia, pulsus valens & celer, robur propriarum virium conscientia nata audacia, & etiam in minori corpore summum, & ex ira, omnia nempe, quæ de cholericis hominibus vetusti medici scripserunt. Tataři unice carnes amant, herbasque contemnunt, destinata bestiis pabula *m*: iidem apprime feroces sunt & crudeles *n*. Solebat *Boerhaavius* de homine narrare, qui ex compacto folis perdicibus victitare coactus, neque eam vitæ rationem ferre potuit, neque eam morum humanitatem conservavit, quæ ipsi propria fuerat. Satis ego memini, summam a viperarum usu natam impatientiam me observasse. Contra mite Brachmanum ingenium & Indorum, solo cibo vegetabili vitam sustentantium, & similis animalium herbivororum placidior indoles, & meticulositas, & teneritudo; denique summa debilitas, quæ ex victu vegetabili homini gravis supervenit, & frequentia exempla febricitantium, scabiosorum, scorbuticorum, etiam hecticorum, victu vegetabili restitutorum *n*<sup>\*</sup>, satis ostendunt *o*, quanta rationis vivendi in temperamento definiendo potentia sit.

Similia fere victus carnosı producunt cælum

*k* Bagliovi de leone oper. p. 267.

*m* Relat. des missions T. I. p. 21. J. de Luca relat. des voyages au nord T. II. p. 103.

*n* In nupero bello anni 1740 & 1741. lego Tartaros misero-

rum Fennonum prostratorum sanguinem fluxisse.

*n*<sup>\*</sup> Phthisis Bäkantiq. chron. siukdom p. 16. pane triticeo & lacte folis scorbutus Medic. Transf. T. II. le Roi de Scorbuto.

*o* Lobb de calculo p. 243.



æstuosum , vita labore exercitata , venatio , spirituosus potus copia , febris denique , quæ omnem eam acrimoniam , urinæque & fudoris fætorem , & conjunctum vigorem musculorum cordisque summum subito generat. In phlegmaticis hominibus ipse variolarum prior status alacritatem & æstuosam indolem generat *p* , & stupiditatem inoculatum venenum febrile superavit.

Acrimoniam variam , etiam muriaticam , in nostris humoribus *Boerhaavius* adgnovit. Et videtur certe victus falsus in scorbuticis acrem sanguinem generare , putredine equidam admixta corruptum. Acris sudor fuit & retenta urina , cum falsus humor in sanguine nimium abundaret , qui solebat per renes deponi. Acrimoniam salis nimii , equidem medicati , me in me ipso percepisse , alias retuli.

#### §. IV. *Ab aque nimia copia.*

Sed neque contrarium temperamentum quidquam habet obscuritatis , in quo ratio globulorum rubrorum , & sanguinis ad aquam nimis modica est. Una vis densabilis sanguinis minor est , & rubor , & calor minuuntur. Porro in toto corpore , inque ipso pariter corde , fibrarum minus cohærentium , aqua inebriatarum , mollium , laxitas , ad corpus movendum inertia , cor parvum , pulsus parvus , & mollis , venosi

---

*p* *Kirkpatrick analys. of inoculation* p. 62.

cruoris tarditas , hinc vaporum ad cor redu-  
cium stagnatio , cellulosa telæ aquosus tumor ,  
uberior urina , ciborum degeneratio in  
eam corruptionem , ad quam sponte tendunt ,  
flatus &c. In pauperibus solo victu vegetabili  
utentibus sanguis flavus fere & absque rubore *p*\*.  
Lympha tenuior in cane sola aqua & pane  
pacto , experimento a *Rivino* facto.

Hæc omnia & sponte sua in hominibus ita  
natis dominantur , & variis modis in corpora  
humana introduci possunt , quæ nondum a  
mediocritate recefferunt. Quies corporis , cibus  
vegetabilis aut lacteus , somnus nimius , longo usu  
ad eam temperiem ducunt ; subito vero virium  
quæcunque vehementior exhaustio , sive ea a  
praegresso valido morbo nata sit , sive a sangui-  
nis rubri quacunque jactura. Innumerabilibus  
exemplis constitit , sero omnino , aut nunquam ,  
legitimam globulorum copiam reparari , si  
quando subita eorum nimiaque evacuatio acci-  
derit. *Paulina* , Senecae celebrata uxor , cum  
de venis incisis magnam sanguinis vim emisisset ,  
a *Nerone* vivere coacta , nunquam per totam  
vitam genarum nativum ruborem recuperavit ,  
neque *Achilles Gasserus q* , cum ex dente avulso  
plurimum cruoris amisisset. Sed etiam a spon-  
taneis sanguinis evacuationibus *r* , a narium

---

*p*\* *Stubbe phlebotom.* p. 117. *hepate* p. 309. *Zecchium consult.*  
*q* *Rumler obs.* 72. *med.* p. 36. *Hildanum Cent.* II.  
*r* *Celebris* inde apud *Dionem obs.* 18. *Bausch de aetite in*  
*Adriani Aug. hydrops.* Alia *proem. Eph. Nat. Cur. Dec. I.*  
exempla varia magna numero *ann. II. obs.* 48. *Delium Amæn.*  
exstant apud *Spigelium anat. Dec. I. Cas. I. Cornelium*  
p. 222. *J. Jac. Wepfer de apo- Trioen obs.* p. 18. 19. & olim  
plexia p. 193. *Glissonium de Hippocr. epid.* L. VI. S. 4. n. 5.



hæmorrhagia , quod exemplum coram video , & ab hæmorrhoidibus *s* , & ab hæmoptysi *t* hydrops supervenit , & a nimis demum de incisa vena sanguinis missionibus *v* , etiam ab unica *x* , sed abnormi , evacuatione , etiam in validissimis animalibus , & ab aquosis morbis *y* alienissimis.

§. V. *Temperamenta veterum.*

Quæ hætenus proposuimus , fati cum veteris scholæ *z* placitis conveniunt , non perinde , quæ dicenda supersunt. Schola nempe Galenica *a* ad quatuor elementa , quatuor etiam in sanguine humores posuerat , qui elementis responderent. Ergo medici sanguinis in varios humores secessionem contemplati , quæ sponte fit , *bilem* in sanguine , a flavo colore dixerunt aquam eam ,

*s* Zacchias mal. hypoch. p. 50. De Gorter Chirurg. p. 160. Journal Medec. 1770. Juin.

*t* Jul. Ofrai de la Mettrie œuvres de medec. obs. 20. De hydrope pericardii loquitur.

*v* Hippocr. prorrh. L. II. n. XI. Sydenham de hydrope , Galenus meth. med. L. XII. addito exemplo. J. Jac. Wepfer , Raulin des variat. de l'air p. 104. &c.

*x* Cum quinque libræ sanguinis sano homini detractæ fuissent Wepfer de apoplex. p. 329.

*y* In cane experimentum fecit Fridericus Hofmann de elasticit. fibr. p. 17.

*z* Sanguis , pituita , bilis

duplex. Princeps auctor est scriptor libri de natura hominis , qui exstat inter Hippocraticos , & alterius etiam libri de morbis auctor , qui pariter inter hippocraticos est. Inde Rufus eam sententiam tenuit de appellat. part. p. 43. 44. edit. Clinch , alique passim dogmatici.

*a* De elementis L. II. c. 2. de atra bile c. 2. Conf. Avicennam Fen. I. doctrin. IV. Sanctorium in idem Fen. Quæst. LXV. LXX. aut Fernellium physiol. L. VI. c. 8. aut fere primum quemque a Galeno ad Helmontium scriptorem , qui in manus venerit.

quæ placentæ sanguineæ innatat , quamque ferum vocamus , quam eamdem in proprio suo receptaculo meraciorem , ferio bilis nomen mereri tenebant. Porro *sanguinem* vocarunt , qui suo se rubore prodit , & quem peculiariter cruorem diximus. Aquam , quæ præcipuum utique & sanguinis , & aliorum humanorum animati corporis elementum est , phlegmatis nomine designaverunt. Denique , ne deesset humor , qui *terræ* inter elementa responderet , *atram* bilem inter sanguinis præcipuas partes admiserunt , tristius nempe coloratam illam sanguinis sentinam , quæ vasculi fundum contingit , quo cruor continetur ; cujusmodi etiam materiem vomitu rejici viderunt , & quo nomine recentiorum medicorum aliqui eum sanguinem dignum judicant , qui diu in vasis corporis humani stagnavit *b*. Hanc super theoriam veteres pene totam pathologiam , & curationem demum morborum ædificaverunt , & alia medicamenta affirmaverunt flavam bilem , alia atram educere : esse etiam quæ phlegma peculiariter expurgent *c*.

Nunc ex ejusmodi quatuor humoribus sanguinem ajebant temperari , justamque omnium principiorum commistionem perfectissimum temperamentum efficere ; si vero aut sanguis supra legitimam suam quasi dosin abundaret , sive bilis , sive terra , atrave bilis , sive phlegma ,

---

*b* Senac T. II. p. 266.

*c* Conf. Galenum de elementis &c.



quatuor tunc simplicia ; & præcipua tempera-  
menta aiebant oriri , a bilis abundantia chole-  
ricum , ab aquae ubertate phlegmaticum , a san-  
guinis aucta portione sanguineum , & denique  
a copia atrae bilis melancholicum.

Contra hæc totius medicinae fundamenta  
varia equidem , acute fatis , monuerat *J. Bap-  
tista Helmontius d* , ut tamen medici clanculum  
veteris scholae placita pergerent amare. Nam  
*Willisii e* principia spiritum , salem , terram ,  
aquam & oleum facile eo retuleris , & *Stahlianæ*  
elementa *f* , aquam , principium inflammabile ,  
terramque , ex quorum quidem alia & alia  
abundantia Ill. hujus viri schola & eadem tem-  
peramenta restituit , quae *Galenus* posuerat , &  
perinde ornavit *f*\*.

*§. VI. Quid in his temperamentis firmi sit.*

Nos contra sinceri ut simus , & unice verum  
sequamur , continuo videmus , quartum in san-  
guine principium nullum reperiri. Neque enim  
vitiose restagnantem sanguinem huc traxisse  
licet , quando de elementis circumflui motique  
sanguinis sermo est : neque mucosa & mitissima  
seri pars pro atra bile recipi potest , quam  
veteres nigram , acidam , cum pulvere effer-

*d* *Humoristar. passiva decep-  
tio.*

*e* *De febris c. I. 2.*

*f* *Theor. Med. p. 301, histor.  
temperam. &c.*

*f*\* Non longe recedunt *Vien-  
senianum* sulphur , & sal acris ,  
sal acidus , terra , aqua , *deux*  
*diff. p. 114.* Nisi quod sales  
*Stablii* refutabat.

vescentem, in liene aiebant habitare, etsi iidem veteres pituitae nomine melancholicum humorem nonnunquam insigniverunt. Nullo enim modo vel eminus probabile est, in vere melancholicis hominibus, aut pituitam abundare, aut pituitae ubertatem cum terrei principii abundantia consistere *g*, aut vitiose acres humores *h* ad atram bilem pertinere. Ita enim aut senes omnes melancholicos redderes, nam in iis procul dubio terrae elementum auctum est *h*\*: aut demum morbosam colluviem, quae morbus est, haberes pro temperie. Pituitae certa ubertas phlegmaticae est intemperiei, quae longissime a melancholica distat. Grumum vero imum atratum ostendemus, a sola inversione rutilum colorem recuperare *i*.

Sed neque reliqua sanguinis principia firma sunt, etsi saniores sensum forte admittunt. Serum illud flavum neque amarum est, uti bilis *i*\*, neque inflammabile, ut eadem bilis est, quam primum nimia aqua exhalavit.

Deinde nimis subtiliter quatuor temperamenta facta sunt, quae innumerabilia sint, ut cuique homini fere suum sit. Absque saltu, continuis gradibus, lentoque ordine, a summa acris & robusti temperamenti violentia, ad imam phlegmaticae intemperiei inertiam descenditur *k*.

Con-

*g* *Quesnai æcon. anim.* Tom. III. p. 25. seqq.

*h* *Lorry des alim.* T. II. p. 64.

75.

*h*\* Vide L. XXX.

*i* Sect. 3. n. 17.

*i*\* Serum valde flavum vidit *H. Stubbe*, amarum nunquam l. c. p. 116.

*k* Fatebatur olim, non dari temperamenta, *J. Henricus Schulze physiolog.* p. 154.



Conficii veri dudum veteres composita ex principibus temperamenta excogitarunt, cum tantam simplicitatem viderent a natura non admitti.

§. VII. *Partes firmæ temperamenta faciunt.*

Denique, non potest solis in humoribus, ullo modo, temperamentorum principium poni. Etsi enim, quæ ex victu sequitur certi elementi abundantia, hætenus ostendit *l*, non debere humores ab hac contemplatione excludi, certum est tamen, humorum, quam vocant coctionem, sanguinisque adeo salubrem constitutionem, & salium & oleorum demum ubertatem, a motu peristaltico, a cordis *m* efficacia, a celeriori vel lento circuitu, aque solidis partibus præcipue pendere; ut a firmarum partium fabrica, non a fluidis humoribus pendet, diversissimorum salium oleorumque ex diversis seminibus de eadem terra nutritis, in adulta planta dominium. Non est hujus loci, hæc ex ipsis principiis demonstrare, paucis interim liceat verbis exposuisse, a robore partium solidarum *n*

*l* p. 254.

*m* A corde & vasis magnis in robustis, parvis in debilibus, non adeo absone temperamenta derivat Cl. *Jahn physiolog.* p. 124.

*n* Minime dissentiunt Cl. viri *G. Ernestus Stahl theor. med.* p. 302. & in *histor. temp.* *Josephus Lieutaud physiolog.* p. 61. *Franciscus Quesnai æconom. anim.* T. III. p. 444. *Lorry l. c.* p. 64.

Tom. III.

&c. quin *tonus* & partium firmarum robur ad temperamenta plurimum conferant. Neque Ill. *Præceptoris* fibra debilis & laxa alio respicit. Magis etiam, & fere unice, ad partes firmas methodica secta respexit, & nuper *Georgius Baglioni* de *fibra motrice & morbosa* p. 13. inque praxi celeberrimus medicus *Theodorus Trenchin*.

aque ingenio irratibili, majori utroque aut diminuto, causas temperamentorum fere pendere, eaque principia praecedere ea, quae ex victu possunt supervenire, humorum discrimina. Robur partium solidarum & conjuncta natura irritabilis temperamentum cholericum facit: robur absque irritabili indole temperamentum *baeoticum*, *quadratum*, rusticum, parce medicis dictum, aque phlegmatico penitus diversum, pariter quidem insensibile, sed una firmum, & suo robore stans: a melancholica intemperie perinde alienum, quod irritabilitate sua excedat. Ergo indoles solidarum partium apprime irritabilis cum debilitate, melancholicum, hysteri-cum, & hypochondriacum temperamentum constituit: debilitas denique non irritabilis, id quod phlegmaticum vocamus.

Non adeo a fluidis partibus, aut a victu, quam a congenito stamine temperamenta pendere multa demonstrant. Idem homo, cum diversissimo victu, vegetabili, & animali, mores suos & vitia dotisque suae temperiei conservat, quod ipse in me aut omni carni-um victu, aut vino abstinente, aut iisdem vicissim uso expertus sum. Infantes eodem lacte nutriti, nulla in victu diversitate, alii impatientes & iracundi, alii blandi sunt aut somnolenti, & prius diversa temperamenta demonstrant, quam a victu causisque exterioribus aliqua humorum diversitas accesserit. Qui magnas per haemorrhagias, aut vehementes salivationes, humores suos pene omnes amiserunt, novisque succis regeneratis vivunt, ii idem temperamentum recu-



perant. Diverſæ plantæ ex eadem terra, aut ab aquæ communi alimento, diverſiſſimos ſuccos, non dubie ideo ſibi præparant, quod primigenium firmarum partium fabricam aliam, aliamque habeant. Cum ſanguine vitulino, aut de vervece infuſo, non unus homo tamquam ſuo vixit, neque ſuos mores, etiam penitus ſingulares, mutavit, cum tamen alienos ab humano ſanguine vitulinos humores videretur in intima recepiffe o. Eodem cum pabulo diverſa animalia, herbivora omnia, ſanguinem alium & alium generant p, etſi diſcrimen vix oculos adtingit. Video quidem *Ruyſchium* coagula ſanguinis vitulini & humani diverſa facere p\* forte ex eo odio, quo bonus ſenex omnem illam ab animalibus repetitam anatomen premebat. Cerebrum certe humanum, & cerebrum ex animale ſumtum, eadem fere elementa in analyſi ſuppeditant. Quare etiam, ut olim adtigimus, *Helmontius* monuit q, inter ducentas analyſes ſanguinis de diverſiſſimis hominibus emiſſi, vix diſcrimen adparere. Sed etiam occiſa à veneno americano animalia nullum degenerationis in ſanguine veſtigium habent r, aut ab opio enecta s.

o *Arthur Coga* homo paulum calidi cerebri *Philos. Trans.* n. 28. *Birch* T. II. p. 215. aliufque etiam ſtultior, gallus *Denys Lettre* I. p. 14. *Phil. Trans.* n. 27. 32. Sed etiam animalia ex diverſiſſimæ indolis beſtiis communicato ſanguine vixerunt, ſuoſque mores tenuerunt. Conf. L. III.

p. 434. uſque ad 438. Nolim *Lo-weri & Hannes* hiſtoriis uti, qui ipſo jure carniſ, loco ſanguinis per vaſa circumeunte, hominem victiſſe reliquerunt.

p *Rouelle* p. 212. 213.

p\* *Cur. renov.* p. 21.

q *Vienſſens* p. 95. 96.

r *Shebbeare* T. II. p. 129.

s *Loeſeke Arznei* p. 569.

nullum in mamma cancroſa inque carne bubula ſubjecto igne torta. Et minimæ quæque circumſtantiæ phænomena diverſa reddunt, quibus plurimum tribuitur *s\**, & ſanguis in ſaniffimo homine vitioſus, inque morbis pulcherrimus adparuit *s\*\**. Adeo ii quidem medici, qui ex ſanguine de vena emiſſo, naturam & pericula morborum rectius credunt præſagiri poſſe, quam ex pulſu aliisve ſignis vulgo receptis, merito monendi ſunt, ne nimis ſibi in his principiis placeant *t*.

#### §. VIII. *Globulorum rubrorum utilitas.*

Quid quæque ſanguinis portio corpori animato boni præſtet, ſequitur ut inquiramus. Globulorum utilitas diverſo modo ſumi poteſt: uti vel denſitatem ſanguini impertiunt, vel rotundam figuram ſibi propriam acceperunt, aut ferri participes ſunt. Abſque denſitate ſanguinis firma valetudo conſiſtere nequit *v*. Facile intelligitur, ex denſiori ſucco denſiorem & fortiorem fibram generari: facile intelligitur, denſiorem ſanguinem majore cum robore a corde propelli, & inæandros vaſculorum minimorum melius ſuperare, cum aqua vaſis capillaribus

*s\** Sanguis pleno impetu irrumpens fortius craſſamentum facit, nullum qui debiliter erumpit *Puſat. Morb. Naron.* p. 90. Ex nare pulcher, ex vena eorum tempore turpis ſanguis *Stubbe* p. 111.

*s\*\** *Stubbe* p. 106, 107. *Ballon. Epid.* L. II. p. 191.

*t* *G. Cheyne cur. of diſeas* p. 141.

*v* *Boerhaave* plurimis locis *C. Hofmann inſtitut.* p. 29.

*Senac* T. II. p. 492.



distendendis non sufficiat, ut omnino ea collabi necesse sit, quam primum a sola aqua replentur *x*. Si cadaveris vasa sebo repleta, & alia terebinthinæ oleo turgida comparaveris, quæ utraque eadem vi repleta fuerunt, cylindrica illa reperiens, hæc plana, ut vim distendentem sebi cum cylindro, vim distendentem olei cum plano eam secante comparare queas. Solum densissimum argentum vivum anfractus epididymidis superat, viamque in testem internum sibi aperit: aqua aliive liquores nulla vi, quæ æque fortis sit ac illa, quæ mercurium impellit, eo possunt promoveri. Nempe eadem semper vi cordis posita, momentum sanguinis cum ejus densitate crescit. Creditum est, etiam *y* cor melius a densiori sanguine stimulari, cum procul dubio fibræ cordis internæ profundius a ponderosiori sanguine emoveantur, & canis dispereat *z*, quando ab impulsæ aqua sanguis nunc valde diluitur. Monuimus *a* quidem alias aquam, & imprimis levissimum aerem, cor efficacissime ad motum stimulare: deinde cor vehementer agitari, & omnium maxima irritabili vi pollere, quando nondum quidquam rubri adparet *b*. Non ideo repugnaverim, sanguinem melius quam aqua *c* cor irritare, siquidem cum aqua, & aquoso sanguine

*x* Hales hæmastat. p. 145.

*y* A solo rubro sanguine  
Harvei de gener. p. 51. A ponderoso melius Senac Tom. II.  
p. 172.

*z* Hales p. 115. Ens de causa

motum cordis alternum producente n. 47.

*a* L. IV. p. 468. ed. 1757.

*b* Buffon T. II. p. 353. conf. T. II. p. 105. mem. sur le poulet.

*c* Ibid.

vis laxans , & irritationes consopiens conjungitur. Etsi enim ante rubri sanguinis ortum cor moveri non negaverim *c\** , certum est tamen , multo alacrius iidem salire , postquam sanguinis is color est *c\*\** ; certum etiam cum ea sanguinis dissolutione , quæ a febribus sequitur , magnam virium diminutionem conjungi. Si vero & densior sanguis pondus majus repræsentat , & cor celerius ab ejusmodi sanguine stimulatam contrahitur , sequitur ut duplici ex causa vis augeatur , qua humores impelluntur. Hinc , ut interim hanc adnotationem præmittamus , calor cum densitate sanguinis increfcit , & cum aquosa ejus tenuitate ita minuitur , ut aquosus cruor , etiam vehementer motus , calorem non parem generet *d* , aquæ exemplo , quæ celerrimo motu levissime intepescit , & feminarum teneriorum , quas neque hystericae convulsiones , neque febres , ad eum gradum calefaciunt , qui in sano agricola nascitur. Indis carnis victus expertibus , debilibusque in summo cœli æstu manus perpetuo frigent *d\**.

Denique summa densitatis in sanguine prærogativa est , ut in rubro vasorum systemate maneat *e*. Aquosa enim pars sanguinis de arteriis in cellulosam telam fugit , & inania vasa deferit , inque cavernulis cachectica restagnat ; ea , etsi non sola , ratio est , quare hydrops ex

*c\** R. Cocchi lex. fis. anat.

*c\*\** Chirac anat. advers. p. 320.

Negat prius moveri.

*d* Quesnai ess. p. 285.

*d\** Ives reis I. p. 86.

*e* Ridley anat. of the brain p. 90. 91. Boerhaave instit. rei med. n. 61, Lancisius p. 18.



sanguinis rubri imminuta portione superveniat. Vena enim incisa, aut arteriola aperta, primum certe rubrum cruorem emittit, qui vulnere proximus sit; tenuiores vero humores, ut longe a vulnere remoti, lentiusque circumacti, non perinde ad sedem minus resistantem confluent, neque pari proportionem effunduntur *e*\*. Hinc a frequente venæ incisione, aut ab hæmorrhagia, in vasis tenuis & aquosus sanguis superest *f*, ut in me ipso, post plurimum de nare amissum sanguinem expertus sum. Verum si major nunc humoris tenuioris copia in vasis rubris est, non potest ea in vasis rubris retineri, nimis enim facilis calidæ aquæ ex arteriis in cellulosum habitum exitus est. Hoc maximum vitium est glutinis *g* de siluro pisce, aut husone cocti, quando in vasa cadaveris calidum impellitur; continuo enim in cellulosam telam de vasis fugit, quæ male repleta relinquit. Inde fugiente in cellulosas telas aqua sanguinis, etsi etiam aliæ rationes sunt, a cachexia promptus in hydropem *h* transitus, potaque uberrimè aqua continuo in corporis habitu effunditur. Sanguinis autem rubri globuli eam ad poros quoscunque exhalantes mensuram nacti sunt,

*e*\* Conf. *Quesnai de la saignée* p. 15. Rubri sanguinis 180 partes effluunt, alborum succorum partes 40.

*f* *Michelotti in historia Angeli Pisani* p. 14. *Essays of a Society at Edinburg*. T. II. n. 29. *Morton phthisiolog*, p. 18.

*g* L. I. p. 72. 73. L. II. p. 183.

*h* p. 252. 253. Unica in insula hispaniola venæ sectio Europæos, aliunde debiles, ita debilitat, ut in hydropem transeat *Charlevoix hist. de St. Domingue*, T. I. p. 14.

ut in fani hominis vasis maneant, nisi vis major, neque cum naturæ legibus consentiens, eos poros dilataverit, ut in vasa minora, urinæ, intestinorum, cutisque denique etiam ruber cruor urgeatur *i*.

Adparet adeo, & plures etiam rationes super-sunt, quæ latentes istas causas adjuvant, quas exposuimus: adparet inquam, quam necesse sit, recta corporis exercitatione, & victus contem-perata ratione, densitatem sanguinis conservare *k*, amissam vero eodem remedio, & carneo victu, & ferro, & ejusmodi medicamentis restaurare, quæ cordis contractionem adjuvant. Adparet perinde, quam plena periculo *Cornelii Bontekoe* l. secta fuerit, qui male accusata sanguinis cras-sitie *m* integritatem valetudinis fere unice in tenuissimo sanguine posuerit, eamque aquosam indolem aqua, cui thea infusa fuisset, unice conatus sit adsequi. Iterum mirari possis Cl. viros fuisse, qui rubram sanguinis partem fere inutilem esse suspicari potuerint *n*.

Non oportet hic dissimulasse, dari rubri san-guinis cum robusta febre conjunctionem, quæ temperamentum parit athleticum: dari vero & alium rubrum sanguinem, quem putes a solo oleo adtenuato floridum reddi, & cum debili fibra-

*i* L. I. p. 72. 73. L. II. p. 225. seqq.

*k* Boerhaave l. c. Tabor c. I. p. 71. Quincy essay the thirth on the animal fibre.

*l* De thea p. 67. Cheyne theory p. 143. Blancard &c.

*m* Recte monuit Boerhaavius,

perniciosa hypotheseos debel-lator, recte Ill. Archiattrorum comes T. II. p. 266.

*n* De St. Leger Thes. in hæc verba Ergo proxima qua corpus alitur materies a rubro sanguine diversa. Paris 1743.



rum vitio conjungi. Hyſtericis feminis ſanguis floridus & tamen parum eſt virium , ut ſanguinis miſſio noceat *n*\*.

Num alibilem naturam cruor poſſideat quæri poteſt. Multi negant *o* : & certe videtur , albuminoſam , elastiſcam , figurabilem , ſilique trahentem lymphæ naturam , ad generandum id gluten aptiorem eſſe , quod partes firmas corporis animalis & conſtituit , & reparat. Deinde nutritionis quaſi regnum latius , quam ruber cruor patet , & perpetuo ordine pauco cum ſanguine piſces , nullis vero rubris cum globulis ea animalia nutriuntur , quæ exſanguia dicuntur , quod rubro vitali humore deſtituantur. Abſque gelatiſoſo vero elemento neque animal ullum , neque planta nutritur.

§. IX. *Figuræ ſphærica commoda ; tum ferri ; olei.*

Etiſi utique aureus globulus lamina ex eodem metallo facta non denſior eſt , certum eſt tamen , ſphæricam figuram cum eodem volumine minimam ſuperficiem habere , minimam adeo ab iis particulis fluidis reſiſtentiam pati , cum quibus per vaſa fluit , atque adeo motus accepti tenacior eſſe. Hæc ratio eſt , quare funeſtis illis telis plumbeis ferreisque conſtanter ſphærica figura impertiatur , ut & longiſſime per aerem ferantur , & vehementiſſime feriant. Non repugnat adeo , & rubra vaſcula minima a rubris

---

*n*\* *Eſano febr. epid.* p. 213.      *o* *Idem ibid.*

sphærulis potentius distendi, & aperiri, & ad minores humorum series, per eos globulos, integriorem a corde motum adferri, quæ nostri olim *Præceptoris* conjectura fuit *p*. Frictionem etiam a sphærica figura minui, atque parietes minimorum vasorum minimum pati adtritum, vulgo notum est, cum globi unico puncto parietem cavi vasis contingant. Denique ad oscula minora subeunda sola hæc figura aptissima est, quæ secundum quamcunque directionem feratur, atque eadem semper facilitate subeat, cum in omni alia figura longior aliqua diameter sit, quæ in transversum acta ostium sibi præcludat, nisi multo latius fuerit *q*.

Ferrum, quod in globulis est *r*, non dubie densitatem ipsis majorem conciliat. Etsi enim ejus exigua ad totum sanguinem portio est *s*, ad globulos tamen, qui sanguinis minorem partem efficiunt, major est multo, cum aqua quinque omnino sextas partes *t*, pars vero globosa nondum *v* integram quidem sextam sanguinis partem efficiat, siquidem ad eam aquam albuminosum elementum plurimum confert. Ferrum autem & septuplo sanguine gravius, & præterea multo, omni alio sanguinis elemento, durius solidiusque est, & propriam sibi firmitatem cum rubris sphærulis communicare videtur. Aliquid etiam ad calorem generandum conferre, probabile

*p* I. R. M. n. 261.

*q* Conf. ea quæ de secretionem  
ex *Pitcarneo* adferentur L. VII.

*r* p. 225. seqq.

*s* p. 209.

*t* p. 175. seqq.

*v* p. 84. seqq.



reddetur , cum omnium , quantum novi corporum , a frictione , & ab ictu repetito , vehementissime incalescat , solumque a malleo candeat. Denique satis nunc consentitur ruborem sanguinis a ferro esse.

Plurimum utique ad calorem confert oleum , sive inflammabile principium , quod in globulis abundat *x* , neque tamen a ferro abest *y*. Ejus multiplex utilitas est , princeps autem , quantum intelligo videtur , coire cum aqua , cumque ea animale gluten componere , quod neque absque aqua fluidum satis foret , neque absque oleo satis viscidum *z* , aut ad conferruminanda terræ elementa satis virium haberet. Idem oleum flexilem naturam fibris impertit , quæ ex terra sola friabiles fierent. Denique plerisque humoribus animati corporis aliqua copia inest , quam a sanguinis communi penu mutantur , nonnulli vero fere unice aut potissimum ex oleo constant , ut adeps , medulla , bilis , cerumen , sebum subcutaneum.

*§. X. Seri sive partis flavescens utilitas.*

Pars albuminosa feri , ad fibras generandas , adque constitutionem adeo totius animati corporis , primaria materia est. Ut vulnera vasorum claudat , oculorum testimonio confirmavi *z*<sup>\*</sup>.

*x* p. 89.

*y* p. 241. seqq.

*z* Robinson Essay on animal p. 189.

*economy* T. II. p. 426.

*z*<sup>\*</sup> Second mémoire &c.

Albumine fetum volucrum ali, nempe fero *a*; simili gelatina piscium & quadrupedum oviparorum embryones primis diebus unice nutriri: similem in amnii aqua coagulabilem naturam esse, & ad alimentum homini nascituro præstandum aptitudinem, suis locis ostendemus. Ut mucus in gelatinam, hæc in membranas & viscera, demumque in animalis partes solidas consistat, per experimenta ostensum est *b*.

Hos ad usus oportet definitam in fero viscidæ materiæ ad aquam portionem esse. Si aquæ portionem auxeris, gluten dilabetur, amissa parte, quæ terreas particulas ligat: robur omnium fibrarum frangetur, laxatis vinculis, quæ divisa elementa uniunt: demum nihil de fero ad nutriendas partes adhærebit, sed lacunas præteribit, quæ sarcindæ fuerant, ut omnino nutritium humorem ab excremento ex natura coagulabili distinguamus *c*. Porro albuminoso succo sua densitas necessaria inest, ne in vasa minora transeat. In sano homine nullæ ad ignem, aut ab acore, coagulabiles particulæ in urinam, in lacrumam, in alios tenuiores transeunt, ne quidem in febribus *d*. Auge elementi aquei portionem, transibunt utique, & fiet, quod a raris & vitiosis corporum conditionibus *e* factum

*a* Per experimenta Cl. Be-guelin nuper in T. XIX. diarii *bamburg. magazin.* recusa.

*b* *Sur la formation du poulet* T. II. p. 179. *Harvei* p. 125.

*c* *Lomer* p. 6. ed. Bat.

*d* *Quesnai des fievres cont.* T. II. p. 394.

*e* Serum ad ignem coagula-

bile in urina *Phil. Trans.* n. 222.

Urina in phthifico pellucida, & coagulata, ut ranarum, quod vocatur sperma *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 8. obs. 30. Urinæ vero puerorum gelatinam insidere, nimis pro toto genere affirmatur *Brouzet educat. medicin.* T. II. p. 181.



est, ut alibilis humor per urinam, sudoresque disperdatur, quale in diabete inque colliquativo sudore exemplum est. Non ideo negavero, multa vi circularis motus denique serum adtenuari, resolvi, exhalare. Verum tunc suo defunctum munere, naturam coagulabilem deposuit.

Contra necesse est, ut rubro sanguine serum aliquanto tenuius sit, ne globuli se comprehendant, inque coagula coeant, ad quæ aliunde proni sunt *f*. Hinc fit, ut diminuta aquæ portione serique, cruor aquam in morbis acutis repellat *g*, neque sibi sinat admisceri. Sed etiam proprio cum canali cruorem coalitutum sunt qui metuant *h*, neque penitus præter rem, cum in ductu arterioso, in aneurysmatibus, in arteriis ligatis hujusmodi coalitionis exempla sint, inque raris nonnullis vitiis, qualia ipse descripsi *i*.

Muco plurima sua utilitas est, alias ornatius exponenda. Sensiles nervos ab acrimonia aeris, urinæ, a frictione tuetur; siccitatem ab organis deglutitionis, loquelæ spiritusque avertit, olfactum temperat, alias corporis partes cum mobilitate replet, ut in funiculo umbilicali, in articularum capsulis exemplum est. Idem oleum cum aqua optime commiscet *i*\*.

*f* p. 75. seqq. &c.

*g* Huxham on fevers p. 8.

*h* Ill. Schwenke p. 100.

*h*\* Cujus interno parieti membranam cruentam ex sanguine

natam adhæsisse vidi.

*i* Opuscul. patholog. obs. 19.

Philos. Trans. n. 483. 492.

*i*\* Essays of a Societ. at London V. I. ad fin.

§. XI. *Aquæ , salis , aeris , ignis in sanguine utilitas.*

Ipsū serum aqua amissa stat, cocti albuminis simile, neque vitalem circuitum absolvere aptum foret, nisi multa ab aqua viscidum gelu dilueretur. Serum amissa aqua in gummi speciem coit. Aqua omni alio liquido magis expedite per canales minimos iter obit. Sæpe expertus sum, per tenuissimos anellianos tubulos aquam exprimi posse, non ita coloratos liquores. Aqua in 80 pulsibus idem iter describit, quod spiritus vini in 86, raparum oleum in 100, argentum vivum, adeo mobile, in 124 pulsibus absolvit *k*. Absque aqua oleum iners restagnaret, & cogeretur.

Iterum aqua fibras animales irrotat, a siccitate aque coalitu servat. Incredibile est, quanta a sola aquæ distillatione in partibus animalium degeneratio superveniat. Ipsi adeo molles tenerique nervi, unice ab amissa aquula, in rigidos, succini similes, præ duritate fragiles funiculos abeunt.

Sed eadem aqua omnium humorum corporis animalis principem portionem sola suppeditat, nonnullos vero humores fere sola præstat, ut tenuiores illas exhalationes, Sanctorianam cutaneam, lacrumam, sudorem, salivam, humores pellucidos oculi. Minorum generum vasa,



quorum liquor non cogitur, aqua pene sola perfluuntur, omnes alios nimis crassos humores refutatura.

Sales animalium pene urinofi, videntur necessariam quibusdam humoribus acrimoniam præstare, aut ciborum digestionem aptam, ut in bile, aut sollicitandis suis receptaculis, ut in semine, cerumine, fæce alvina, necessariam. Idem, ipsum per repetitum humorum motum nimis meraci, nimis volatiles, nimis acres, urinæ, fudoris, alvi fæcum, perspirabilis humoris partem constituunt, & per pulmones, & per cutem, de corpore avolant, nocituri si retinerentur. Iterato vero moneo, sales me dicere, non quod sales jam veri sint, sed quod apti nati sint, qui cum certo caloris gradu in sinceros sales abeant l.

Aeris dotes & utilitates nondum satis notæ sunt. Id interim certum est, ad gluten pertinere, quo omnium firmitas in universa natura corporum elementa cohærent, ut omnino neque fere metallum, neque os, neque lapis, neque testa, neque sal, dissolvatur, quin aer extricatus prodeat. Quid in humoribus nostris utilitatis exerceat idem; num fluidam naturam conservet, aut ad alias mutationes, putredinis hætenus adfines, clanculum disponat, neque hoc loco, neque usquam forte exponi poterit.

---

l Non dari in sanguine particulas calidas, quæ cumulatæ febrem faciunt *Leonard. a Capoa raggion. T. II. p. 39.*

Ignis omnis in rerum natura motus , omnis-  
que fluiditatis auctor ; etiam nostrum sangui-  
nem procul dubio a congelatione liberat. Multo  
vero majorem ignis vim possidemus , quam ad  
hos quidem usus erat necesse. Nam neque  
piscibus 1. 3. aut 5 gradibus calentibus sanguis,  
dum vivunt, congelatur. Quid is major calor  
utile præstet , non satis certe notum est.  
Neque enim humores nostri , quam piscibus ,  
liquidius vasa sua oberrant /<sup>\*</sup>, neque dissimiles  
nostrorum humorum in iis adeo modico calore  
tepentibus animalibus humores nascuntur , nihi-  
loque inertior bilis est , & , quod mirum  
videri possit , sales , multo quam nobis , in  
frigidis animalibus meraciores parantur , ut in  
vipera , ape , cantharide. Sed neque deterius  
pisces aut cibos digerunt , aut minus expedite  
moventur , aut minori sunt robore , aut bre-  
viori vita. Est certe aliquis pulmonem inter  
& calorem consensus , in quem alibi inqui-  
remus.

§. XII. Fons & penus unde sua sanguis elementa  
habet.

Et si ad hanc quæstionem , post enarratam  
dumum

<sup>\*</sup> Hoc addo , ut ne credatur ,  
fluiditatem humoribus a calore  
accidere. Aqua equidem calida  
expeditius per vasa animalia  
transit , inque 46 & 52 se-  
cundis minutis id iter ab-  
solvit , quod eadem frigida  
in 77 & in 80 ejusmodi minu-  
tis perficit Hales hæmastat.

p. 130. Verum nostri quidem  
humores potius viscidiores sunt  
iis, qui pisces animant. Majori  
cum calore aqua difficilius  
transit , & vasa constringit ,  
quando 36 Reaumurii gradum ,  
aut 104. Fahr. excedit Sauvages de inflam. p. 237.



demum ciborum & digestionis historiam, plene responderi potest, tamen interim, donec post aliquot annos eo nos labor noster ducat, pauca tempori præripuisse liceat. Ex adipe vegetabili & animali globuli lactei *m* procul dubio finguntur, ex istis globulos rubros parari non est improbable, postquam cum ferro subacti fuerunt densatique, eamque soliditatem adepti, ut mediam per lympham, non mutata figura sua, neque variato volumine circumeant, inque aqua subsideant, qui in lacte natabant. Inflammabilem naturam ab origine retinent. In pullo sanguis ex pingui vitello *n*, sub oculis nostris generatur, cum flavedinem evidentissimos per gradus deponat, quam naturam alcalinæ vicinam, sponteque in putredinem vergentem, nuperorum Cl. virorum, & principis *Beccari* olim nostri præsidis, in farina cereali detexit.

Serum sanguinis ex animali gelatina vix mutata facile renascitur. Verum, cum etiam ex solo vegetabili cibo animalia simillimam nostræ lympham parent; & homo solo pane cum aqua sanus vivat, simillimosque humores generet eorum, quos alii ex lautiori diæta lucrantur, sequitur etiam ex vegetabili mucilagine animale gelatinam parari posse :

*m* Ex adipe, de butyracea lactis parte decedente, globulos rubros parari *Franciscus Quesnai* æcon. anim. T. III. p. 33.

*n* *Faber* ad *Hernandez*. Ex ovis testudinum verum oleum ad solem fit, levius olivarum oleo *Gumilla hist. natur. de Grenoque* V. II. p. 69.

mucoso gelatinosam materiam ex rapa & brassica plurimam haberi Cl. *Thouvenel* o, & alioquin a mucosum ad lympham gelatinosam non maxima est diversitas o\*.

Oleum sanguinis ex natura vegetabili minus mutata reformatur; cum acidæ indolis manifesta vestigia retineat p, in adipe omnium potentissima p\*. Oleum tamen empyreumaticum animale cum vegetantium empyreumatico oleo non undique convenire *Neumannus* monuit, ut istud quidem ad cæruleum Berolinense parandum ineptum sit p\*\*. Nam oleum animale utique paulo minus acidum esse suspiceris, & cum uberiori sale alcalino volatili subactum.

Sal sanguinis manifesto ex acido sale q generatur, qui in vegetabili fabrica plurimus habitat, iterum boum exemplo, qui verissimos urinosos sales in sanguine habent, folis acrescentibus herbis pasti, bombycumque & aliorum insectorum, quæ ex acidis ciborum succis pene perfectos urinosos sales elaborant, hominumque, qui etiam solo adeo acrescente lactis fero, multos per annos, vitam sustentarunt: neque rara exempla sunt, mutati in alcalinum salem acoris, cum & putredo similem effectum præstet, & ignis, quarum causarum illa quidem

o *Corp. nutrit.* p. 122.

o\* *Butt* p. 61.

p *L. I.* p. 64.

p\* *Hewson inquiries* p. 127.

p\*\* *T. I. P. 2.* p. 350.

q *Boerhaave Elem. Chem.*

*T. II.* p. 327. *Senac l. c. T. II.* p. 115. *Quesnai æcon. anim.* *T. II.* p. 175. 373. &c. *Neumann ed. Zimm.* p. 1220. *T. III.* ed. *Kessel* p. 40.



ex acidissimo citrio pomo falem urinosum volatilem, & hæc ex oxydis acido fale fixum lixiviosum *r*, aut ex acore nitri cum pulvere carbonum in retorta, quam vocant, tubulata detonantis, urinosum volatilem & falem producit. Similem efficaciam hic diuturnus calor animalium humorum, rapidusque motus paulatim præstare videtur. Ita farina repetito pista, destillata, sola fere urinosa elementa suppeditat *t*. Sic fucci animales longo vitæ usu per vasa circumacti, alcalinis eo propiores fiunt, quo in duriores partes coiverunt. In fuccis animalium acoris est vestigium; nullum in ossibus aliisque firmis partibus. Sic mira metamorphosi e vegetabili victu animalia tamen minerale alcali pro basi falis neutrius in sanguine dominantis parant *v*.

Phlogisti in naturam electricam transmutationem tetigimus *v*\*. Peculiares aliquos nitrosos animalium sales *v*\*\* non satis intelligo, quos ostenderimus, plerisque ex urinosa volatili tribu, aliquos ex lixiviosa fixa, alios ex muriatica classe, paucissimos acidos esse, qui veteris formæ vestigia retinent.

Ferrum animalia facile ex plantis *x* habent; terram & ex cibis quibuscunque, & ex ipsis

*r* Ex acido falis crystallini acetosellæ in igne subito fit sal fixus, dum pars acida in aquam transit *Neumann T. III. p. 40.*

*s* *Pott fortsetzung der untersuchung p. 34.*

*t* *Needham nouvel. obss. p. 273.*

*v* p. 198.

*v*\* p. 69.

*v*\*\* *Senac l. c.*

*x* p. 206. seqq.

denique aquis : quæ eadem solidum fibræ elementum, totique animat corpori suam firmitatem præstat. Ea terra ex vegetabilibus recepta, naturam vitrescibilem magna ex parte fere mutat, & in calcariam transit, forte quod cum oleo intime per tritum uniatur  $\gamma$ .

---

$\gamma$  *Junker chym.*, ed. Gall. p. 518.

FINIS LIB. V. & TOMI III.





# INDEX


## T O M I T E R T I I .

### DE FUNCTIONIBUS PRÆCIPUARUM CORPORIS HUMANI PARTIUM.

#### LIB. V. S A N G U I S .

#### S E C T I O I .

#### SANGUIS IN UNIVERSUM CONSIDERATUS.

1.  Quantum sanguinis in vasis humani corporis con-  
tineatur pag. 1
2. Calculi a sanguine de vasis emissode sumti non sunt  
veri, quia magna pars sanguinis in vasis residet 3
3. Calculi sumti a magnis jacturis sanguinis 5  
Quanta hic varietas sit 7. 8. 9
4. Sanguis arteriosus a venoso parum differt, aut nihil  
quidquam 10  
Neque *Harveius* differre credit 12  
Qui aliter ex hypotheseos necessitate crediderint 13  
Sanguinemque arteriosum tenuiorem dixerint 14  
aut vicissim densiorem 15
5. Veri discriminis vix quidquam subest, neque arteriosus  
sanguis a venoso colore differt 16  
neque pondere 18. 19
6. Num aliquod in sanguine diversarum arteriarum dif-  
crimen sit 19 seqq.  
Non est 20
7. Sanguis vivi hominis rubet 21. 22

|   |                    |
|---|--------------------|
| Flavedo sanguinis                                 | <i>pag.</i> 23. 24 |
| Chylus in sanguine nonnunquam conspicitur         | 25. <i>seq.</i>    |
| Vero chylo, etsi aliter creditur                  | <i>id.</i> 27      |
| Sanguis niger                                     | 28                 |
| 8. Sanguis sponte coit                            | 29                 |
| etiam in animalibus frigidis                      | 31                 |
| magis in hominibus corpus vehementer exercentibus | 32                 |
| & in febribus aliisque morbis                     | 32. <i>seq.</i>    |
| 9. Etiam in vivo homine & animale                 | 34. <i>seqq.</i>   |
| 10. Polypus non verus                             | 37. <i>seqq.</i>   |
| 11. Polypi veri                                   | 39 <i>seq.</i>     |
| Eorum fabrica                                     | 41                 |
| Signa veri polypi a dilatato corde sumta          | 42                 |
| a symptomatibus                                   | 43                 |
| Polypi causæ                                      | 44                 |
| Qui primum polypum descripserint                  | 45. 46             |

## S E C T I O II.

## E L E M E N T A S A N G U I N I S.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Calor  | 47                |
| Quibus animalibus sanguis minus vere dictus sit<br>frigere            | 48. 49            |
| Quibus vere hætenus frigeat   | 50                |
| Reliquis calet  | 51                |
| 2. An sanguis calorem atmosphæræ constanter superet                   | 52                |
| Calor atmosphæræ æstivæ medius  | 52                |
| Calor major   | 53                |
| Summi æstus exempla gradusque   | 54. 55. 56        |
| Quem æstum homines tolerant   | 56. 57. 58. 59    |
| calor sanguinis non semper major est calore aeris,<br>quem respiramus | 60                |
| 3. Qui sit calor sanguinis varius<br>& summus                         | 60<br>61. 62. 63. |
| 4. Sanguinis diversæ partes   | 63                |
| Materies electrica  | 64. 65. 66        |
| 5. Halitus  | 67                |
| levior est reliquo sanguine   | 68                |
| 6. Phlogiston   | 69. 70            |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Pars rubra sanguinis sive cruor                                    | pag. 71. 72     |
| ferum pondere superat  | 72 73           |
| tum aquam  | 74              |
| 8. Sponte cruor in scissile quasi hepar cogitur                    | 75. 76          |
| etiam ipse absque fero cruor                                       | 77. 78          |
| cum calore firmitus  | 78              |
| & a febre  | 79              |
| 9. Idem sibi permissus dissolvitur                                 | 79              |
| etiam in vivo homine   | 80. 81. 82.     |
| aut debili   | 83. 84          |
| 10. Cruoris & feri in sanguine portio                              | 84. 85. 86      |
| Varie a variis definitur   | 87              |
| quia scriptores serius aut maturius ad experimentum<br>accesserunt | 87. 88          |
| 11. Globuli cruoris  | 88 <i>seqq.</i> |
| In frigidis animalibus conspicui                                   | 89              |
| etiam in calidis   | 89              |
| a <i>Malpighio</i> detecti   | 90              |
| a <i>Leeuwenhoeckio</i> imprimis descripti                         | 90. 91          |
| & ab aliis   | 91              |
| 12. Non sunt neque olei leves bullæ                                | 92              |
| neque corpuscula rotunda ab adtractione nata                       | 93              |
| Sed vera constantia sanguinis elementa                             | 93              |
| neque in aliis humoribus continentur                               | <i>ib.</i>      |
| 13. Figura. Num in frigidis animalibus plana                       | 93              |
| Non videtur  | 94. 95. 96      |
| Neque facculi membranani   | 97              |
| 14. Magnitudo. Num in omne animale eadem                           | 97              |
| Num in aliis alia  | 98              |
| Quænam diameter cum pollice comparata                              | 98. 99          |
| Variæ Cl. virorum mensuræ  | 99              |
| Videtur perexigua esse   | 100             |
| 15. Color verus rubor est. Num ob acervi crassitiem<br>rubeant     | 101             |
| Proprius inest rubor   | <i>ib.</i>      |
| 16. Copia varia est & in robustis major                            | 102             |
| Non parva in animalibus frigidis                                   | 103             |
| 17. Num figuram mutant. Qui adfirmet                               | 104             |
| Non videtur  | 105             |

18. Aere elastico repleti dictum est pag. 106  
 Sed non finit pondus, color, natura frigore minime  
 densabilis 106. 107  
 ad calorem non expansilis 107
19. Num ex filis constent 108. 109
20. Num globuli rubri ex minoribus sphæruis 109  
*Leeuwenhoeckii* experimenta 109. 110. 111. 112
21. Globuli rubris minores etiam aliis auctoribus visi 112  
seqq.  
 Systema decrefcentium globulorum *Boerhavii* 114
22. Objectiones *Tabori*, *Lancisi*, *Brendelii* 115. 116  
*Senaci* 116
23. Globuli majores, qui dissiluerunt, fuerunt coagula  
 globulorum 117  
 nunquam globuli rubri minores visi ib.  
 Neque sanguis in lympham colliquescit 117. 118  
 neque in decrefcentium globulorum theoria firmum  
 quid esse videtur 119
24. *Hewsoni* experimenta 120
25. Fibræ in sanguine veteribus dictæ 120  
 nuperisque 120. 121. 122  
 Experimenta quibus confirmantur 122. 123  
 Non possunt hæc fibræ admitti 125
26. Contraria argumenta *Borelli* 124
27. Sapor sanguinis falsus 126  
 Salium microscopio in sanguine visorum historiarum 127  
 nondum liquet 127  
 Ut sanguis a salibus mediis admistis mutetur 128 seqq.  
 An a nitro cogatur, an diluatur 129  
*Stahlius* cogi scribit ib.  
*Hofmannus* resolvi ib.  
 Hæc sententia vero propior videtur ib.  
 Nitrum ruborem sanguinis auget 130  
 Tum sal marinus ib.  
 & tartarus solubilis, & sal epsomenfis ib.  
 Non valde diluunt iidem 131
28. Acidi sales quid in sanguine mutant 131. seqq.  
 Vegetabiles potius diluunt 132  
 Fossiles potius cogunt 133



- Inprimis stillatitii inde nati liquores 134. 135. 136
29. Sales lixiviosi dicuntur sanguinis fluiditatem augere 137  
 & ruborem intendere 138  
 Alia tamen experimenta potius cogere ostendunt 138  
 & denigrare 139  
 etiam mea 140
30. Spiritus inflammabiles sanguinem cogunt 141  
 tum olea stillatitia. 142
31. Sanguis in vivo homine non alcalescit 143  
 ad eam tamen indolem accedit 144. 145
32. Sanguis putrescendo alcalescit 146
33. Putredinis causæ 146. 147
34. Phænomena 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154  
 Pericula anatomes 154  
 Scorbutus 155  
 Alia acrimonia humorum 156
35. Putredo 157. 158. 159  
 Aerem latentem expedit 159
36. Adjumenta putredinis 160  
 Sales lixiviosi putredinem adjuvant 160. 161  
 Acidi & medii sales eam morantur 162
37. Animalia aliqua vehementer acres *ib.*  
 & lixiviosos omnino humores habent 162. 163. 164
38. Omnino acor in animalium humoribus latet 165. 166  
 167. 168. 169  
 & per experimenta confirmatur *ib.*
39. Animalia pleraque fætent 169. 170  
 Aliqua grati sunt odoris 171
40. Analyfi igneæ non nimium debet tribui 171. 172.  
 neque vera corporum elementa repræsentat 173  
 Earum resolutionum utilitas in morborum curatione 174
41. Elementa in quæ sanguis igne resolvitur 175  
 Aqua sanguinis 175  
 Ejus ad reliquas cruoris partes ratio 176. 177  
 apud varios scriptores varia *ib.*  
 per morbos mutabilis 178. 179
42. Spiritus sanguinis 180. 181. 182  
 Ejus ad reliqua elementa portio 183. 184

|   |               |
|---|---------------|
| in morbis alia & alia                     | pag. 185      |
| 43. Sal volatilis ficcus                  | 185           |
| ejus in fanguine portio                   | 186. 187      |
| quomodo a morbis mutetur                  | 187. 188      |
| 44. Oleum fanguinis                       | 188           |
| Siccus inflammatur                        | 189. 190      |
| portio olei in fanguine                   | 191. 192. 193 |
| & quænam in morbis sit                    | 193. 194      |
| Oleum animale Dippelii                    | 194. 195      |
| 45. Carbo fanguinis                       | 195           |
| Portio ejus ad reliquum cruorem           | 195. 196      |
| 46. Sal fanguinis in igne fixus           | 197           |
| Pars ejus lixiviosa est                   | 198           |
| Pars marini similis                       | 198. 199      |
| Ejus portio                               | 199. 200      |
| 47. Acor in fanguine latens               | 201           |
| Impugnatur                                | 202           |
| Confirmatur per experimenta               | 203. 204      |
| 48. Terra fanguinis                       | 204. 205      |
| Ejus portio                               | 205           |
| In fanguine subinde conspicua             | ib.           |
| 49. Terra ferrea fanguinis                | 206. 207      |
| Variis experimentis confirmatur           | 208. 209. 210 |
| 50. Aer fanguinis                         | 210. 211      |
| fere trigesimam tertiam partem constituit | 211           |
| 51. Alia experimenta                      | 211. 212      |

## S E C T I O III.

## S E R U M S A N G U I N I S.

|  |          |
|--|----------|
| 1. Seri portio                                   | 213      |
| pondus inter aquam & fanguinem                   | 213. 214 |
| 2. Pars feri gelatinosa                          | 215. 216 |
| Sponte non adeo cogitur emissum                  | 216      |
| Sed in calore 148 grad.                          | 216. 217 |
| An duo sunt genera lymphæ diversa caloris gradu, |          |
| quo coguntur                                     | 217      |
| Non videtur                                      | 217. 218 |



|  |                  |
|--|------------------|
| Serum cogitur, etiam in vivo animale                   | 218. 219         |
| Inde pars polyporum                                    | 219              |
| & crusta inflammatoria                                 | 220              |
| De ejus origine aliqua                                 | 221. 222. 223    |
| An ea solutione  | 224              |
| Coagula feri firma                                     | 225              |
| Ab igne in gummi ficcatur                              | 226              |
| 3. Lympha vasorum valvulorum ejusdem naturæ est        | 227. 228. 229    |
| tum aqua hydropica, hydatidum ichor, & alii mor-       |                  |
| bofi humores   | 229. 230         |
| & jus carniū   | 231              |
| quod ex frigidis etiam animalibus obtinetur            | <i>ib.</i>       |
| 4. Serum in tepore dissolvitur, tum humores ejus simi- |                  |
| les  | 232. 233         |
| minus urinosum est                                     | 234              |
| 5. Pars mucilaginosā feri sanguinis                    | 234. 235         |
| Admixtus adeps, fabulum, aer                           | 236              |
| 6. Quid in lympha admixti sales mutant                 | 236 <i>seqq.</i> |
| Ab acidis liquoribus cogitur                           | 237. 238         |
| etiam a lixiviosis salibus                             | 238. 239         |
| & a stillatio spiritu                                  | 240              |
| 7. Seri ad ignem analysis                              | 240 <i>seqq.</i> |
| ut a sanguine differat                                 | 244. 245         |

## S E C T I O IV.

*ELEMENTORUM SANGUINIS PROPORTIO  
ET UTILITAS.*

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Temperamenta in universum                       | 245               |
| 2. Sanguineum, sive globulorum rubrorum abundantia | 246               |
| Plethora vera                                      | 247               |
| 3. Temperamentum acre & urinosum                   | 249. 250          |
| 4. Temperamentum aquosum & debile                  | 251. <i>seqq.</i> |
| 5. Comparantur ista cum veterum temperamentis      | 253. 254          |
| Quatuor elementa <i>Galenī</i>                     | 254               |
| & nuperorum  | <i>ib.</i>        |

|   |          |
|---|----------|
| 6. Cur admitti nequeant   | 255      |
| Atra bilis nulla est in sano homine                                       | 255      |
| 7. Firmarum partium præcipua est in temperamentis<br>efficiendis dignitas | 257      |
| Sanguinis inconstantia  | 258. 259 |
| 8. Globulorum rubrorum utilitas   | 260      |
| Vasa melius distendunt  | 261      |
| & aperiunt  | 262      |
| & in suis vasis manent  | 263      |
| Male laudatur sanguis tenuior   | 264      |
| 9. Sphærica figura resistantiam minuit                                    | 265      |
| Ferri utilitas. Ad densitatem   | 267      |
| ad calorem  | ib.      |
| Olei utilitas ad calorem  | ib.      |
| Ad gluten constituendum   | ib.      |
| & humores varios  | 268      |
| 10. Seri utilitas. Ex eo partes firmæ generantur                          | ib.      |
| & elementa uniuntur   | ib.      |
| sanguis diluitur  | 268. 269 |
| 11. Aqua facilius vasa perfluit   | 270      |
| humores varios generat  | 270. 271 |
| Aëris utilitas  | 271      |
| & caloris   | 271      |
| 12. Globuli ex adipe lactis nascuntur                                     | 272      |
| serum ex gelatina animali   | 273      |
| & ex mucilagine vegetabili  | 273      |
| Sal ex acido sale plantarum   | 275      |
| Ferrum ex plantis est   | 275. 276 |









